INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PROGRAM OCHRONY PSZENŻYTA OZIMEGO

Program przygotowany w ramach zadania 1.2
„*Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych*”
ogram Wieloletni na lata 2016 – 2020
„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”
finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poznań 2017

Program opracowany pod redakcją:
prof. dr hab. Marka Korbasa

Autorzy:
Chwasty - dr hab. Roman Kierzek, inż. Adam Paradowski, mgr Marta Dubas
Choroby - prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, mgr inż. Jakub Danielewicz
Szkodniki - prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr Przemysław Strażyński

FAZY ROZWOJOWE

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony)



Komentarz:

Program integrowanej ochrony pszenżyta ozimego przed chorobami, szkodnikami i chwastami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego na początku 2017 roku.

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

CHWASTY									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna**	**Mechanizm działania substancji aktywnej (wg HRAC)**	**Działanie**	**Dawka kg(l)/ha (stężenie %)**	**Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00 (bezpośrednio po siewie)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Du Pont Glean Strong 54 WG** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 417 g/kg (41,7%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 125 g/kg (12,5%)	F1, B	Doglebowe	**120 g/ha**	1	ND	Nie stosować w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20°C lub/i w okresie dużego nasłonecznienia, oraz gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C i przewiduje się taką amplitudę do tygodnia po zabiegu,
		Glean 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 0-15°C
		Nuher 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 0-15°C
		Racer 250 EC	flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g/l	F1	Doglebowe	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Maraton 375 SC **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 250 g/l, izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika)- 125 g/l	K1, C2	Doglebowe	**4,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00 - Kw (bezpośrednio po siewie do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Herold 600 SC** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,25-0,35 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-13 (bezpośrednio po siewie do fazy trzech liści)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Boxer 800 EC** **IP**	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-21 (bezpośrednio po siewie do początku krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Cayman 600 SC** **IP**	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) – 100 g/l (8,9%). izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (44,6%)	F1, C2	Doglebowe / Nalistne	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Legato Plus 600 SC **IP**	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) - 100 g /l (8,9%), izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (44,6%)	F1, C2	Doglebowe / Nalistne	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Protekt Plus 600 SC **IP**	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) – 100 g/l (10%), izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (44,8%).	F1, C2	Doglebowe / Nalistne	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10-13 (jesienią od szpilkowania do fazy trzech liści)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Battle Delta 600 SC** **IP**	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	**0,35 l/ha**	1	ND	Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych w normalnym cyklu zmianowania. Środka nie stosować: na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, mokre, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, po długotrwałej suszy, na gleby podmokłe, piaszczyste, gleby bardzo lekkie lub kamieniste itd. Środek może spowodować przemijające objawy fitotoksyczności m in. chlorozy. Mają one jednak charakter przemijający i nie wpływają na poziom plonowania zbóż.
		Cayman Pro 440 SC **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	**2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Ordago Pro 440 SC **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	**2,5 l/ha**	1	ND	Środek stosować na dobrze uprawioną, bez grud, glebę
		Expert Met 56 WG **IP**	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%)	C1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,35 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10 - 25 (od szpilkowania do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Expert 600 SC** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,25-0,35 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Komandos 560 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,4-0,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Kompleks 560 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,4-0,5 l/ha**	1	ND	Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.
		Komplet 560 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,4-0,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Picona** **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 320 g/l (28,83%) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 16 g/l (1,44%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	**2,0-3,0**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-Kw (od fazy pierwszego liścia do końca wegetacji)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Arubis 50 SG** **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**25-37,5 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Spoton 50 SG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**25-37,5 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Surfer 50 SG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**25-37,5 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-12 (jesienią od fazy pierwszego do drugiego liścia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Maraton 375 SC** **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 250 g/l, izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika)- 125 g/l	K1, C2	Doglebowe / Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pendigan 330 EC + Protugan 500 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 330 g/l (33,9 %) + izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (46,29 %)	K1 + C2	Doglebowe / Nalistne	**3,0 l/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: -na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą, -w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin. Środka nie mieszać z glebą.
		Yellow Hammer 330 EC + Protugan 500 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 330 g/l + izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (46,29 %)	K1 + C2	Doglebowe / Nalistne	**3,0 l/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczenia. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich o większej zawartości próchnicy.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-23 (jesienią od pierwszego liścia do trzech rozkrzewień)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Bizon** **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Buffalo **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Legion **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Viper **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-29 (jesienią od pierwszego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Du Pont Glean Strong 54 WG** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 417 g/kg (41,7%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 125 g/kg (12,5%)	F1, B	Doglebowe / Nalistne	**120 g/ha**	1	ND	Nie stosować w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20°C lub/i w okresie dużego nasłonecznienia, oraz gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C i przewiduje się taką amplitudę do tygodnia po zabiegu.
		Lexus 50 WG **IP**	flupyrsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**20 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-30 (jesienią od pierwszego liścia do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Glean 75 WG** **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe / Nalistne	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 8-15°C
		Nuher 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe / Nalistne	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 8-15°C
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-Kw (jesienią od fazy drugiego liścia do końca wegetacji - do pierwszych przymrozków)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tolurex 500 SC** **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	**1,5-2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Axial One 50 EC **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**0,75-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Axial Komplett **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**0,75-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-14 (jesienią od fazy drugiego do czwartego liścia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Trinity 590 SC** **IP**	diflufenikan - (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,5%), chlorotoluron - (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l (21,7%), pendimetalina - (związek z grupy dinitroanilin) - 300 g/l (26,1%)	F1, C2, K1	Doglebowe / Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-15 (jesienią od fazy drugiego do piątego liścia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Protugan 500 SC** **IP**	izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (46,29 %)	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-25 (jesienią od trzeciego liścia do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Alister Grande 190 OD** **IP**	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) - 180 g/l (17,39 %) mezosulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6 g/l (0,58 %) jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,5 g/l (0,43 %)	F1, B, B	Nalistne	**0,8-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-29 (jesienią od trzeciego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Dyplomata 600 SC** **IP**	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %) diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F1	Nalistne	**1,25-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Snaiper 600 SC **IP**	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %), diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F1	Nalistne	**1,25-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Ranga 75 WG** **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**20 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13 - Kw (od fazy trzeciego liścia do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Axial 50 EC** **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	**0,6-0,9 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fraxial 50 EC **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	**0,6-0,9 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Huzar 05 WG** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5 %	B	Nalistne	**0,15-0,20 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Dicurex Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%).	C2	Nalistne	**2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Lentipur Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	**2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Legato Pro 425 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 25 g/l (2,2%) chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 400 g/l (35,7%)	F1, C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 14-23 (od fazy czwartego liścia do fazy trzech rozkrzewień)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Adiunkt 500 SC** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1	Nalistne	**0,24-0,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Herubin 500 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1	Nalistne	**0,24-0,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Saper 500 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1	Nalistne	**0,24-0,3 l/ha**	1	ND	Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej. Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-29 (jesienią od początku do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Aminopielik Super 464 SL** **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,73%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,37%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-25 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Attribut 70 SG** **IP**	propoksykarbazon sodowy (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 70%.	B	Nalistne	**60-100 g/ha**	1	ND	Wyższą dawkę stosować do zwalczania perzu właściwego
		Dicurex Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Lentipur Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-29 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Norton 069 EW** **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistne	**1,0-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Rumba 069 EW **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistne	**1,0-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Norton 069 EW + Atpolan 80 EC **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%) + adiuwant	F1	Nalistne	**0,5 +1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Rumba 069 EW + Atpolan 80 EC **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%) + adiuwant	F1	Nalistne	**0,5 +1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Concert SX 44 SG** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 % (400 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4 % (40 g/kg)	B, B	Nalistne	**0,15 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		IPU Gold 500 SC **IP**	Izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		IPUherb 500 SC **IP**	Izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Izofarm 500 SC **IP**	Izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Izoherb 500 SC **IP**	Izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Huzar 05 WG **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5 %	B	Nalistne	**0,15-0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Huzar 100 OD **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100g/l	B	Nalistne	**75-100 ml/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Huzar Activ 387 OD	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l (0,95 %), 2,4-D -(związek z grupy fenoksykwasów)– 377 g/l (35,87%)	B, O	Nalistne	**0,75-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Maczeta OD 125** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g /l, amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g /l	B, B	Nalistne	**0,15 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-30 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Atlantis 12 OD** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 2 g/l, mezosulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/l	B, B	Nalistne	**0,45-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Glean 75 WG** **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**10-15 g/ha**	1	ND	Środek stosowany wiosną zwalcza tylko chwasty dwuliścienne, a ogranicza występowanie miotły.
		Nuher 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**10-15 g/ha**	1	ND	Środek stosowany wiosną zwalcza tylko chwasty dwuliścienne, a ogranicza występowanie miotły.
		Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (789g/l) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Ranga 75 WG + Silwett **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Platform 61,5 SG **IP**	karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin)– 15 g/kg (1,5%) mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g/kg (60%)	E, O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-31 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy pierwszego kolanka)									
Miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Toto 75 SG** **IP**	tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg (68,2%), metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%)	B, B	Nalistne	**70-90 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tytan 75 SG **IP**	tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg (68,2%), metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%)	B, B	Nalistne	**70-90 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-32 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Axial One 50 EC** **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**1,0-1,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Axial Komplett **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**1,0-1,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne		**Foxtrot 069 EW** **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	**1,0-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Foxtrot 069 EW + Atpolan 80 EC **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%) + adiuwant	A	Nalistne	**0,5 + 1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Apyros 75 WG + Atpolan 80 EC** **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Po zbiorze rośliny uprawnej na jesieni można uprawiać tylko zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę w przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraka cukrowego. Uwaga! Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Apyros 75 WG.
		Nylon 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Jesienią po zbiorze pszenicy i pszenżyta na polach, na których był zastosowany środek ochrony roślin Nylon 75 WG, jako rośliny następcze można uprawiać zboża i rzepak ozimy. Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków, które można uprawiać w drugim sezonie wegetacyjnym (po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu środka). W przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, choroby, szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą i ziemniak.
		Ogar + Atpolan 80 EC **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Zboża ozime i rzepak ozimy – po zbiorze roślin uprawnych, jesienią w tym samym sezonie wegetacyjnym, Wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraków – na wiosnę w kolejnym sezonie wegetacyjnym, Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Ogar.
		Portos + Atpolan 80 EC **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji spowodowanej uszkodzeniem roślin uprawnych przez mróz, szkodniki, choroby, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie pszenicę jarą i ziemniaki. Po zbiorze rośliny uprawnej na jesieni można uprawiać tylko zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę w przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraka cukrowego. Uwaga! Przestrzegać zaleceń
Chwasty dwuliścienne		**Fluroherb 200 EC**	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Galaper 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Herbistar 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Bron 500 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Triben X 500 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Trimmer 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-37 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy początku liścia flagowego)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Aneks SX 50 SG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10% + adiuwant	B, B	Nalistne	**120-150 g/ha + 0,1%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Rubin SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10% + adiuwant	B, B	Nalistne	**120-150 g/ha + 0,1%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

Chwasty dwuliścienne		**Calibre SX 50 SG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pragma SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar Ultra SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Picaro SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fluxyr 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200g/l (20,29%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych, - na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki, - w czasie występowania przymrozków. Słoma z poddanych opryskowi roślin powinna zostać usunięta, może być wykorzystania jedynie jako ściółka dla zwierząt gospodarskich.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-29 (wiosną od fazy drugiego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tomigan Forte 102,5 SE** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (10,07%)	B, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-31 (wiosną od fazy 2 liści do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Chisel Nowy 51,6 WG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 469g/kg (46,9%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 47 g/kg (4,7%). + adiuwant	B, B	Nalistne	**90 g/ha +0,1%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-32 (wiosną od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Camaro 306 SE** **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Deresz 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Diablo 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Dresz 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Eguo 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Feniks 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Horse 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		King 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Kojot 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Muskato 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Mustang 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Rumak 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-39 (wiosna od fazy 2 lisci do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Lumer 50 WG** **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach agrotechnicznych.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-29 (wiosną od fazy 3 liści do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Aurora 40 WG** **IP**	karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 40%	E	Nalistne	**50 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Logran 20 WG **IP**	triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulofonylomocznika) – 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**37,5 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Arena 70 WG **IP**	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%.	O, B	Nalistne	**0,15-0,18 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Arena Top 70 WG **IP**	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%.	O, B	Nalistne	**0,15-0,18 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Lintur 70 WG **IP**	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%.	O, B	Nalistne	**0,15-0,18 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Merida 70 WG **IP**	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%.	O, B	Nalistne	**0,15-0,18 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Strong 70 WG **IP**	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 65,9% (659 g/kg) triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1% (41 g/kg)	O, B	Nalistne	**0,15-0,18 g/ha**	1	ND	Optymalna temperatura w czasie zabiegu wynosi 10-25oC. Przytulię czepną należy zwalczać w terminie do trzech wykształconych okółków. Stosować w mieszankach zbóż, złożonych tylko z tych gatunków zbóż, do których odchwaszczenia zalecany jest również ten sam środek. Po kilku dniach od zastosowania, środek może powodować zwłaszcza u żyta ustępujące po dwóch tygodniach objawy fitotoksyczności, niemające wpływu na ilość i jakość plonu.
		Triadik 70 WG **IP**	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%.	O, B	Nalistne	**0,15-0,18 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Triadik Bis 70 WG **IP**	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)– 65,9% triasulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,1%.	O, B	Nalistne	**0,15-0,18 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fox 480 SC **IP**	bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l (40,6 %)	E	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Jet ISO 500 SC** **IP**	izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-31 (wiosną od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Gold 450 EC**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 360 g/l (33,68%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 90 g/l (8,42%).	O, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-32 (wiosną od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka)									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Kantor Perfect 325 SC** **IP**	chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (25.86 %) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/l (2,16%)	O, B	Nalistne	**0,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Kantor 050 SC **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84 %)	B	Nalistne	**0,08-0,1 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Saracen 050 SC **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%)	B	Nalistne	**0,1 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-37 (wiosną od fazy 3 liści do fazy początku liścia flagowego)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Axial 50 EC** **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	**0,6-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fraxial 50 EC **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	**0,6-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Starane 250 EC**	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Taran 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-39 (wiosną od fazy 3 liści do w pełni rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Biathlon 4 D + Dash HC** **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 714 g/kg (71,4%), florasulam - związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 54 g/kg (5,4%) + adiuwant	B, B	Nalistne	**0,04-0,07 l/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Hadden 550 WG **IP**	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistne	**0,08-0,1 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Nautius WG **IP**	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistne	**0,08-0,1 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pygmee 550 WG **IP**	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistne	**0,08-0,1 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Blusky 500 WG **IP**	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	**16-20 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Mofat 500 WG **IP**	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	**16-20 g/ha**	1	ND	Silne opady występujące wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		Tivmetix OD **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 19 g/l (1,87%) tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 190 g/l (18,72%)	B, B	Nalistne	**0,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-29 (wiosną od początku do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Jatagan 75 WG** **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	50	Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność działania środka. W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin. Co roczne stosowanie herbicydu Jatagan WG na tym samym polu może doprowadzić do uodpornienia się chwastów na substancje czynne herbicydu.
		Mocarz 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Nokaut 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Siłacz 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Siłacz Max 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Sekator 125 OD** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,21%), amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)	B, B	Nalistne	**0,15 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Aminopielik D MAXX 430 EC** **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l (35,84%), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l (5,15%)	O, O	Nalistne	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Aminopielik Super 464 SL **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,73%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,37%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Dicopur Top 464 SL **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tayson 464 SL **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox 500 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox 750 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox Extra 300 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)	O	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox Professional 750 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, buraki.
		Chwastox Turbo 340 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)	O, O	Nalistne	**2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Premier 300 SL **IP**	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%)	O	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować przemiennie z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
		Premier 500 SL **IP**	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: − na rośliny chore i uszkodzone, − w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C, − w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C, − w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
		Premier 750 SL **IP**	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: − na rośliny chore i uszkodzone, − w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C, − w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C, − w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

		Premier D 750 SL **IP**	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: − na rośliny chore i uszkodzone, − w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C, − w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C, − w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-30 (wiosną od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Chwastox Trio 540 SL** **IP**	mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%) MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 200 g/l (16,20%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w postaci soli potasowej) - 40 g/l (3,24%)	O, O, O	Nalistne	**2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Bron 500 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar 75 WG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Helm Tribi 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tribex 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-31 (wiosną od początku krzewienia do pierwszego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Dragon 450 WG** **IP**	florasulam – (związek z grupy triazolopirymidyn) – 150 g/kg (15%) aminopyralid – (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) – 300 g/kg (30%)	B, O	Nalistne	**33,3 g/ha**	1	ND	Temperatura działania 5-22°C
		Dragon NT 450 WG **IP**	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15%) aminopyralid - (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 300 g/kg (30%)	B, O	Nalistne	**33,3 g/ha**	1	ND	Temperatura działania 5-22°C
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa		**Dragon NT 450 WG + Nomad 75 WG + Atpolan Bio 80 EC lub Olstick 90 EC** **IP**	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15%) aminopyralid - (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 300 g/kg (30%) + piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B, O + B	Nalistne	**33 + 120 g/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Temperatura działania 5-22°C
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Lancet Plus 125 WG** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%) piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/kg (5,0%) aminopyralid (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 50 g/kg (5%)	B, B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Środek wnik ado rośliny w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym czasie nie wpływają ujemnie na działanie środka. Temperatura działania 5-22°C
Chwasty dwuliścienne		**Galmet 20 SG + Asystent 90 EC** **IP**	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistne	**30 g/ha + (0,1%)**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Primstar 20 SG + Asystent 90 EC **IP**	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistne	**30 g/ha + (0,1%)**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Superherb 20 SG + Asystent 90 EC **IP**	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistne	**30 g/ha + (0,1%)**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Mover 75 WG + Atpolan Bio 80 EC** **IP**	piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B	Nalistne	**100-120 g/ha + 1,0 l/ha**	1	60	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Nomad 75 WG + Atpolan Bio 80 EC **IP**	piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B	Nalistne	**100-120 g/ha + 1,0 l/ha**	1	60	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne		**Fenoxinn 110 EC**	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	**0,7 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Fenoxinn 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC**	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku łącznego zastosowania środka Fenoxinn 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
		Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	

		Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
Chwasty jednoliścienne		**Herbos 110 EC**	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	**0,7 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Herbos 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC**	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	

		Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku łącznego zastosowania środka Herbos 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
		Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	

Chwasty jednoliścienne		**Monarchi 110 EC**	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	**0,7 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Monarchi 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC**	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku łącznego zastosowania środka Monarchi 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
		Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	

		Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-32 (wiosną od początku krzewienia do drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Agria 2,4 DeFlor-aminopyralid 195 SE** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Kantor Forte 195 SE **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Kojot Forte 195 SE **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Mustang Forte 195 SE **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Starane 333 EC **IP**	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych w postaci estru fluroksypyr 1-metyloheptylu) - 333 g/l (31,56%)	O	Nalistne	**0,54 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 23-33 (wiosną od trzech rozkrzewień do trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Agritox 500 SL** **IP**	MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%)	O	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 22-30 (wiosną od dwóch rozkrzewień do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Finish SX 40 SG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3% (333 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,7% (67 g/kg) + adiuwant	B, B	Nalistne	**60-75 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 23-29 (wiosną od trzeciego rozkrzewienia do końca krzewienia)									

Miotła zbożowa i niektóre chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Protugan 500 SC** **IP**	izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (46,29 %)	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 23-30 (wiosną od trzech rozkrzewień do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Dobler 50 SC** **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,83 %)	B	Nalistne	**0,08-0,1 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25 (wiosną w fazie pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tolurex 500 SC** **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25-29 (wiosną w fazie od pełni do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Gradio 74,4 SG + Trend 90 EC** **IP**	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O,B	Nalistne	**0,8-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar Power 74,4 SG + Trend 90 EC **IP**	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O,B	Nalistne	**0,8-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25-32 (wiosną od pełni krzewienia do końca fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Faraon 75 WG** **IP**	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**20-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Grodyl 75 WG **IP**	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**20-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tamigan 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tomigan 250 EC	fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego - 250 g/l (24,78%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25-33 (wiosną od pełni krzewienia do końca fazy trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Coma 20 WG** **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Desperado 20 WG **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pike 20 WG **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Winnetou 20 WG **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 26-32 (wiosną od 6 rozkrzewień do końca fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Triben Super 50 SG** **IP**	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistne	**30-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Trimax 50 SG **IP**	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistne	**30-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tristar 50 SG **IP**	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistne	**30-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 31-39 (wiosną od pierwszego kolanka do całkowicie wykształconego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tomigan Forte 102,5 SE** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (10,07%)	B, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

FAZA ROZWOJOWA BBCH 32-37 (wiosną od drugiego kolanka do poczatku liścia flagowego									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Alladyn 71,4 WG** **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) –714 g/kg (71,4%)	B	Nalistne	**0,07 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 85-87 (dojrzałość woskowa miękka do twardej)									
Desykacja i równoczesne nieselektywne niszczenie chwastów	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Acomac** **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (36%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Agenor 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego
		Azymut 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Boom Efekt 360 SL **IP**	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	**3,0-4,0 l/ha**	1	7	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Clayton Rhizeup SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Cordian 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	**3,2-4,0 l/ha**	1	7	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Etna 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,76%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Figaro 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

		Glifto 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) 360 g/l (30,7%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Glifto Duo 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30.7%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Helosate Plus 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	**3,2-4,0 l/ha**	1	7	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Katamaran 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Rofosat Agro 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (31%)	G	Nalistne	**2,0-4,0 l/ha**	1	ND	Dawkę środka należy dobrać wg wrażliwości występujących gatunków chwastów. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Najlepiej zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj. po około 21 dniach.
		Roundup 360 Plus **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 360 g/l (28,77%)	G	Nalistne	**1,875-4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Roundup 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Roundup Trans Energy 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (34,5%)	G	Nalistne	**1,5-3,2 l/ha**	1	10	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Roundup Ultra 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,87%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

		Torinka SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (36%).	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Vesuvius **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,7%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

CHOROBY									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość**	**Grupa chemiczna**	**Działanie**	**Dawka [kg (l)/ha]**	**Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
PRZED SIEWEM									
ZGORZEL SIEWEK (kompleks patogenów)	**Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju roślin.**	**Baytan Trio 180 FS** **IP**	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Beret Trio 060 FS **IP**	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole, fenylopirole, triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Celest 025 FS **IP**	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Celest Trio 060 FS **IP**	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole, fenylopirole, triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Dublo 080 FS **IP**	tritikonazol (20 g/l), prochloraz kompleks z miedzią (60 g/l)	triazole, imidazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Gizmo 060 FS **IP**	tebukonazol (60 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	

		Jockey New 113 FS **IP**	fluchinkonazol (100 g/l), prochloraz (13,3 g/l)	triazole, imidazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**750 ml**	nie dotyczy	nie dotyczy	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści i mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017.
		Kinto Duo 080 FS **IP**	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	midazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Maredo 400 FS **IP**	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**21 ml + 300 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Maxim 025 FS **IP**	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Omnix 025 FS **IP**	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**201 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Premis 025 FS **IP**	tritikonazol (25 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Premis Pro 080 FS **IP**	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	

		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Sarox T 500 FS IP	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy, ditiokarbaminiany	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**300 ml + 700 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Vabank 080 FS	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy, fenylopirole, triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Zaprawa Domnic 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS IP	karboksyna (375 g/l), tiuram (375 g/l)	karboksyanilidy, ditiokarbaminiany	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 g + 800 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
PLEŚŃ ŚNIEGOWA ZBÓŻ I TRAW (*Monographella nivalis* , anamorfa: *Microdochium nivale*)	**Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej**	Baytan Trio 180 FS IP	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	

	podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju roślin	**Beret Trio 060 FS** **IP**	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole, fenylopirole, triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Celest 025 FS **IP**	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Celest Trio 060 FS **IP**	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole, fenylopirole, triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Dublo 080 FS **IP**	tritikonazol (20 g/l), prochloraz kompleks z miedzią (60 g/l)	triazole, imidazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Jockey New 113 FS **IP**	fluchinkonazol (100 g/l), prochloraz (13,3 g/l)	triazole, imidazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**750 ml**	nie dotyczy	nie dotyczy	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści i mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017.
		Kinto Duo 080 FS **IP**	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	

		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	midazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Maredo 400 FS **IP**	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**21 ml + 300 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Maxim 025 FS **IP**	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Omnix 025 FS **IP**	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**201 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Premis 025 FS **IP**	tritikonazol (25 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Premis Pro 080 FS **IP**	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Real Super 080 FS **IP**	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Sarox T 500 FS **IP**	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy, ditiokarbaminiany	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**300 ml + 700 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	

		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Vabank 080 FS	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy, fenylopirole, triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA (*Gaeumannomyces graminis* , anamorfa: *Harpophora* spp.)	**Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju roślin.**	Jockey New 113 FS IP	fluchinkonazol (100 g/l), prochloraz (13,3 g/l)	triazole, imidazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**750 ml**	nie dotyczy	nie dotyczy	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści i mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017.
ŚNIEĆ CUCHNĄCA PSZENICY (*Tilletia caries*)	**Prawidłowy płodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju**	Difend 30 FS IP	difenokonazol (30 g/l)	triazole	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Dublo 080 FS IP	tritikonazol (20 g/l), prochloraz kompleks z miedzią (60 g/l)	triazole, imidazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	

	warunków do rozwoju roślin.	**Kinto Duo 080 FS IP**	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	midazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
		Vabank 080 FS	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	nie dotyczy	nie dotyczy	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 29-32 (KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2.)									
ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓZ I TRAW (*Oculimacula acuformis* , *Oculimacula yallundae*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	**Allegro 250 SC IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	

		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI (*Gibberella avenacea* , *Gibberella zeae, Gibberella* sp.)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	**Allegro 250 SC IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	

		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny,	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (*Puccinia triticina*) **SEPTORIOZA LIŚCI** (*Phaeosphaeria nodorum*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	

		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego.
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	.
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	

		Pixel Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg**	2/22	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego.
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (*Pyrenophora tritici-repentis*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	

		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg**	2/21	45	

		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	

		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		

		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*)	**Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie**	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.

	azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych.	**Andros 750 EC IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75/ha**	2/14	42	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017

SEPTORIOZA LIŚCI (*Phaeosphaeria nodorum*)	**Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.**	**Allegro 250 SC IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l)	karboksyamidy,	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	**1,0 l/ha**	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		

		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
RDZA BRUNATNA (*Puccinia recondita* f. sp. *tritici*)	**Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.**	Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (*Rhynchosporium secalis*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	.
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	

		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		

		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 41-49 (POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO FAZY WIDOCZNYCH PIERWSZYCH OŚCI)**									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (*Puccinia triticina*) **SEPTORIOZA LIŚCI** (*Phaeosphaeria nodorum*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	

		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego.
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	.
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	

		Pixel Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Propico 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego.
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		

		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	

		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Venturo 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		

		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (*Pyrenophora tritici-repentis*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	**Acanto Prima 38 WG IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		

		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	

		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Falcon 460 EC	[illegible] (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg**	2/21	45	

		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	

		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	

		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*)	**Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.**	**Altan 750 EC IP**	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75/ha**	2/14	42	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
RDZA BRUNATNA (*Puccinia recondita* f. sp. *tritici*)	**Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.**	Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
SEPTORIOZA LIŚCI (*Phaeosphaeria nodorum*)	**Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.**	Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l),	karboksyamidy,	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	**1,0 l/ha**	2/21		
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Sigma 215 S.C.	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (*Rhynchosporium secalis*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią,**	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	

	właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Amadeus 225 EC IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Comet 200 EC	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	.
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	

		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
FAZA ROZWOJOWA									

BBCH 51-59 (KŁOSZENIE)									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (*Puccinia triticina*) **SEPTORIOZA LIŚCI** (*Phaeosphaeria nodorum*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	**Acanto Prima 38 WG IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do fazy pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	

		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do fazy pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Bukat 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**		35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego.
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Zabieg można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.

		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	.
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	

		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować do pełni kłoszenia (BBCH 55).
		Propico 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować do pełni kłoszenia (BBCH 55).

		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego.
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	

		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Venturo 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do fazy kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
		Venturo 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l /ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Venturo 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l /ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l /ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (*Pyrenophora tritici-repentis*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	**Acanto Prima 38 WG IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.

		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	

		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55)
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	

		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).

		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	

		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		

		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*)	**Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.**	**Altan 750 EC IP**	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75/ha**	2/14	42	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
RDZA BRUNATNA (*Puccinia recondita* f. sp. *tritici*)	**Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.**	Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55)
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
SEPTORIOZA LIŚCI (*Phaeosphaeria nodorum*)	**Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.**	Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017. Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (*Rhynchosporium secalis*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	.
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	

		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		

		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
SEPTORIOZA PLEW (*Phaeosphaeria nodorum*)	**Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.**	Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do fazy pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)

		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73).
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do fazy pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

		Bukat 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)

		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		

		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73)
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	

		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017. Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73).
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.

		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Venturo 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do fazy kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
		Venturo 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	32	

		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, morfoliny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ (*Gibberella avenacea* , *Gibberella zeae* , *Gibberella* sp., *Monographella nivalis*)	**Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).**	**Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		W przypadku silnego zagrożenia fuzariozą kłosów można stosować po zakonczeniu kwitnienia.
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		W przypadku silnego zagrożenia fuzariozą kłosów można stosować po zakonczeniu kwitnienia.
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**			Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	

		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Zabieg można przedłużyć do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Zabieg można przedłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Zabieg można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	45	Zabieg można wykonać również po zakończeniu kwitnienia (BBCH 69).
CZERŃ ZBÓŻ (*Alternaria* spp., *Cladosporium* spp.)	**Zapobieganie rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).**	Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	

		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w trakcie kwitnienia.
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,8 l/ha**		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017

SZKODNIKI									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość**	**Grupa chemiczna**	**Działanie**	**Dawka [kg (l)/ha]**	**Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12–29 (faza 2 liścia – koniec krzewienia)									
Mszyce (Aphidodea) – wektory chorób wirusowych	**Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N).**	**Karate Zeon 100 CS**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,4%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,075 l/ha**	2 / 10 dni	28	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją. W razie konieczności stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 49–69 (Początek kłoszenia – koniec kwitnienia)									
Skrzypionka zbożowa (*Oulema melanopa* L.) Skrzypionka błękitek (*Oulema cyanella* Voet.)	**Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, prawidłowy płodozmian, wysiew odmian, które wcześniej się kłoszą i dojrzewają, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie.**	**Achilles 100 SC IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018 r.**
		AlstarPro 100 EW	zeta-cypermetryna – 100 g/l	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	1(2) / 10 dni	21	**UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.**
		Ammo Super 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	21	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 1.08.2017 r.**
		Bunt 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018 r.**
		Fury 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	21	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 1.08.2017 r.**
		Helm Lambda 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Minuet 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	21	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 1.08.2017.**
		Spadix 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018 r.**

		Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,25 L/ha**	1	28	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sutra 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018.**
		Titan 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	28	**UWAGA: Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2017 r.**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 50–75 (Początek kłoszenia – dojrzałość mleczna)									
Mszyce *(Aphididae)*	**Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, wysiew odmian, które wcześniej się kłoszą i dojrzewają, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N), ochrona naturalnych wrogów mszyc (np. biedronkowatych).**	**Achilles 100 SC IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018 r.**
		AlstarPro 100 EW	zeta-cypermetryna – 100 g/l	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	1(2) / 10 dni	21	**UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.**
		Ammo Super 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	21	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 1.08.2017 r.**
		Bunt 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018 r.**
		Fury 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	21	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 1.08.2017 r.**
		Helm Lambda 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Minuet 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	21	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 1.08.2017.**
		Spadix 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018 r.**
		Sparviero IP	lambda-cychalotryna –100 g/l (9,53%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,075 l/ha**	1	28	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018.**
		Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,25 L/ha**	1	28	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sutra 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,04-0,05 l/ha**	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2018.**
		Titan 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	**0,1 l/ha**	bd	28	**UWAGA: Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. Termin dopuszczenia środka do stosowania 30.06.2017 r.**