INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PROGRAM OCHRONY PSZENŻYTA OZIMEGO

Program przygotowany w ramach zadania 1.2
„*Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych*”
ogram Wieloletni na lata 2016 – 2020
„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”
finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poznań 2018

Program opracowany pod redakcją:
prof. dr hab. Marka Korbasa

Autorzy:
Chwasty - dr hab. Roman Kierzek, mgr inż. Krystyna Miklaszewska
Choroby - prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, mgr inż. Jakub Danielewicz
Szkodniki - prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr Przemysław Strażyński

FAZY ROZWOJOWE

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony)



Komentarz:

Program integrowanej ochrony pszenżyta ozimego przed chorobami, szkodnikami i chwastami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w kwietniu 2018 roku.

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

CHWASTY									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna**	**Mechanizm działania substancji aktywnej (wg HRAC)**	**Działanie**	**Dawka kg(l)/ha (stężenie %)**	**Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00 (bezpośrednio po siewie)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Du Pont Glean Strong 54 WG** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 417 g/kg (41,7%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 125 g/kg (12,5%)	F1, B	Doglebowe	**120 g/ha**	1	ND	Nie stosować w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20°C lub/i w okresie dużego nasłonecznienia, oraz gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C i przewiduje się taką amplitudę do tygodnia po zabiegu,
		Glean 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 0-15°C
		Nuher 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 0-15°C
		Vernal 250 EC	flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g/l	F1	Doglebowe	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Racer 250 EC	flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g/l	F1	Doglebowe	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Maraton 375 SC **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 250 g/l, izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika)- 125 g/l	K1, C2	Doglebowe	**4,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00 - Kw (bezpośrednio po siewie do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Herold 600 SC** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,25-0,35 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-13 (bezpośrednio po siewie do fazy trzech liści)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Boxer 800 EC** **IP**	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-21 (bezpośrednio po siewie do początku krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych								
		Legato Plus 600 SC **IP**	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) - 100 g /l (8,9%), izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (44,6%)	F1, C2	Doglebowe / Nalistne	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pontos	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 240 g/l (20,98%) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (8,74%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	**0,5-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Protekt Plus 600 SC **IP**	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) – 100 g/l (10%), izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (44,8%).	F1, C2	Doglebowe / Nalistne	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10-13 (jesienią od szpilkowania do fazy trzech liści)									

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Battle Delta 600 SC** **IP**	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	**0,35 l/ha**	1	ND	Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych w normalnym cyklu zmianowania. Środka nie stosować: na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, mokre, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, po długotrwałej suszy, na gleby podmokłe, piaszczyste, gleby bardzo lekkie lub kamieniste itd. Środek może spowodować przemijające objawy fitotoksyczności m in. chlorozy. Mają one jednak charakter przemijający i nie wpływają na poziom plonowania zbóż.
		Cayman Pro 440 SC **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	**2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Ordago Pro 440 SC **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	**2,5 l/ha**	1	ND	Środek stosować na dobrze uprawioną, bez grud, glebę
		Expert Met 56 WG **IP**	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%)	C1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,35 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10 - 25 (od szpilkowania do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Expert 600 SC** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,25-0,35 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Komandos 560 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,4-0,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Kompleks 560 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,4-0,5 l/ha**	1	ND	Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.
		Komplet 560 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	**0,4-0,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Picona** **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 320 g/l (28,83%) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 16 g/l (1,44%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	**2,0-3,0**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-Kw (od fazy pierwszego liścia do końca wegetacji)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Arubis 50 SG** **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**25-37,5 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Spoton 50 SG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**25-37,5 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Surfer 50 SG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**25-37,5 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-12 (jesienią od fazy pierwszego do drugiego liścia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Maraton 375 SC** **IP**	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 250 g/l, izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika)- 125 g/l	K1, C2	Doglebowe / Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pendigan 330 EC + Protugan 500 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 330 g/l (33,9 %) + izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (46,29 %)	K1 + C2	Doglebowe / Nalistne	**3,0 l/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: -na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą, -w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin. Środka nie mieszać z glebą.
		Yellow Hammer 330 EC + Protugan 500 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 330 g/l + izoproturon (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (46,29 %)	K1 + C2	Doglebowe / Nalistne	**3,0 l/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczenia. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich o większej zawartości próchnicy.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-23 (jesienią od pierwszego liścia do trzech rozkrzewień)									

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Bizon** **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Buffalo **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Legion **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Viper **IP**	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-29 (jesienią od pierwszego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Du Pont Glean Strong 54 WG** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 417 g/kg (41,7%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 125 g/kg (12,5%)	F1, B	Doglebowe / Nalistne	**120 g/ha**	1	ND	Nie stosować w temperaturze (mierzonej przy gruncie) powyżej 20°C lub/i w okresie dużego nasłonecznienia, oraz gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C i przewiduje się taką amplitudę do tygodnia po zabiegu.
		Lexus 50 WG **IP**	flupyrsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Doglebowe / Nalistne	**20 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-30 (jesienią od pierwszego liścia do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Glean 75 WG** **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe / Nalistne	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 8-15°C
		Nuher 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe / Nalistne	**20-25 g/ha**	1	ND	Środek można stosować na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5. Wyższą dawkę stosować do zwalczania przytuli czepnej i miotły zbożowej. Temperatura działania 8-15°C
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-Kw (jesienią od fazy drugiego liścia do końca wegetacji - do pierwszych przymrozków)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tolurex 500 SC** **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	**1,5-2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Axial One 50 EC **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**0,75-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Axial Komplett **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**0,75-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-14 (jesienią od fazy drugiego do czwartego liścia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Trinity 590 SC** **IP**	diflufenikan - (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,5%), chlorotoluron - (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l (21,7%), pendimetalina - (związek z grupy dinitroanilin) - 300 g/l (26,1%)	F1, C2, K1	Doglebowe / Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-15 (jesienią od fazy drugiego do piątego liścia)									
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-25 (jesienią od trzeciego liścia do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Alister Grande 190 OD** **IP**	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) - 180 g/l (17,39 %) mezosulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6 g/l (0,58 %) jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4,5 g/l (0,43 %)	F1, B, B	Nalistne	**0,8-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-29 (jesienią od trzeciego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Dyplomata 600 SC** **IP**	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %) diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F1	Nalistne	**1,25-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Snajper 600 SC **IP**	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %), diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F1	Nalistne	**1,25-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Ranga 75 WG** **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**20 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13 - Kw (od fazy trzeciego liścia do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Axial 50 EC** **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	**0,6-0,9 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fraxial 50 EC **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	**0,6-0,9 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Huzar 05 WG** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5 %	B	Nalistne	**0,15-0,20 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Dicurex Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%).	C2	Nalistne	**2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Lentipur Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	**2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Legato Pro 425 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 25 g/l (2,2%) chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 400 g/l (35,7%)	F1, C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 14-23 (od fazy czwartego liścia do fazy trzech rozkrzewień)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Adiunkt 500 SC** **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1	Nalistne	**0,24-0,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Herubin 500 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1	Nalistne	**0,24-0,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Saper 500 SC **IP**	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1	Nalistne	**0,24-0,3 l/ha**	1	ND	Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej. Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-29 (jesienią od początku do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Aminopielik Super 464 SL** **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,73%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,37%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-25 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Attribut 70 SG** **IP**	propoksykarbazon sodowy (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 70%.	B	Nalistne	**60-100 g/ha**	1	ND	Wyższą dawkę stosować do zwalczania perzu właściwego
		Dicurex Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Lentipur Flo 500 SC **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-29 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Norton 069 EW** **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistne	**1,0-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Rumba 069 EW **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistne	**1,0-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Flash 069 EW	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistne	**1,0-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Norton 069 EW + Atpolan 80 EC **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%) + adiuwant	F1	Nalistne	**0,5 +1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Rumba 069 EW + Atpolan 80 EC **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%) + adiuwant	F1	Nalistne	**0,5 +1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Concert SX 44 SG** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 % (400 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4 % (40 g/kg)	B, B	Nalistne	**0,15 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Huzar 05 WG **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5 %	B	Nalistne	**0,15-0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Huzar 100 OD **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100g/l	B	Nalistne	**75-100 ml/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Huzar Activ 387 OD	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l (0,95 %), 2,4-D -(związek z grupy fenoksykwasów)– 377 g/l (35,87%)	B, O	Nalistne	**0,75-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Maczeta OD 125** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g /l, amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 100 g /l	B, B	Nalistne	**0,15 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-30 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Atlantis 12 OD** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 2 g/l, mezosulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/l	B, B	Nalistne	**0,45-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Glean 75 WG** **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**10-15 g/ha**	1	ND	Środek stosowany wiosną zwalcza tylko chwasty dwuliścienne, a ogranicza występowanie miotły.
		Nuher 75 WG **IP**	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**10-15 g/ha**	1	ND	Środek stosowany wiosną zwalcza tylko chwasty dwuliścienne, a ogranicza występowanie miotły.
		Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (789g/l) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Ranga 75 WG + Silwett **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Platform 61,5 SG **IP**	karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin)– 15 g/kg (1,5%) mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g/kg (60%)	E, O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-31 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy pierwszego kolanka)									
Miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Toto 75 SG** **IP**	tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg (68,2%), metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%)	B, B	Nalistne	**70-90 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tara	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%), piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/kg (5,0%), aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 50 g/kg (5,0%)	B, B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha + adiuwant**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tytan 75 SG **IP**	tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg (68,2%), metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%)	B, B	Nalistne	**70-90 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-32 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Axial One 50 EC** **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**1,0-1,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Axial Komplett **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	**1,0-1,3 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

Chwasty jednoliścienne		**Foxtrot 069 EW** **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	**1,0-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Foxtrot 069 EW + Atpolan 80 EC **IP**	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%) + adiuwant	A	Nalistne	**0,5 + 1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Apyros 75 WG + Atpolan 80 EC** **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Po zbiorze rośliny uprawnej na jesieni można uprawiać tylko zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę w przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraka cukrowego. Uwaga! Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Apyros 75 WG.
		Nylon 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Jesienią po zbiorze pszenicy i pszenżyta na polach, na których był zastosowany środek ochrony roślin Nylon 75 WG, jako rośliny następcze można uprawiać zboża i rzepak ozimy. Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków, które można uprawiać w drugim sezonie wegetacyjnym (po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu środka). W przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, choroby, szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą i ziemniak.
		Ogar + Atpolan 80 EC **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Zboża ozime i rzepak ozimy – po zbiorze roślin uprawnych, jesienią w tym samym sezonie wegetacyjnym, Wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraków – na wiosnę w kolejnym sezonie wegetacyjnym, Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Ogar.
		Portos + Atpolan 80 EC **IP**	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	**13,3-26,5 g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji spowodowanej uszkodzeniem roślin uprawnych przez mróz, szkodniki, choroby, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie pszenicę jarą i ziemniaki. Po zbiorze rośliny uprawnej na jesieni można uprawiać tylko zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę w przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraka cukrowego. Uwaga! Przestrzegać zaleceń
Chwasty dwuliścienne		**Fluroherb 200 EC**	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Galaper 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Herbistar 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	**0,6-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Bron 500 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Triben X 500 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Trimmer 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistne	**30-35 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-37 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy początku liścia flagowego)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Aneks SX 50 SG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10% + adiuwant	B, B	Nalistne	**120-150 g/ha + 0,1%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Rubin SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10% + adiuwant	B, B	Nalistne	**120-150 g/ha + 0,1%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Calibre SX 50 SG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pragma SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar Ultra SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Picaro SX 50 SG + Trend 90 EC **IP**	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	**48-60 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fluxyr 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200g/l (20,29%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych, - na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki, - w czasie występowania przymrozków. Słoma z poddanych opryskowi roślin powinna zostać usunięta, może być wykorzystania jedynie jako ściółka dla zwierząt gospodarskich.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-29 (wiosną od fazy drugiego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tomigan Forte 102,5 SE** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (10,07%)	B, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-31 (wiosną od fazy 2 liści do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Chisel Nowy 51,6 WG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 469g/kg (46,9%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 47 g/kg (4,7%). + adiuwant	B, B	Nalistne	**90 g/ha +0,1%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-32 (wiosną od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Camaro 306 SE** **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Diablo 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Dresz 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Eguo 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Feniks 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

		Horse 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		King 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Kojot 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Muskato 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Mustang 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Vima-Florasulam 2,4 D	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Rumak 306 SE **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	**0,4-0,6 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-39 (wiosna od fazy 2 lisci do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Lumer 50 WG** **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach agrotechnicznych.
		Minstrel	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 288 g/l (28,6%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-29 (wiosną od fazy 3 liści do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Aurora 40 WG** **IP**	karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 40%	E	Nalistne	**50 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fox 480 SC **IP**	bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l (40,6 %)	E	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-31 (wiosną od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Gold 450 EC**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 360 g/l (33,68%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 90 g/l (8,42%).	O, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-32 (wiosną od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Kantor Perfect 325 SC** **IP**	chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (25.86 %) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 25 g/l (2,16%)	O, B	Nalistne	**0,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Kantor 050 SC **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84 %)	B	Nalistne	**0,08-0,1 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Saracen 050 SC **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%)	B	Nalistne	**0,1 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-37 (wiosną od fazy 3 liści do fazy początku liścia flagowego)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Axial 50 EC** **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	**0,6-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Fraxial 50 EC **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	**0,6-1,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty dwuliścienne		**Starane 250 EC**	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Taran 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-39 (wiosną od fazy 3 liści do w pełni rozwiniętego liścia flagowego)									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Biathlon 4 D + Dash HC** **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 714 g/kg (71,4%), florasulam - związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 54 g/kg (5,4%) + adiuwant	B, B	Nalistne	**0,04-0,07 l/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Hadden 550 WG **IP**	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistne	**0,08-0,1 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Nautius WG **IP**	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistne	**0,08-0,1 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pygmee 550 WG **IP**	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistne	**0,08-0,1 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Blusky 500 WG **IP**	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	**16-20 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Mofat 500 WG **IP**	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	**16-20 g/ha**	1	ND	Silne opady występujące wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		Tivmetix OD **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 19 g/l (1,87%) tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 190 g/l (18,72%)	B, B	Nalistne	**0,2 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-29 (wiosną od początku do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Jatagan 75 WG** **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	50	Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność działania środka. W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin. Co roczne stosowanie herbicydu Jatagan WG na tym samym polu może doprowadzić do uodpornienia się chwastów na substancje czynne herbicydu.
		Mocarz 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Nokaut 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Siłacz 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Siłacz Max 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Sekator 125 OD** **IP**	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,21%), amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)	B, B	Nalistne	**0,15 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

Chwasty dwuliścienne		**Aminopielik D MAXX 430 EC** **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l (35,84%), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l (5,15%)	O, O	Nalistne	**1,0-1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Aminopielik Super 464 SL **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,73%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,37%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Dicopur Top 464 SL **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tayson 464 SL **IP**	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox 500 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox 750 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox Extra 300 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)	O	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Chwastox Professional 750 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, buraki.
		Chwastox Turbo 340 SL **IP**	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)	O, O	Nalistne	**2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Premier 300 SL **IP**	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%)	O	Nalistne	**3,0 l/ha**	1	ND	W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować przemiennie z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
		Premier 500 SL **IP**	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: – na rośliny chore i uszkodzone, – w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C, – w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C, – w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
		Premier 750 SL **IP**	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)	O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: – na rośliny chore i uszkodzone, – w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C, – w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C, – w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
		Premier D 750 SL **IP**	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Środka nie stosować: – na rośliny chore i uszkodzone, – w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C, – w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C, – w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

FAZA ROZWOJOWA

BBCH 21-30 (wiosną od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło)

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Chwastox Trio 540 SL** **IP**	mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%) MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 200 g/l (16,20%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w postaci soli potasowej) - 40 g/l (3,24%)	O, O, O	Nalistne	**2,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Bron 500 SG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar 75 WG + Trend 90 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistne	**20-25 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Helm Tribi 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tribex 75 WG + Atpolan 80 EC **IP**	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	**20-25g/ha + 1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-31 (wiosną od początku krzewienia do pierwszego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Dragon 450 WG** **IP**	florasulam – (związek z grupy triazolopirymidyn) – 150 g/kg (15%) aminopyralid – (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) – 300 g/kg (30%)	B, O	Nalistne	**33,3 g/ha**	1	ND	Temperatura działania 5-22°C
		Dragon NT 450 WG **IP**	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15%) aminopyralid - (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 300 g/kg (30%)	B, O	Nalistne	**33,3 g/ha**	1	ND	Temperatura działania 5-22°C
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa		**Dragon NT 450 WG + Nomad 75 WG + Atpolan Bio 80 EC lub Olstick 90 EC** **IP**	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15%) aminopyralid - (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 300 g/kg (30%) + piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B, O + B	Nalistne	**33 + 120 g/ha + 1,0 l/ha**	1	ND	Temperatura działania 5-22°C
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Lancet Plus 125 WG** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%) piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/kg (5,0%) aminopyralid (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 50 g/kg (5%)	B, B, O	Nalistne	**0,2 kg/ha**	1	ND	Środek wnik ado rośliny w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym czasie nie wpływają ujemnie na działanie środka. Temperatura działania 5-22°C
Chwasty dwuliścienne		**Galmet 20 SG + Asystent 90 EC** **IP**	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistne	**30 g/ha + (0,1%)**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Primstar 20 SG + Asystent 90 EC **IP**	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistne	**30 g/ha + (0,1%)**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Superherb 20 SG + Asystent 90 EC **IP**	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistne	**30 g/ha + (0,1%)**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Mover 75 WG + Atpolan Bio 80 EC** **IP**	piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B	Nalistne	**100-120 g/ha + 1,0 l/ha**	1	60	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Nomad 75 WG + Atpolan Bio 80 EC **IP**	piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B	Nalistne	**100-120 g/ha + 1,0 l/ha**	1	60	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego

Chwasty jednoliścienne		**Fenoxinn 110 EC**	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	**0,7 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Fenoxinn 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC**	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku łącznego zastosowania środka Fenoxinn 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
		Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	

		Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Fenoxinn 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
Chwasty jednoliścienne		**Herbos 110 EC**	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	**0,7 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Herbos 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC**	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	

		Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku łącznego zastosowania środka Herbos 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
		Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Herbos 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
Chwasty jednoliścienne		**Monarchi 110 EC**	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	**0,7 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, na której stosowano środek Monarchi 110 EC (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać na tym polu wszystkie rośliny.

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne		**Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Galaper 200 EC**	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku łącznego zastosowania środka Monarchi 110 EC ze środkami Trimax 50 SG (Triben Super 50 SG, Tristar 50 SG) i Galaper 200 EC (Fluroherb 200 EC, Herbistar 200 EC) koniecznym jest przestrzeganie zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykietach w/w środków ochrony roślin lub też dobór i uprawę roślin następczych należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia.
		Monarchi 110 EC + Trimax 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Galaper 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	

		Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Fluroherb 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
		Monarchi 110 EC + Triben Super 50 SG + Herbistar 200 EC	fenoskaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%) + tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	A, B, O	Nalistny	**0,5 l/ha + 25 g/ha + 0,4 l/ha**	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-32 (wiosną od początku krzewienia do drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Agria 2,4 DeFlor-aminopyralid 195 SE** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Kantor Forte 195 SE **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Kojot Forte 195 SE **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Mustang Forte 195 SE **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	**1,0 l/ha**	1	60	Temperatura działania 5-25°C
		Tomahawk 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 200g/l (20,41%)	O	Nalistne	**0,9 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Starane 333 EC **IP**	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych w postaci estru fluroksypyr 1-metyloheptylu) - 333 g/l (31,56%)	O	Nalistne	**0,54 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 23-33 (wiosną od trzech rozkrzewień do trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Agritox 500 SL** **IP**	MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%)	O	Nalistne	**1,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 22-30 (wiosną od dwóch rozkrzewień do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Finish SX 40 SG + Trend 90 EC** **IP**	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3% (333 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,7% (67 g/kg) + adiuwant	B, B	Nalistne	**60-75 g/ha + 0,05%**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 23-30 (wiosną od trzech rozkrzewień do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Dobler 50 SC** **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,83 %)	B	Nalistne	**0,08-0,1 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25 (wiosną w fazie pełni krzewienia)									

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tolurex 500 SC** **IP**	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	**2,0-2,5 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25-29 (wiosną w fazie od pełni do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Gradio 74,4 SG + Trend 90 EC** **IP**	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O,B	Nalistne	**0,8-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Granstar Power 74,4 SG + Trend 90 EC **IP**	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O,B	Nalistne	**0,8-1,0 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25-32 (wiosną od pełni krzewienia do końca fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Faraon 75 WG** **IP**	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**20-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Grodyl 75 WG **IP**	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	**20-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tamigan 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tomigan 250 EC	fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego - 250 g/l (24,78%)	O	Nalistne	**0,6-0,8 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25-33 (wiosną od pełni krzewienia do końca fazy trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Coma 20 WG** **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Desperado 20 WG **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Pike 20 WG **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Winnetou 20 WG **IP**	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	**30 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 26-32 (wiosną od 6 rozkrzewień do końca fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Triben Super 50 SG** **IP**	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistne	**30-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Trimax 50 SG **IP**	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistne	**30-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
		Tristar 50 SG **IP**	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistne	**30-40 g/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 31-39 (wiosną od pierwszego kolanka do całkowicie wykształconego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Tomigan Forte 102,5 SE** **IP**	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (10,07%)	B, O	Nalistne	**1,0-1,25 l/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 32-37 (wiosną od drugiego kolanka do poczatku liścia flagowego									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Alladyn 71,4 WG** **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) –714 g/kg (71,4%)	B	Nalistne	**0,07 kg/ha**	1	ND	Preparat rozkłada się bezpiecznie w trakcie sezonu wegetacyjnego
FAZA ROZWOJOWA BBCH 85-87 (dojrzałość woskowa miękka do twardej)									

Desykacja i równoczesne nieselektywne niszczenie chwastów	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	**Acomac** **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (36%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Agenor 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego
		Azymut 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Boom Efekt 360 SL **IP**	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	**3,0-4,0 l/ha**	1	7	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Clayton Rhizeup SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Cordian 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	**3,2-4,0 l/ha**	1	7	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Etna 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,76%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Figaro 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Glifto 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) 360 g/l (30,7%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

		Glifto Duo 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30.7%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Helosate Plus 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	**3,2-4,0 l/ha**	1	7	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Katamaran 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Rofosat Agro 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (31%)	G	Nalistne	**2,0-4,0 l/ha**	1	ND	Dawkę środka należy dobrać wg wrażliwości występujących gatunków chwastów. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Najlepiej zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj. po około 21 dniach.
		Roundup 360 Plus **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 360 g/l (28,77%)	G	Nalistne	**1,875-4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Roundup 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Roundup Trans Energy 450 SL **IP**	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (34,5%)	G	Nalistne	**1,5-3,2 l/ha**	1	10	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Roundup Ultra 360 SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,87%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Torinka SL **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (36%).	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

		Vesuvius **IP**	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,7%)	G	Nalistne	**4,0 l/ha**	1	ND	W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Zaprawy	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
PRZED SIEWEM							
ŚNIEĆ CUCHNĄCA PSZENICY (Tilletia caries)	Prawidłowy płodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Difend 30 FS IP**	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**250 ml + 400 ml wody**	
		Dublo 080 FS IP	tritikonazol (20 g/l), prochloraz kompleks z miedzią (60 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Madron 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Vabank 080 FS	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
ZGORZEL SIEWEK (kompleks patogenów)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Baytan Trio 180 FS IP**	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), pirydynyloetylobenzamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do fazy początku strzelania w źdźbło.
		Beltone 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Celest 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Dublo 080 FS IP	tritikonazol (20 g/l), prochloraz kompleks z miedzią (60 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Fluarto 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	

		Funaben Plus 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Kinto Duo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	
		Madron 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Maredo 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	
		Maxim 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 300 ml wody**	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	

		Premis 025 FS **IP**	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Premis Pro 080 FS **IP**	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Rancona 015 ME **IP**	IPkonazol (15 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	
		Rancona 15 ME **IP**	IPkonazol (15 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	
		Rancona i-MIX ME **IP**	IPkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Real 025 FS **IP**	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Real Super 080 FS **IP**	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Redigo Pro 170 FS **IP**	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Sarox T 500 FS **IP**	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**300 ml + 700 ml wody**	
		Scenic 080 FS **IP**	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	
		Seedron 60 FS **IP**	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	
		Syrius 02 WS **IP**	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Tresser 050 FS **IP**	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.

		Trigof 50 FS **IP**	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Triter 050 FS **IP**	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
		Vabank 080 FS	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Vibrance Gold 100 FS **IP**	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Zaprawa Domnic 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS **IP**	karboksyna (375 g/l), tiuram (375 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 g + 800 ml wody**	
		Zaprawian 050 FS **IP**	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
PLEŚŃ ŚNIEGOWA ZBÓŻ I TRAW (Monographella nivalis, anamorfa: Microdochium nivale)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Baytan Trio 180 FS** **IP**	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), pirydynyloetylobenzamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do fazy początku strzelania w źdźbło.
		Beltone 25 FS **IP**	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Beret Trio 060 FS **IP**	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Celest 025 FS **IP**	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Celest Power **IP**	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS **IP**	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Dublo 080 FS **IP**	tritikonazol (20 g/l), prochloraz kompleks z miedzią (60 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Fluarto 50 FS **IP**	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	

		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Kinto Duo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	
		Madron 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Maredo 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	
		Maxim 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Maxim Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 300 ml wody**	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Omnix Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Rancona i-MIX ME IP	IPkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	

		Redigo Pro 170 FS **IP**	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Sarox T 500 FS **IP**	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**300 ml + 700 ml wody**	
		Scenic 080 FS **IP**	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	
		Sedextra Power **IP**	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Seedron 60 FS **IP**	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	
		Trigof 50 FS **IP**	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Vabank 080 FS	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Vibrance Duo **IP**	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Duo 050 FS **IP**	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Gold 100 FS **IP**	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA (Gaeumannomyces graminis, anamorfa: Harpophora spp.)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej	**Latitude XL** **IP**	siltiofam (125 g/l)	sililoamidy (C7)		**200 ml**	

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)									
Łamliwość źdźbła zbóż i traw (Oculimacula acuformis, Oculimacula yallundae) **orientacyjny prógszkodliwości:** 20–30% źdźbeł z objawami porażenia	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	

		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promax 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Pro-Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Quern 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Salento A 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spector 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI (Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp.)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	

		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (Puccinia recondita f. sp. tritici) **SEPTORIOZY LIŚCI** (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) **Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia.	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Acanto Prima 38 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5-2,0 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Artemis 450 EC **IP**	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. **Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. **Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści		**Astar 250 SC + Artea 330 EC**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cortez 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Cratos 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		District 450 EC **IP**	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	

		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Harviga **IP**	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Imbrex XE **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21		Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Inovor **IP**	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Ksykon 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Librax **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Lotus Top 140 EC **IP**	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Martens 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC **IP**	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 328 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5–2,0 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Priaxor **IP**	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Safir 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	

		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóz i traw oraz fuzaryjnej zgorzeli podsatwy źdźbła i korzeni.
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) **Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		
		Acanto Prima 38 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5-2,0 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Agria Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Aylora 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cratos 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	

		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Martens 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC **IP**	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 328 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5–2,0 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Prokonazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	

		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Travis 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Treoris 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż i traw oraz fuzaryjnej zgorzeli podsatwy źdźbła i korzeni.
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia	Altan 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Buffer 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Bumper Super 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	

	przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Fentop 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Kendo 50 EW **IP**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Leander 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Merces 50 EW **IP**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Mirage 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Posse Plus 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Promax 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Pro-Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Quern 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		
		Salento A 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spector 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
SEPTORIOZY LIŚCI (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaer ia nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Agria Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Avoca 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Aylora 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Azoxin 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bolid 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.

		Buffer 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Bumper Super 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Chloroflash 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Corbel 750 EC **IP**	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Doolin 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Frelizon 240 SC **IP**	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	2/14		
		Halny 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Impact 125 SC **IP**	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Inovor **IP**	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Limero **IP**	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Makler 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Prokonazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Posse Plus 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Rialto 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		
		Seguris 215 SC **IP**	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Travis 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Treoris 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Azoxin 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bolid 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		

		Frelizon 240 SC **IP**	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	2/14		
		Impact 125 SC **IP**	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Inovor **IP**	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Makler 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Seguris 215 SC **IP**	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) **RDZA ŹDŹBŁOWA ZBÓŻ I TRAW** (Puccinia graminis) **Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:**	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-29		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (Rhynchosporium secalis)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		

		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Lotus Top 140 EC **IP**	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	

		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO FAZY WIDOCZNYCH PIERWSZYCH OŚCI (BBCH 41–49)									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (Puccinia recondita f. sp. tritici) **SEPTORIOZY LIŚCI** (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) **Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. **Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. **Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. **Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Acanto Prima 38 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5-2,0 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ambrossio 500 SC **IP**	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1-2/21	35	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Ares 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Środek stosować od od fazy liścia flagowego (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Artemis 450 EC **IP**	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Ascom 250 SC **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

porażenia; w fazie strzelania w źdźbło20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Bukat 500 SC **IP**	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Bukat 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34). Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Capalo 337.5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cortez 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Cratos 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	

		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		District 450 EC **IP**	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Harviga **IP**	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Hutton 450 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Środek stosować od fazy liścia flagowego BBCH 37.

		Imbrex XE **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21		Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek ogranicza łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz brunatna plamistośc liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Ksykon 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Librax **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Lotus Top 140 EC **IP**	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Martens 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC **IP**	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	

		Pixel Prima 328 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5–2,0 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Priaxor **IP**	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczana mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Promax 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Propico 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Pro-Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczana mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Safir 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	

		Soprano 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	

		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zakeo Opti **IP**	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	**2-2,5 l/ha**	2/14		
		Zakeo Opti + Artea 330 EC **IP**	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) **Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		
		Acanto Prima 38 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5-2,0 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Agria Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	

		Aylora 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Cratos 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	

		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Hutton 450 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować od fazy liścia flagowego BBCH 37.
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Martens 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC **IP**	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	

		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 328 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5–2,0 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Prokonazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	

		Travis 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Treoris 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych	Altan 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Buffer 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Bumper Super 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Fentop 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Kendo 50 EW **IP**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

	resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Leander 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Merces 50 EW **IP**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Mirage 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Posse Plus 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Quern 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		
		Salento A 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spector 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) **RDZA ŹDŹBŁOWA ZBÓŻ I TRAW** (Puccinia graminis) **Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:**	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-29		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Azoxin 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bolid 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Frelizon 240 SC **IP**	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	2/14		
		Impact 125 SC **IP**	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Inovor **IP**	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Makler 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Seguris 215 SC **IP**	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY (Mycosphaerella graminicola) **SEPTORIOZA PLEW PSZENICY** (Phaeosphaeria nodorum)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Agria Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Avoca 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Aylora 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Azoxin 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bolid 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Buffer 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Bumper Super 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Chloroflash 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Corbel 750 EC **IP**	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Doolin 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Frelizon 240 SC **IP**	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	2/14		
		Halny 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Impact 125 SC **IP**	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Inovor **IP**	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Limero **IP**	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Makler 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Prokonazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Posse Plus 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Rialto 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		
		Salento A 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Seguris 215 SC **IP**	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Spector 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Travis 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Treoris 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (Rhynchosporium secalis)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	

		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Lotus Top 140 EC **IP**	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		

FAZA BBCH 51–59 (FAZA KŁOSZENIA)									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (Puccinia recondita f. sp. tritici) **SEPTORIOZY LIŚCI** (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) **Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. **Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. **Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. **Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Acanto Prima 38 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5-2,0 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Ambrossio 500 SC **IP**	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1-2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 57).
		Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Ares 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Artemis 450 EC **IP**	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

w razie strzelania w źdźbło20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Bukat 500 SC **IP**	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 57).
		Bukat 500 SC + Ares 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Capalo 337.5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Cortez 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Cratos 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	

		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Śodek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		District 450 EC **IP**	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do poczatku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Srodek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Harviga **IP**	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Hutton 450 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		
		Imbrex XE **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21		Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek ogranicza łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz brunatna plamistośc liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Ksykon 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Librax **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Srodek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Lotus Top 140 EC **IP**	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie posaida rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Martens 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC **IP**	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 328 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5–2,0 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Priaxor **IP**	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Promax 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Propico 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Pro-Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Safir 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek zarejestrowany jest również do zwalczania fuzariozy liści.
		Soprano 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		

		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zakeo Opti **IP**	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	**2-2,5 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) **Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Acanto Prima 38 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5-2,0 kg/ha**	2/21	45	
		Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agria Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	

		Aylora 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando Plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Cratos 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Credo 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC **IP**	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.

		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Hutton 450 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Martens 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador Forte 160 EC **IP**	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,75 l/ha**	1	35	

		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Pixel Prima 328 WG **IP**	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny (D1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5–2,0 kg**	2/21	45	
		Plinker 600 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,6–2,0 l/ha**	2/14	35	
		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Prokonazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Travis 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Treoris 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych	Altan 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Buffer 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Bumper Super 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Fentop 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Kendo 50 EW **IP**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

	resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Leander 750 EC **IP**	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Merces 50 EW **IP**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Mirage 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Posse Plus 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Quern 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Salento A 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spector 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) **RDZA ŹDŹBŁOWA ZBÓŻ I TRAW** (Puccinia graminis) **Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30%	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Abelard 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Rektor 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-28		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Reveller 280 SC **IP**	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	2/21-29		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Azoxin 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Bolid 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Frelizon 240 SC **IP**	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Impact 125 SC **IP**	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Inovor **IP**	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Makler 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Seguris 215 SC **IP**	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY (Mycosphaerella graminicola) **SEPTORIOZA PLEW PSZENICY** (Phaeosphaeria nodorum)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Agria Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Avoca 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Aylora 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azoxin 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Bolid 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Buffer 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Bumper Super 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chloroflash 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Corbel 750 EC **IP**	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Doolin 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Elatus Era **IP**	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Frelizon 240 SC **IP**	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Halny 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Impact 125 SC **IP**	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Inovor **IP**	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Limero **IP**	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Makler 250 SE **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mirage 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Prokonazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Posse Plus 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Rialto 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Rubric XL 300 **IP**	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/10		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Salento A 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Seguris 215 SC **IP**	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Spector 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Travis 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Treoris 350 SC **IP**	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (Rhynchosporium secalis)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus **IP**	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando 183 SC **IP**	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	

		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	
		Fandango 200 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Lotus Top 140 EC **IP**	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	

		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Secardo XE 125 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC **IP**	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 + 0,5 l/ha**	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		

SEPTORIOZA PLEW PSZENICY (Phaeosphaeria nodorum)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.	Agria Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Allegro 250 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ambrossio 500 SC **IP**	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1-2/21	35	
		Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 57).
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Artemis 450 EC **IP**	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Atak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC **IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	

		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Buffer 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Bumper Super 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Bukat 500 SC **IP**	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 57).
		Bukat 500 SC + Ares 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC **IP**	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,25 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Capalo 337,5 SE **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Ceando plus **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4-2,0 l/ha**	2/21	35	
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Chloroflash 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Cortez 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		District 450 EC **IP**	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).

		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Doolin 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Frelizon 240 SC **IP**	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Golden Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Hutton 450 EC **IP**	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		
		Impact 125 SC **IP**	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Jay 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Kask 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).

		Kloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		Medallon 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Menara 410 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	42	
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Mondatak 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Mongur 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ogam **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha + 0,5 l/ha**	2/21		
		Palazzo **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Posse 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Posse Plus 490 EC **IP**	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	42	
		Prima 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prochloraz 450 EC **IP**	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	

		Prokonazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Rialto 500 SC **IP**	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**2,0 l/ha**	1	35	
		Safir 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC **IP**	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	Środka nie stosować w okresie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tern Premium 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tern Premium 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		

		Tilt Turbo 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Tilt Turbo 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tocata **IP**	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4–2,0 l/ha**	2/21	35	
		Tocata Duo **IP**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC **IP**	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Zenit 575 EC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	1	42	
		Zenit 575 EC + Amistar 250 SC **IP**	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,6 l/ha**	1		

FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ (Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp., Monographella nivalis)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP**	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Arbiter 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Artea 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Chefara 330 EC **IP**	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	40	
		Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	

		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	W przypadku silnego zagrożenia fuzariozą kłosów środek można zastosować po zakończeniu kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,4 l/ha**	1		
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tiofan 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Tiofanat Metylowy 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Topsin M 500 SC **IP**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Wirtuoz 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14		
		Vareon 520 EC **IP**	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,25 l/ha**	2/14	35	
		Yamato 303 SE **IP**	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	
		Zantara 216 EC **IP**	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,9–1,2 l/ha**	2/21	35	W przypadku silnego zagrożenia fuzariozą kłosów środek można zastosować po zakończeniu kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Zakeo Opti + Artea 330 EC **IP**	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha**	2/14		
CZERŃ ZBÓŻ (Alternaria spp., Cladosporium spp.)	Zapobieganie rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).	Dedal 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Dubler Mega 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duett Star 334 SE **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Dultreks-Pro 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	
		Intizam 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Juwel TT 483 SE **IP**	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	
		Tandem 497 SC **IP**	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1	35	Środek nie stosować w fazie kwitnienia pszenżyta ozimego.
		Tango Star **IP**	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Osiris 65 EC **IP**	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5–2,5 l/ha**	2/21	35	

SZKODNIKI									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość**	**Grupa chemiczna (IRAC)**	**Działanie**	**Dawka [kg (l)/ha]**	**Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 49–69 (Początek kłoszenia – koniec kwitnienia)									
Skrzypionka zbożowa (*Oulema melanopa* L.) Skrzypionka błękitek (*Oulema cyanella* Voet.)	**Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, prawidłowy płodozmian, wysiew odmian, które wcześniej się kłoszą i dojrzewają, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie.**	Achilles 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Bunt 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Helm-Lambda 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Spadix 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat - 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sumicidin 050 EC	esfenwalerat - 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sutra 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół.Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 50–75 (Początek kłoszenia – dojrzałość mleczna)									
Mszyce (Aphididae)	**Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, późny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N).**	Achilles 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Bunt 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	nie dotyczy	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Helm-Lambda 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Spadix 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sparrow **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sparviero **IP**	lambda-cychalotryna –100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**

		Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat - 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sumicidin 050 EC	esfenwalerat - 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**
		Sutra 100 CS **IP**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3 A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	**UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.**