

CHOROBY

Środki ochrony roślin należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka [kg /ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)									
ŁAMLIWOŚĆ ŻDŹBŁA ZBÓŻ I TRAW <i>(Oculimacula acutiformis, Oculimacula yallundae)</i> Łamliwość żdźbła zbóż i traw: orientacyjny próg szkodliwości: 20–30% żdźbeł z objawami porażenia	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	
		Boogie Xpro 400 EC IP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksyamidy, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9-1,2 l/ha	2/21	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Input 460 EC	protiokonazol	triazole,	układowy, do	1,0 l/ha	1	35	

		IP	(160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	ketoaminy	stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego				
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŻDŹBŁA I KORZENI <i>(Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp.)</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Amadeus 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017. Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy żdźbła i korzeni.
		Aviator Xpro 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy żdźbła i korzeni.
		Delaro 325 SC	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Input 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
MAĆZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW <i>(Blumeria graminis)</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych,	Acanto 250 SC	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	

PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA (<i>Pyrenophora teres</i>) RDZA JĘCZMIENIA (<i>Puccinia hordei</i>) RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Mączniak prawdziwy zbóż i traw – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 25–35% roślin z pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło – 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. Plamistość siatkowa jęczmienia – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w źdźbło 15–20% liści z	podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol	imidazole, triazole,	powierzchniowy i układowy; do stosowania	0,75–1,25 l/ha	2/14		

objawami choroby. Rdza jęczmienia – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% powierzchni liści z pierwszymi objawami porażenia. Rynchosporioza zbóż – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w źdźbło 15–20% powierzchni liści z objawami choroby.			(160 g/l), proquinazid (40 g/l)	quinozoliny	zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, węglony i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Acanto 250 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (250 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6-1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Credo 600 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	węglony i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	

		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), ciprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protriokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamid	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), ciprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	2/12-21	35	

					zapobiegawczego				
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszania nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Boogie Xpro 400 EC IP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksyamidy, ketoaminy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9-1,2 l/ha	2	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy.
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenyłowego	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenyłowego, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	
		Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy i translaminarny, do stosowania	0,8-1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania

					zapobiegawczego i interwencyjnego				mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,6 l/ha	1	35	

			(187 g/l)		i interwencyjnego				
		Delaro 325 SC IP	protriokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Envoy + Corbel 750 EC IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	strobiluryny, triazole + morfoliny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania

									mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Fandango 200 EC IP	protriokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Frelizon 240 SC IP	pentiopiryd (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksyamidy, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Input 460 EC IP	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksikonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	

		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.

		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole + strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie

									posiada rejestrację do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszanina można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Opera Max 147,5 SE + Corbel 750 EC IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) +	strobiluryny, triazole +	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha			

			fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	i interwencyjnego				
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Opera Top + Corbel 750 EC IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	strobiluryny, triazole + morfoliny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha			
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole + morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw i rdzy jęczmienia

		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21		
		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy strzelania w żdźbło (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksyamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz 450 EC	prochloraz	imidazole	wgłębny, do	1,0 l/ha	1	35	

		IP	(450 g/l)		stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Propico 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować do końca fazy strzelania w żdźbło (BBCH

									39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Mieszaninę można stosować do końca fazy strzelania w żdźbło (BBCH 39). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole + morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	1		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	

		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	1	35	
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

					i interwencyjnego				
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować do końca fazy strzelania w zdźbło. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l),	quinozoliny + imidazole,	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania	0,15– 0,25 l/ha + 0,6–1,0	2/14		Mieszaninę środków można stosować do końca fazy

			tebukonazol (133 g/l)	triazole	zapobiegawczego i interwencyjnego	l/ha			strzelania w źdźbło (BBCH 39). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Mieszaninę środków można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania

									rynchosporiozy zbóż.
	Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35		
	Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.	
	Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.	
	Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42		
	Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35		
	Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42		
	Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35		
	Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l),	morfoliny, triazole,	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35		

			metrafenon (75 g/l)	pochodne kwasu difenylowego					
	Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
	Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
	Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35		
	Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35		
	Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35		
	Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.	
	Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.	
	Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.	

					i interwencyjnego				
		Treoris 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolinę	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło.
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolinę + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15– 0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Mieszaninę środków można stosować do

									końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14	35	
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,25 l/ha	2/14	35	Środek w zwalczaniu plamistości siatkowej jęczmienia, mączniaka prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 1,25 l/ha.
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania ryńchosporiozy zbóż.
		Vertisan 200 EC IP	pentiopirad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania	1,0 l/ha	2/14		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Vertisan 200 EC + Acanto 250 SC IP	penthiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (250 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6-1,0 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Credo 600 SC IP	penthiopyrad (200 g/l) + chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę środków można stosować do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH

									39).
		Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75– 1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	

MACZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis)</i>	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75/ha	2/14	42	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	1	48	Środek ogranicza również występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Merces 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania	0,2–0,3 l/ha	1	48	Środek ogranicza również

		IP			zapobiegawczego i interwencyjnego				występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
RDZA JĘCZMIENIA (Puccinia hordei)		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,0 l/ha	2/14	28	

					wyniszczającego				
		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	
RAMULARIOZA JĘCZMIENIA (<i>Ramularia collo- cygni</i>)		Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		

		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017r.
PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA (Pyrenophora teres)		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego,	1,0 l/ha	2/14	28	

					interwencyjnego i wyniszczającego				
POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO POCZĄTKU FAZY KŁOSZENIA, A NIEKIEDY DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 41–59)									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>) PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA (<i>Pyrenophora teres</i>) RDZA JĘCZMIENIA (<i>Puccinia hordei</i>) RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębnny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębnny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Amadeus 225 EC IP	protikonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.

		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1-2/21	35	Środek można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 60% widocznego kwiatostanu (BBCH 56). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek nie

									posiada rejestrację do zwalczania ryńchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania ryńchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania ryńchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

			(250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)		zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75– 1,25 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Acanto 250 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (250 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6-1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Credo 600 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/14		

		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).

		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksamidy, anilinopiryminy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 60% widocznego kwiatostanu (BBCH 56). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

					wyniszczającego				Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odsłania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
		Boogie Xpro 400 EC IP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50	triazole, karboksyamidy,	układowy; do stosowania zapobiegawczego,	0,9-1,2 l/ha	2	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania

			g/l), spiroksamina (250 g/l)	ketoaminy	interwencyjnego i wyniszczającego				rynchosporiozy zbóż. Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Chefara 330 EC	propikonazol (250 g/l),	triazole	układowy, do stosowania	0,5 l/ha	1	40	Środek można stosować do

		IP	ciprokonazol (80 g/l)		zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy,	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia

			(150 g/l)		do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				(BBCH 55).
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Duett Ultra 497 SC	tiofanat metylowy	benzimidazole,	układowy, do stosowania	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do

		IP	(310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	triazole	zapobiegawczego i interwencyjnego				początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Envoy + Corbel 750 EC IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	strobiluryny, triazole + morfoliny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2		Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy

				i interwencyjnego				kwitnienia (BBCH 61).
	Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
	Falcon 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/14	35	Środek można stosować od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33). Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
	Fandango 200 EC IP	protriakonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
	Frelizon 240 SC IP	pentiopirad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g.l)	karboksamidy, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
	Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	1,0 l/ha	1	35	

		IP			zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Joga 250 EC	propikonazol	triazole	układowy, do	0,5 l/ha	1	35	Środek nie

			(250 g/l)		stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				posiada rejestrację do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz	morfoliny + imidazole,	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanie można stosować do widocznych

			(400 g/l), propikonazol (90 g/l)	triazole	i interwencyjnego				pierwszych ości (BBCH 49).
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek ogranicza występowanie ramularii. Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	

		Medallion 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole + strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

									Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Opera Max 147,5 SE + Corbel 750 EC IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	strobiluryny, triazole + morfoliny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha			Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Opera Top + Corbel 750 EC IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	strobiluryny, triazole + morfoliny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha			Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy

					głównie zapobiegawczego				kłoszenia (BBCH 51).
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole + morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw i rdzy jęczmienia. Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).

		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksyamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Proline Max 460 EC	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.

									Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Propico 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole + morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i względny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania

									09.07.2017
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 07.06.2017r.
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/14	35	Środek można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania

					i interwencyjnego				rdzy jęczmienia. Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).

					wyniszczającego				
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zboż.
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l),	morfoliny, triazole,	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

			metrafenon (75 g/l)	pochodne kwasu difenylowego					
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do

									początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Travis 350 SC IP	pentipirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Treoris 350 SC IP	pentipirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75– 1,25 l/ha	2/14	35	
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina	triazole, strobiluryny,	powierzchniowy i układowy, do stosowania	1,0-1,25 l/ha	2/14	35	Środek w zwalczaniu

			(50 g/l), biksafen (40 g/l)	karboksyamidy	zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				plamistości siatkowej, mączniaka prawdziwego stosować w dawce 1,25 l/ha. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia.
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Venturo 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).

									Srodek można stosować do fazy pełni kwitnienia gdy odslania się 60% kwiatostanu (BBCH 56). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Venturo 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Mieszaninę można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Venturo 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Srodek można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 40% widocznego kwiatostanu

									(BBCH 54). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Venturo 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Srodek można stosować do fazy kłoszenia gdy odslania się 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54). Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Vertisan 200 EC IP	pentipyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Acanto 250 SC IP	pentipyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (250 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6-1,0 l/ha	2/14		

		Vertisan 200 EC + Credo 600 SC IP	penthiopyrad (200 g/l) + chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/14		
		Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75– 1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy

									zbóż.
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
MAĆZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samyh gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75/ha	2/14	42	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna

					głównie zapobiegawczego				(BBCH 71).
		Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	1	48	Środek ogranicza również występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	1	48	Środek ogranicza również występowanie plamistości siatkowej jęczmienia, rdzy jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zafra SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy

		IP			stosowania głównie zapobiegawczego				dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
RDZA JĘCZMIENIA (<i>Puccinia hordei</i>)		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Yo-Yo	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy

		IP			stosowania głównie zapobiegawczego				dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	
RAMULARIOZA JĘCZMIENIA (<i>Ramularia collo- cygni</i>)		Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61). Okres na zużycie dla

									unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA (<i>Pyrenophora teres</i>)		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).

FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ <i>(Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp., Monographella nivalis)</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azteq 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	

		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l),	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego,	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

			ciprokonazol (80 g/l)		interwencyjnego i wyniszczającego				
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), ciprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).

		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l),	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego,	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

			ciprokonazol (80 g/l)		interwencyjnego i wyniszczającego				
		Polygreen Fungicide WP IP	oospory <i>Pythium</i> <i>oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów.	0,1 kg/ha	2/14		Środek stosować w następujących terminach: - pierwszy zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25-37) - drugi zabieg wykonać w fazie kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55-65).
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	

		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
CZERŃ ZBÓŻ (<i>Davidiella</i> sp., <i>Lewia</i> spp.)	Zapobieganie rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne	AgriStar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	

	zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).	Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	

		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	