

## Czerń kłosów

Fungicyd	Dawka (l lub kg)	Karencja	Zastosowanie w mieszaninie	Zalecenia stosowania	Substancje czynne	Producent	Numer zezwolenia	Data ważności	Ostateczny termin obrotu
Agria Azoksystrobina 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.	R-11/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Agria Azoksystrobina 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.	R-11/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Amistar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Limited	R-40/2011	31.12.2016	30.06.2018
Amistar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Limited	R-40/2011	31.12.2016	30.06.2018
Arastar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ARJO Sp. z o.o.	R-78/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Arastar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ARJO Sp. z o.o.	R-78/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Ascom 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	AGCHEM ACCESS POLAND	R-80/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Ascom 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	AGCHEM ACCESS POLAND	R-80/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Astar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ARKOAgro	R-10/2015 h.r.	31.12.2022	30.06.2024
Astar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ARKOAgro	R-10/2015 h.r.	31.12.2022	30.06.2024
Atol 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Agro GmbH	R-16/2013 h.r.	31.07.2015	16.01.2017
Atol 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Agro GmbH	R-16/2013 h.r.	31.07.2015	16.01.2017
Atos 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017

Atos 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Azotrobin 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Azotrobin 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Dedal 497 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15.85% [grupa: triazole ], tiofanat-metylowy 26.27% [grupa: benzimidazole ]	MADEZ FH-U	R-65/2014 h.r.	29.12.2023	30.06.2025
Dobromir 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Limited	R-128/2009	30.11.2019	30.05.2021
Dobromir 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Limited	R-128/2009	30.11.2019	30.05.2021
Dobromir Super 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-59/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Super 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-59/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Top 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-46/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Top 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-46/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dubler Mega 497 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15.85% [grupa: triazole ], tiofanat-metylowy 26.27% [grupa: benzimidazole ]	Agrovena Sp. z o.o.	R-48/2015 h.r.	2023-12-29	2025-06-29
Duett Star 334 SE		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 8.25% [grupa: triazole ], fenpropimorf 24,56% [grupa: morfoliny ]	BASF SE Niemcy	R-92/2014	13.06.2024	13.12.2025
Duett Ultra 497 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłószenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15,85% [grupa: triazole ], tiofanat-metylowy 26,27% [grupa: benzimidazole ]	BASF SE Niemcy	R-169/2013	29.12.2023	30.06.2025

Dultreks - Pro 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15.85% [grupa: triazole ], tiofanat-metylowy 26.27% [grupa: benzimidazole ]	RAAT (Robbin Aalbers Agrochemical Trading)	R-66/2014 h.r.	29.12.2023	30.06.2025
Epoksy 125 SC	0,75	35	Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Epoksy 125 SC	0,75	35	Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Epoksy 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Fezan Plus 226 SC	3	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od końca fazy kłoszenia do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69).	chlorotalonil 15.26% [grupa: ftalany ], tebukonazol 5.51% [grupa: konazoli-triazoli ]	Oxon Italia	R-11/2014 wu	31.10.2018	30.04.2020
Intizam 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15.85% [grupa: triazole ], tiofanat-metylowy 26.27% [grupa: benzimidazole ]	BASF SE Niemcy	R-84/2014	31.10.2018	30.04.2020
Intizam SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 18.70% [grupa: triazole ], tiofanat-metylowy 31.00% [grupa: benzimidazole ]	BASF SE Niemcy	R-82/2010i.r.	28.02.2016	29.08.2017
Jay 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.90% [grupa: strobiluryny ]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2011 h.r.	30.11.2019	30.05.2021
Jay 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.90% [grupa: strobiluryny ]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2011 h.r.	30.11.2019	30.05.2021
Kask 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ProEuro Sp. z o.o.	R-27/2013 h.r.	30.11.2019	31.05.2021
Kask 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ProEuro Sp. z o.o.	R-27/2013 h.r.	30.11.2019	31.05.2021
Mirador 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-28/2013	31.12.2022	01.07.2024
Mirador 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-28/2013	31.12.2022	01.07.2024

Osiris 65 EC	1,5-2		35	Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 50-65).	epoksykonazol 3.70% [grupa: triazole ], metkonazol 2.70% [grupa: triazole ]	BASF Polska Sp. z o.o.	R-87/2012	25.06.2022	25.12.2023
Prosaro 250 EC	0,75-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	protiokonazol 12.68% [grupa: triazole ], tebukonazol 12.68% [grupa: triazole ]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-152/2014	29.08.2024	28.02.2026
Raster 125 SC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC		0,75	x	Sparta 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC		0,75	x	Riza 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC		0,75	x	Sparta 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC		0,75	x	Riza 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Respekto 125 SC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021
Respekto 125 SC		0,75	x	Sparta 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021
Respekto 125 SC		0,75	x	Riza 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rubic 125 SC		0,75	35	Riza 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Rubic 125 SC		0,75	35	Sparta 250 EW (dawka: 0,5) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025

Rubric 125 SC	1	35		stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole ]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Sammisto 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	SWS Chemicals EU Sp.z o.o	R-49/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Sammisto 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	SWS Chemicals EU Sp.z o.o	R-49/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Song 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Goldengrass Ltd.	R-24/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Song 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Goldengrass Ltd.	R-24/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Starami 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Rudnik Sp. z o.o.	R-64/2012 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Starami 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	Rudnik Sp. z o.o.	R-64/2012 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Strobi 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ARJO Sp. z o.o.	R-77/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Strobi 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny ]	ARJO Sp. z o.o.	R-77/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Swing Plus	1,2-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	dimoksystrobina 12.53% [grupa: strobiluryny ], epoksykonazol 4.71% [grupa: triazole ]	BASF SE Niemcy	R-162/2014	31.01.2019	31.07.2020
Tandem 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15.85% [grupa: triazole ], tiofanat-metylowy 26.27% [grupa: benzimidazole ]	AGRI-GROW Sp. z o.o	R-46/2015 h.r	29.12.2023	29.06.2025
Tango Star	1	35		Stosować od początku fazy strzelenia w fazie kłosa (BBCH 51-59).	epoksykonazol 8.25% [grupa: triazole ], fenpropimorf 24.56% [grupa: morfoliny ]	BASF SE Niemcy	R-225/2014	30.04.2020	30.10.2021
Tenore 400 EW	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłosa (BBCH 51-59).	prochloraz 25.30% [grupa: imidazole ], tebukonazol 12.60% [grupa: konazole-triazole ]	AdAMA Polska Sp. z o.o.	R-68/2012 h.r.	31.12.2015	30.06.2017

