

Fuzarioza kłosów

Fungicyd	Dawka (l lub kg)	Karencja	Zastosowanie-w mieszaninie	Zalecenia stosowania	Substancje czynne	Producent	Numer zezwolenia	Data ważności	Ostateczny termin obrotu
Adexar Plus	2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 51-65).	epoksykonazol 3.98% [grupa: triazole], fluksapyroksad 3.98% [grupa: karboksamidy], piraklostrobina 6.37% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-19/2014	05.02.2024	05.08.2025
Agria Azoksystrobina 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.	R-11/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Agria Azoksystrobina 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.	R-11/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
AgriStar 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do końca kwitnienia (BBCH 51-69).	azoksystrobina 22.00% [grupa: strobiluryny]	AGRI-GROW Sp. z o.o	R-56/2015 h.r.	2025-02-05	2026-09-05
Amistar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Limited	R-40/2011	31.12.2016	30.06.2018
Amistar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Limited	R-40/2011	31.12.2016	30.06.2018
Arastar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ARJO Sp. z o.o.	R-78/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Arastar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ARJO Sp. z o.o.	R-78/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Artea 330 EC	0,5	40		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	cyprokonazol 7.16% [grupa: triazole], propikonazol 22.40% [grupa: triazole]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-32/2013	22.02.2023	23.08.2024
Ascom 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	AGCHEM ACCESS POLAND	R-80/2013 h.r	31.07.2015	01.02.2017
Ascom 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	AGCHEM ACCESS POLAND	R-80/2013 h.r	31.07.2015	01.02.2017
Astar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ARKOAgro	R-10/2015 h.r	31.12.2022	30.06.2024
Astar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ARKOAgro	R-10/2015 h.r	31.12.2022	30.06.2024

Atleta 480 SC	2-2,5	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 6.56% [grupa: strobiluryny], chlorotalonil 32.80% [grupa: ftalany]	HaGe Polska Sp. z o.o.	R-72/2013 h.r	2021-05-24	2022-11-25
Atol 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Agro GmbH	R-16/2013 h.r.	31.07.2015	16.01.2017
Atol 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Agro GmbH	R-16/2013 h.r.	31.07.2015	16.01.2017
Atos 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Atos 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Azotrobin 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Azotrobin 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Aztek 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	azoksystrobina 22.00% [grupa: strobiluryny]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-44/2015 h.r	2025-03-05	2026-09-05
Azyl 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	azoksystrobina 22.00% [grupa: strobiluryny]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-45/2015 h.r	2025-03-05	2026-09-05
Bounty 430 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	tebukonazol 39.29% [grupa: konazoli-triazoli]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-227/2014	31.08.2020	28.02.2022
Caramba 60 SL	1,2-1,5	35		Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 50-59)	metkonazol 6.00% [grupa: triazole]	BASF Agro B.V. Holandia	R-45/2010	01.06.2020	01.12.2021
Ceando 183 SC	1-1,5	35		Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 50-59)	epoksykonazol 7,68% [grupa: triazole], metrafenon 9,26% [grupa: ketonu difenylowego]	BASF SE Niemcy	R-170/2013	30.12.2023	01.07.2025
Chefara 330 EC	0,5	40		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	cyprokonazol 7.16% [grupa: triazole], propikonazol 22.40% [grupa: triazole]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-37/2013	31.05.2016	01.12.2017

Clayton Tabloid EW		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol 25.07% [grupa: konazoli-triazoli]	Clayton Plant Protection Ltd.	R-86/2014 h.r.	26.11.2022	26.05.2024
Darcos 250 EW		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol 25.07% [grupa: konazoli-triazoli]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-226/2014	31.08.2020	25.02.2022
Dedal 497 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15.85% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 26.27% [grupa: benzimidazole]	MADEZ FH-U	R-65/2014 h.r.	29.12.2023	30.06.2025
Demeter 250 SC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.00% [grupa: strobiluryny]	MADEZ FH-U	R-35/2015 h.r.	05.03.2025	05.09.2026
Diskobol 480 SC	2-2,5		0	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 6.56% [grupa: strobiluryny], chlorotalonil 32.78% [grupa: ftalany]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-5/2012	24.05.2021	24.11.2022
Dobromir 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22,81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Limited	R-128/2009	30.11.2019	30.05.2021
Dobromir 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22,81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Limited	R-128/2009	30.11.2019	30.05.2021
Dobromir Super 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-59/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Super 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-59/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Top 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-46/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Top 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-46/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dubler Mega 497 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15.85% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 26.27% [grupa: benzimidazole]	Agrovena Sp. z o.o.	R-48/2015 h.r.	2023-12-29	2025-06-29
Duett Star 334 SE		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 8.25% [grupa: triazole], fenpropimorf 24,56% [grupa: morfoliny]	BASF SE Niemcy	R-92/2014	13.06.2024	13.12.2025

Duett Ultra 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15,85% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 26,27% [grupa: benzimidazole]	BASF SE Niemcy	R-169/2013	29.12.2023	30.06.2025
Dultreks - Pro 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15,85% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 26,27% [grupa: benzimidazole]	RAAT (Robbin Aalbers Agrochemical Trading)	R-66/2014 h.r.	29.12.2023	30.06.2025
Epoksy 125 SC	0,75	35	Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12,02% [grupa: triazole]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Epoksy 125 SC	0,75	35	Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12,02% [grupa: triazole]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Epoksy 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12,02% [grupa: triazole]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Erasmus 250 EW	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol 25,07% [grupa: konazoli-triazoli]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-167/2012	31.08.2020	01.03.2022
Falcon 460 EC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	spiroksamina 25,25% [grupa: ketoaminy], tebukonazol 16,87% [grupa: konazoli-triazoli], triadimenol 4,34% [grupa: triazole]	Bayer CropScience AG Niemcy	R- 60 /2009	13.01.2025	13.07.2026
Fandango 200 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	fluoksastrobina 10,00% [grupa: strobiluryny], protiokonazol 10,00% [grupa: triazole]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-10/2011	26.01.2021	26.01.2022
Fezan Plus 226 SC	3	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od końca fazy kłoszenia do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69).	chlorotalonil 15,26% [grupa: ftalany], tebukonazol 5,51% [grupa: konazoli-triazoli]	Oxon Italia	R-11/2014 wu	31.10.2018	30.04.2020
Furtado 250 EW	1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	tebukonazol 25,80% [grupa: konazoli-triazoli]	Helm Polska Sp. z o.o.	R-120/2015	31.08.2021	28.02.2022
Helicur 250 EW	1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	tebukonazol 25,8% [grupa: konazoli-triazoli]	Helm Polska Sp. z o.o.	R-52/2008	31.08.2020	28.02.2022
Intizam 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 15,85% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 26,27% [grupa: benzimidazole]	BASF SE Niemcy	R-84/2014	31.10.2018	30.04.2020
Intizam SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 18,70% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 31,00% [grupa: benzimidazole]	BASF SE Niemcy	R-82/2010i.r.	28.02.2016	29.08.2017

Jay 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.90% [grupa: strobiluryny]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2011 h.r.	30.11.2019	30.05.2021
Jay 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.90% [grupa: strobiluryny]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2011 h.r.	30.11.2019	30.05.2021
Kask 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ProEuro Sp. z o.o.	R-27/2013 h.r.	30.11.2019	31.05.2021
Kask 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ProEuro Sp. z o.o.	R-27/2013 h.r.	30.11.2019	31.05.2021
Korazzo 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	azoksystrobina 22.00% [grupa: strobiluryny]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-58/2015 h.r.	2025-03-05	2026-09-05
Lerak 200 EC	1,5-2	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).	azoksystrobina 6,76% [grupa: strobiluryny], tebukonazol 11,7% [grupa: konazoli-triazoli]	Syngenta Crop Protection AG	R-7/2013	13.01.2023	14.07.2024
Matador 303 SE	1,5-1,75	42		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	tetrakonazol 6,11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20,44% [grupa: benzimidazole]	SumiAgro (UK) Ltd	R-99/2008	19.12.2018	19.06.2020
Matsuri 250 EC	0,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	propikonazol 23.58% [grupa: triazole]	SumiAgro (UK) Ltd	R-67/2014 zr	31.01.2018	31.07.2019
Mirador 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-28/2013	31.12.2022	01.07.2024
Mirador 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-28/2013	31.12.2022	01.07.2024
Moderator 303 SE	1,5-1,75	42		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	tetrakonazol 6,11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20,44% [grupa: benzimidazole]	Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.	R-101/2008	19.12.2018	19.06.2020
Olympus 480 SC	2-2,5	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 6,56% [grupa: strobiluryny], chlorotalonil 32,80% [grupa: ftalany]	Syngenta Limited	R-32/2011	24.05.2021	24.11.2022
Orius Extra 250 EW	1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	tebukonazol 25.00% [grupa: konazoli-triazoli]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-77/2015	31.08.2020	28.02.2022

Osiris 65 EC	1,5	35	Corbel 750 EC (dawka: 0,5)	Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65).	epoksykonazol 3.70% [grupa: triazole], metkonazol 2.70% [grupa: triazole]	BASF Polska Sp. z o.o.	R-87/2012	25.06.2022	25.12.2023
Osiris 65 EC	1,5-2	35		Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65).	epoksykonazol 3.70% [grupa: triazole], metkonazol 2.70% [grupa: triazole]	BASF Polska Sp. z o.o.	R-87/2012	25.06.2022	25.12.2023
Prosaro 250 EC	0,75-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	protiokonazol 12.68% [grupa: triazole], tebukonazol 12.68% [grupa: triazole]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-152/2014	29.08.2024	28.02.2026
Raster 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC	0,75 x		Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC	0,75 x		Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC	0,75 x		Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC	0,75 x		Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC	0,75 x		Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC	0,75 x		Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Respekto 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021

Respekto 125 SC	0,75		Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021
Respekto 125 SC	0,75		Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021
Riza 250 EW	1	35		Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	tebukonazol 25.00% [grupa: konazoli-triazoli]	Cheminova A/S	R-11/2005	22.03.2015	22.09.2016
Rubric 125 SC	0,75	35	Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Rubric 125 SC	0,75	35	Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Rubric 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 12.02% [grupa: triazole]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Sammisto 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	SWS Chemicals EU Sp.z o.o	R-49/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Sammisto 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	SWS Chemicals EU Sp.z o.o	R-49/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Secardo 125 EC	1,33-2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 51-65).	epoksykonazol 6.00% [grupa: triazole], fluksapyroksad 6.00% [grupa: karboksamidy]	BASF SE Niemcy	R-22/2014	19.02.2024	20.08.2025
Sokolov 250 EW	1	32		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	tebukonazol 26.00% [grupa: triazole]	ProEuro Sp. z o.o.	R-10/2014 h.r.	07.12.2015	07.06.2017
Soligor 425 EC	0,7-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	protiokonazol 5.42% [grupa: triazole], spiroksamina 22.90% [grupa: ketoaminy], tebukonazol 15.13% [grupa: triazole]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-131/2014	01.09.2024	01.03.2026
Song 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Goldengrass Ltd.	R-24/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Song 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Goldengrass Ltd.	R-24/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017

Sparta 250 EW	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).	tebukonazol 25.77% [grupa: konazoli-triazoli]	Cheminova A/S	R-65/2015	31.08.2020	28.02.2022
Spekfree 430 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	tebukonazol 39.29% [grupa: konazoli-triazoli]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-166/2012	31.08.2020	01.03.2022
Starami 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Rudnik Sp. z o.o.	R-64/2012 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Starami 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	Rudnik Sp. z o.o.	R-64/2012 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Starpro 430 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	tebukonazol 39.29% [grupa: konazoli-triazoli]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-161/2012	26.11.2024	26.05.2027
Strobi 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ARJO Sp. z o.o.	R-77/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Strobi 250 SC	0,8-1	35		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	azoksystrobina 22.81% [grupa: strobiluryny]	ARJO Sp. z o.o.	R-77/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Swing Plus	1,2-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	dimoksystrobina 12.53% [grupa: strobiluryny], epoksykonazol 4.71% [grupa: triazole]	BASF SE Niemcy	R-162/2014	31.01.2019	31.07.2020
Swing Top 183 SC	1,2-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	dimoksystrobina 12.53% [grupa: strobiluryny], epoksykonazol 4.71% [grupa: triazole]	BASF SE Niemcy	R-60/2014	28.04.2024	28.10.2025
Syrius 250 EW	1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	tebukonazol 26.02% [grupa: konazoli-triazoli]	Adama Polska Sp. z o.o.	R-93/2015	31.08.2020	28.02.2022
Tango Star	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	epoksykonazol 8.25% [grupa: triazole], fenpropimorf 24.56% [grupa: morfoliny]	BASF SE Niemcy	R-225/2014	30.04.2020	30.10.2021
Tazer 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy fazy kłoszenia do fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	azoksystrobina 22.00% [grupa: strobiluryny]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-48/2015	05.03.2025	05.09.2026
Tebu 250 EW	1	32		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	tebukonazol 25.00% [grupa: konazoli-triazoli]	Helm AG	R-60/2005	31.08.2020	28.02.2022

Tenore 400 EW	1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	prochloraz 25.30% [grupa: imidazole], tebukonazol 12.60% [grupa: konazoli-triazoli]	AdAMA Polska Sp. z o.o.	R-68/2012 h.r.	31.12.2015	30.06.2017
Tiger 250 SC	1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	azoksystrobina 22% [grupa: strobiluryny]	MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki	R-10/2016 h.r.	05.03.2025	05.09.2026
Toledo 250 EW	1	35	Stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61)	tebukonazol 25.07% [grupa: konazoli-triazoli]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-162/2012	26.11.2022	27.05.2024
Topsin M 500 SC	1,4	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	tiofanat-metylowy 41.91% [grupa: benzimidazole]	Nippon Soda Company Ltd	R-74/2012	17.05.2022	17.11.2023
Trion 250 EW	1 x		Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	tebukonazol 25.8% [grupa: triazole]	Helm AG	R-126/2015	31.08.2020	28.02.2022
Troja 250 EW	1	35	Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).	tebukonazol 25.77% [grupa: konazoli-triazoli]	Cheminova A/S	R-63/2015	31.08.2020	28.02.2022
Tyberius 250 EW	1 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	tebukonazol 26.02% [grupa: triazole]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-108/2015	31.08.2020	28.02.2022
Variano Xpro 190 EC	1,25	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).	protiokonazol9,41% [grupa: triazole], fluoksastrobina4,70% [grupa: strobiluryny], biksafen3,76% [grupa: karboksamidy]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-156/2015	31.07.2019	31.01.2021
Vista 228 SE	1,8	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	fluchinkonazol 5.40% [grupa: triazole], prochloraz 17.40% [grupa: imidazole]	BASF Agro B.V. Szwajcaria	R-3/2008	31.12.2015	01.07.2017
Yamato 303 SE	1,5-1,75	42	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	tetrakonazol 6.11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20.44% [grupa: benzimidazole]	Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.	R-100/2008	19.12.2018	19.06.2020
Zafir 400 EW	1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	prochloraz 25.30% [grupa: imidazole], tebukonazol 12.60% [grupa: konazoli-triazoli]	Adama Agricultural Solutions Ltd.	R-9/2012h.r.	31.12.2015	30.06.2017
Zamir 400 EW	1	35	Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59).	prochloraz 25.30% [grupa: imidazole], tebukonazol 12.60% [grupa: konazoli-triazoli]	Adama Agricultural Solutions Ltd.	R-18/2003	31.12.2015	30.06.2017
Zantara 216 EC	0,9-1,2	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, w fazie kłoszenia (BBCH 51-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości młecznicy ziarna (BBCH 75).	biksafen 5.10% [grupa: karboksamidy], tebukonazol 16.80% [grupa: konazoli-triazoli]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-54/2014	14.04.2024	15.10.2025

