

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

Fungicyd	Dawka (l lub kg)	Karencja	Zastosowanie w mieszaninie	Zalecenia stosowania	Substancje czynne	Producent	Numer zezwolenia	Data ważności	Ostateczny termin obrotu
Allegra 250 SC	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 11.54% [grupa: triazole], krezoksym metylowy 11.54% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-98/2014	26.06.2024	26.12.2025
Amadeus 225 EC	0,8-1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	biksafen 7.40% [grupa: karboksamidy], protiokonazol 14.90% [grupa: triazole]	MADEZ FH-U	R-86/2013h.r.	16.01.2016	17.07.2017
Arbiter 520 EC	0,75-1,25	x		Stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 21-31).	prochloraz 28.53% [grupa: imidazole], proquinazid 3.57% [grupa: chinazoliny], tebukonazol 14.27% [grupa: konazoli-triazoli]	MADEZ FH-U	R-79/2014 h.r.	30.09.2020	30.03.2022
Aviator Xpro 225 EC	0,8-1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	biksafen 7.40% [grupa: karboksamidy], protiokonazol 14.90% [grupa: triazole]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-11/2013	16.01.2016	17.07.2017
Capalo 337,5 SE	1,4-2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 6.09% [grupa: triazole], fenpropimorf 19.49% [grupa: morfoliny], metrafenon 7.31% [grupa: ketonu difenylowego]	BASF SE Niemcy	R-75/2014	14.05.2024	14.11.2025
Ceando 183 SC	1-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1 kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 7,68% [grupa: triazole], metrafenon 9,26% [grupa: ketonu difenylowego]	BASF SE Niemcy	R-170/2013	30.12.2023	01.07.2025
Envoy	1,5-2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od momentu widocznych 5 rozkrzewień do fazy pierwszego kolanka (BBCH 25-31).	epoksykonazol 6.01% [grupa: triazole], piraklostrobina 8.18% [grupa: strobiluryny]	BASF AG Niemcy	R-164/2014	31.01.2018	31.07.2019
Halny 200 EC	0,15-0,25	x		Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 25-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-112/2013	31.07.2021	01.02.2023
Input 460 EC	0,75	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	protiokonazol 16.00% [grupa: triazole], spiroksamina 30.00% [grupa: ketoaminy]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-61/2011	05.10.2021	05.04.2023
Intizam SC	0,6	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 18.70% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 31.00% [grupa: benzimidazole]	BASF SE Niemcy	R-82/2010i.r.	28.02.2016	29.08.2017
Matador 303 SE	1,5	42		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	tetrakonazol 6,11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20,44% [grupa: benzimidazole]	SumiAgro (UK) Ltd	R-99/2008	19.12.2018	19.06.2020
Moderator 303 SE	1,5	42		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	tetrakonazol 6,11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20,44% [grupa: benzimidazole]	Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.	R-101/2008	19.12.2018	19.06.2020
Ogam	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 11.54% [grupa: triazole], krezoksym metylowy 11.54% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-160/2014	30.04.2020	30.10.2021

Opera Max 147,5 SE	1,5-2		35	Stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do fazy 1-go kolanka (BBCH 25-31).	epoksykonazol 6.01% [grupa: triazole], piraklostrobina 8.18% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-33/2014	10.03.2024	10.09.2025
Opera Top	1,5-2		35	Stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do fazy 1-go kolanka (BBCH 25-31).	epoksykonazol 6.01% [grupa: triazole], piraklostrobina 8.18% [grupa: strobiluryny]	BASF AG Niemcy	R-165/2014	31.01.2018	31.07.2019
Osiris 65 EC	1,5-2,5		35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 3.70% [grupa: triazole], metkonazol 2.70% [grupa: triazole]	BASF Polska Sp. z o.o.	R-87/2012	25.06.2022	25.12.2023
Wirtuoz 520 EC	0,75-1,25	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: odpoczątku krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-3).	prochloraz 28.53% [grupa: imidazole], proquinazid 3.57% [grupa: chinazoliny], tebukonazol 14.27% [grupa: konazoli-triazoli]	Du Pont International Operations Sarl	R-70/2012	30.09.2020	30.03.2022
Tarot 200 EC	0,15-0,25		0	Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 27-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	MADEZ FH-U	R-81/2013 h.r	17.06.2022	17.12.2023
Proline Max 460 EC		0,75	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	protiokonazol 16.00% [grupa: triazole], spiroksamina 30.00% [grupa: ketoaminy]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-66/2010	12.08.2020	12.02.2022
Secardo 125 EC	1,33-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 6.00% [grupa: triazole], fluksapyroksad 6.00% [grupa: karboksamidy]	BASF SE Niemcy	R-22/2014	19.02.2024	20.08.2025
Talius 200 EC	0,15-0,25	x		Stosować od pełni krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 27-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-80/2012	17.06.2022	17.12.2023
Topsin M 500 SC		1,4	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	tiofanat-metylowy 41.91% [grupa: benzimidazole]	Nippon Soda Company Ltd	R-74/2012	17.05.2022	17.11.2023
Unix 75 WG	0,7-1		42	Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2-go kolanka (BBCH 30-32).	cyprodinil 75.00% [grupa: anilinopirimidyny]	Syngenta Crop Protection AG	R-27/2013	13.02.2023	14.08.2024
Vangard 75 WG	0,7-1		42	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2-go kolanka (BBCH 30-32).	cyprodinil 75.00% [grupa: anilinopirimidyny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-29/2013	30.04.2018	31.10.2019
Vareon 520 EC	0,75-1,25	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-31).	prochloraz 28.53% [grupa: imidazole], proquinazid 3.57% [grupa: chinazoliny], tebukonazol 14.27% [grupa: konazoli-triazoli]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-124/2013	31.08.2020	28.02.2022
Vista 228 SE		1,8	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1 kolanka (BBCH 30-31).	fluchinkonazol 5.40% [grupa: triazole], prochloraz 17.40% [grupa: imidazole]	BASF Agro B.V. Szwajcaria	R-3/2008	31.12.2015	01.07.2017

Yamato 303 SE	1,5	42	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	tetrakonazol 6.11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20.44% [grupa: benzimidazole]	Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.	R-100/2008	19.12.2018	19.06.2020
Palazzo	1,4-2,0	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	fenpropimorf 19.49% [grupa: morfoliny], epoksykonazol 6.09% [grupa: triazole], metrafenon 7.31% [grupa: pochodne ketony difenylowego]	BASF SE	R-197/2015	30.04.2019	31.10.2020
Tocata	1,4-2	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	fenpropimorf 19.49% [grupa: morfoliny], epoksykonazol 6.09% [grupa: triazole], metrafenon 7.31% [grupa: pochodne ketonu difenylowego]	BASF SE Niemcy	R-202/2015	30.04.2019	31.10.2020
Realchemie Proquinazid 200 EC	0,15-0,25	x	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od pełni krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 27-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	Realchemie Nederland BV	R-7/2016 h.r.	17.06.2022	17.01.2024