

CHOROBY

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Zaprawy	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka/100 kg bulw	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
PRZED SADZENIEM							
RIZOKTONIOZA ZIEMNIAKA <i>(Thanatephorus cucumeris, stadium strzępkowe: Rhizoctonia solani)</i>	Wybór odpowiedniego stanowiska na plantacje ziemniaka. Prawidłowa uprawa roli. Właściwy materiał sadzeniakowy. Zrównoważone nawożenie. Odpowiedni odczyn gleby. Usuwanie źródeł infekcji. Odpowiedni termin sadzenia.	Emesto Prime 050 FS IP	penflufen (50 g/l)	karboksyanilidy	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do zaprawiania bulw	40 ml + 1000–1500 ml wody	Zaprawy stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i sadzenia bulw ziemniaka.
		Major 460 SC	flutolanil (460 g/l)	benzamidy	układowy, przeznaczony do zaprawiania bulw	20 ml + do 200 ml wody	
		Monceren 250 FS	pencykuron (250 g/l)	pochodne fenyloczynnika	powierzchniowy, przeznaczony do zaprawiania bulw	60 ml + 1000 ml wody	Zaprawiać w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
		Monceren Pro 258 FS IP	pencykuron (250 g/l), protiokonazol (8 g/l)	pochodne fenyloczynnika, triazole	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do zaprawiania bulw	60 ml + 1500 ml wody	Zaprawiać w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
		Moncut 460 SC IP	flutolanil (460 g/l)	benzamidy	układowy, przeznaczony do zaprawiania bulw	20 ml + 200 ml wody	Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw na krótko przed kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia.
		Pencykur 250 FS	pencykuron (250 g/l)	pochodne fenyloczynnika	powierzchniowy, przeznaczony do zaprawiania bulw	60 ml + 1000 ml wody	Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw na krótko przed kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia.
Prestige Forte 370 FS IP	pencykuron (250 g/l), imidachlopryd (120 g/l)	pochodne fenyloczynnika, neonicotynoidy	powierzchniowy, przeznaczony do zaprawiania bulw	60 ml + 2000 ml wody	Środek dodatkowo zwalcza mszyce – wektory chorób wirusowych, stonkę ziemniaczaną, drutowce, pędraki. Środek w przypadku małego nasilenia choroby i w odmianach odporniejszych ogranicza również porażenie parchem zwykłym.		