



**INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

PROGRAM OCHRONY PSZENICY OZIMEJ



Program przygotowany w ramach zadania 1.2
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020
*„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz
ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i
środowiska”*

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poznań 2019

Program opracowany pod redakcją:
prof. dr hab. Marka Korbasa

Autorzy:


Chwasty - dr hab. Roman Kierzek, mgr Krystyna Miklaszewska,

Choroby - prof. dr hab. Marek Korbasa, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, mgr inż. Jakub Danielewicz

Szkodniki - prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr Przemysław Strażyński

FAZY ROZWOJOWE

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony)



Komentarz:

Program integrowanej ochrony pszenicy ozimej przed chwastami, chorobami i szkodnikami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w marcu 2019 roku.

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

CHWASTY									
Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna	Mechanizm działania substancji aktywnej (wg HRAC)	Działanie	Dawka kg(l). (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00 (bezpośrednio po siewie)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Glean Strong 54 WG IP	di flufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 417 g/kg (41,7%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 125 g/kg (12,5%)	F1, B	Doglebowe	120 g.	1	ND	
		Glean 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe	20-25 g.	1	ND	
		Nuher 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowe	20-25 g.	1	ND	
		Sulfen 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Doglebowy / Nalistny	20 g.	1	ND	
		Tacyt 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Doglebowy / Nalistny	20 g.	1	ND	
		Racer 250 EC	flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g/l	F1	Doglebowe	1,0-2,0 l.	1	ND	
		Vernal 250 EC	flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g/l	F1	Doglebowe	1,0-2,0 l.	1	ND	
		Sharpen 330 EC	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)	K1	Doglebowe	3,0-5,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00-09 (po siewie przed wschodami)									
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenfludi 500 WG IP	di flufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg..	1	ND	
		Mendel 500 WG IP	di flufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg..	1	ND	
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cetnik 500 SC IP	flufenacet (z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)	K3	Doglebowe	0,24-0,3 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Cevino 500 SC IP	flufenacet (z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)	K3	Doglebowe	0,24-0,3 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Inker 500 SC IP	flufenacet (z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)	K3	Doglebowe	0,24-0,3 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Ossetia IP	di flufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg..	1	ND	Zalecany w uprawach pszenicy durum
		Palisade 480 SC IP	flufenacet (z grupy oksyacetamidów) – 480 g/l (40,51%)	K3	Doglebowe	0,5 l.	1	ND	
		Pencot 330 EC IP	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)	K1	Doglebowe	3,0-5,0 l.	1	ND	
		Penfox 330 EC IP	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)	K1	Doglebowe	3,0-5,0 l.	1	ND	
		Penpol 400 SC IP	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (38,04%)	K1	Doglebowe	2,5-4,1 l.	1	ND	
		Sharpen 400 SC IP	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (38,04%)	K1	Doglebowy / Nalistny	2,5 – 4,1 l.	1	ND	
Fence IP	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 480 g/l (40,51%)	K3	Doglebowo	0,5 l.	1	ND			
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00 - Kw (bezpośrednio po siewie do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Herold 600 SC IP	di flufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowy / Nalistny	0,25-0,35 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00-13 (bezpośrednio po siewie do fazy trzech liści)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Boxer 800 EC IP	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowy / Nalistny	3,0 l.	1	ND	
		Fidox 800 EC IP	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%)	N	Doglebowy / Nalistny	2,0 - 4,0 l.	1	ND	
		Roxy 800 EC IP	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78%)	N	Nalistny	2,0-4,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									

BBCH 00-29 (bezpośrednio po siewie do końca fazy krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Pontos IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) - 240 g/l (20,98 %) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (8,74%)	K3, F1	Doglebowy / Nalistny	0,5 - 1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 01-09 (od skielkowania do momentu poprzedzającego wschody)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Boxer Evo EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%), diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
		Jura EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 01-13 (od fazy przed wschodami do fazy 3 liści)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Pluto IP	prosulfokarb – 800 g/l (78%)	N	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 01-29 (od skielkowania do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Delfin 500 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowy / Nalistny	0,375 l.	1	ND	
		Kinara 500 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowy / Nalistny	0,375 l.	1	ND	
		Matrix IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowy / Nalistny	0,375 l.	1	ND	
		Sempre 500 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowy / Nalistny	0,375 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-13 (jesienią od szpilkowania do fazy trzech liści)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Battle Delta 600 SC IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowy / Nalistny	0,35 l.	1	ND	Środek może spowodować objawy fitotoksyczności m in. chlorozy. Mają one jednak charakter przemijający i nie wpływają na poziom plonowania zbóż.
		Bat 600 SC	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowy / Nalistny	0,35 l.	1	ND	Środek może spowodować objawy fitotoksyczności m in. chlorozy. Mają one jednak charakter przemijający i nie wpływają na poziom plonowania zbóż.
		Boxer Evo EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%), diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
		Cayman Pro 440 SC IP	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowy / Nalistny	2,5 l.	1	ND	
		Czarnobyl IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowy / Nalistny	0,6 l.	1	ND	
		Expert Met 56 WG IP	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) - 420 g/kg (42%)	C1, K3	Doglebowy / Nalistny	0,35 kg.	1	ND	
		Glosset 600 SC IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) - 600 g/l (48,78 %)	K3	Doglebowy / Nalistny	0,4 l.	1	ND	
		Jura EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
		Naceto SP IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,26%), flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 400 g/l (32,52%)	F1, K3	Doglebowy / Nalistny	0,6 l.	1	ND	
Ordago Pro 440 SC IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 400 g/l (32,52%)	K1, F1	Doglebowy / Nalistny	2,5 l.	1	ND			
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10 - 14 (jesienią po wschodacg)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenfludi 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Nalistny	0,24 kg/ha.	1	ND	
		Mendel 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Nalistny	0,24 kg/ha.	1	ND	
		Ossetia IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Nalistny	0,24 kg/ha.	1	ND	Zalecany w uprawach pszenicy durum

FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10 - 21 (od szpilkowania do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Mertil 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (163%), flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 400 g/l (33%)	F1, K3	Nalistny	0,6 l.	1	ND	
		Reliance 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (163%), flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 400 g/l (33%)	F1, K3	Nalistny	0,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-25 (od szpilkowania do pełni krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	BeFlex 500 SC IP	befflubutamid (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,46 %)	F1	Doglebowy / Nalistny	0,25 - 0,5 l.	1	ND	W celu zwiększenia zakresu zwalczanych chwastów środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Boxer 800 EC lub Lentipur Flo 500 SC
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Expert 600 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowy / Nalistny	0,25-0,35 l.	1	ND	
		Komandos 560 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowy / Nalistny	0,4-0,5 l.	1	ND	
		Kompleks 560 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowy / Nalistny	0,4-0,5 l.	1	ND	
		Komplet 560 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowy / Nalistny	0,4-0,5 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Picono IP	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 320 g/l (28,83%) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarbowsamidów) - 16 g/l (1,44%)	K1, F1	Doglebowy / Nalistny	2,0-3,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-29 (od szpilkowania do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dyplomata 600 SC IP	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %) diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F1	Doglebowy / Nalistny	1,25-1,5 l.	1	ND	
		Snajper 600 SC IP	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %), diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F2	Doglebowy / Nalistny	1,25-1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-Kw (od fazy pierwszego liścia do końca wegetacji)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aron 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylpirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistny	0,6-1,2 l/ha	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyrńca polnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Arubis 50 SG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowy / Nalistny	25-37,5 g.	1	ND	
		Spoton 50 SG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowy / Nalistny	25-37,5 g.	1	ND	
		Surfer 50 SG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Doglebowy / Nalistny	25-37,5 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-12 (jesienią od fazy pierwszego do drugiego liścia)									
Chwasty dwuliścienne miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fence IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 480 g/l (40,51%)	K3	Doglebowo	0,5 l.	1	ND	
		Agrosulfuron 750 WG IP	chlorosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Doglebowy / Nalistny	20-25 g.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Palisade 480 SC IP	flufenacet (z grupy oksycetamidów) – 480 g/l (40,51%)	K3	Doglebowe	0,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-14 (jesienią od fazy pierwszego do czwartego liścia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chlorsulfuron 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Doglebowy / Nalistny	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-20 (jesienią od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia)									
		Cetnik 500 SC IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 500 g/l (42,3 %)	K3	Nalistny	0,24-0,35 l/ha	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cevino 500 SC IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 500 g/l (42,3 %)	K3	Nalistny	0,24-0,35 l/ha	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG
		Inker 500 SC IP	flufenacet (związek z grupy oksycetamidów) – 500 g/l (42,3 %)	K3	Nalistny	0,24-0,35 l/ha	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-23 (jesienią od pierwszego liścia do trzech rozkrzewień)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bizon IP	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowy / Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Legion IP	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowy / Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Viper IP	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowy / Nalistny	1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-29 (jesienią od pierwszego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Glean Strong 54 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 417 g/kg (41,7%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 125 g/kg (12,5%)	F1, B	Doglebowy / Nalistny	120 g.	1	ND	
		Lexus 50 WG IP	fluprysulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Doglebowy / Nalistny	20 g.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Quelex IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopykolinowych) – 104,2 g/kg (10,4%)	B, O	Nalistny	37,5 g.	1	ND	Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-30 (jesienią od pierwszego liścia do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Glean 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowy / Nalistny	20-25 g.	1	ND	
		Nuher 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Doglebowy / Nalistny	20-25 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-Kw (jesienią od pierwszego liścia do końca wegetacji)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Paxio 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenilopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistny	0,6-0,9 l.	1	ND	Przy zwalczaniu wyczyńca polnego stosować dawkę 0,9 – 1,2 l/ha
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-Kw (jesienią od fazy drugiego liścia do końca wegetacji - do pierwszych przymrozków)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Axial Komplett IP	pinoksaden (związek z grupy fenilopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistny	0,75-1,0 l.	1	ND	
		Axial One 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenilopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistny	0,75-1,0 l.	1	ND	
		Sulfen 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Doglebowy / Nalistny	20 g.	1	ND	
		Tacyt 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Doglebowy / Nalistny	20 g.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Tolurex 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,98%)	C2	Nalistny	1,5-2,0 l.	1	ND	
		Toluron 700 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) -700 g/l (43,98%)	C2	Nalistny	1,4 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-13 (jesienią od fazy drugiego do trzeciego liścia)									
		Diflanil 500 SC IP	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	B	Nalistny	0,3 l.	1	ND	
		Dina 500 SC IP	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,3 l.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Clayton El Nino	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,3 l.	1	ND	W celu kompleksowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować łącznie ze środkiem Aminopielik Super 464 SL wiosną od początku fazy gdy widoczne są 3 rozkrzewienia do początku fazy końca krzewienia (BBCH 23-28)
		Ukulele 500 SC IP	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,3 l.	1	ND	
		Premazor Sad 500 SC IP	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,3 l.	1	ND	
		Flufenik 500 SC IP	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,2-0,3 l.	1	ND	
		Legato 500 SC IP	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,2-0,3 l.	1	ND	
		Stakato 500 SC IP	diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,2-0,3 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Talos 500 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,2-0,3 l.	1	ND	W celu kompleksowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować łącznie ze środkiem Aminopielik Super 464 SL wiosną od początku fazy gdy widoczne są 3 rozkrzewienia do początku fazy końca krzewienia (BBCH 23-28)
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-14 (jesienią od fazy drugiego do czwartego liścia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Trinity 590 SC IP	diflufenikan - (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,5%), chlorotoluron - (związek z grupy pochodnych mocznika) 250 g/l (21,7%), pendimetalina - (związek z grupy dinitroanilin) - 300 g/l (26,1%)	F1, C2, K1	Doglebowy / Nalistny	2,0-2,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-21 (jesienią od fazy drugiego liścia do początku krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Traxos 50 EC IP	klodinafop (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropinowego) – 25 g/l (2,58%)pinoksaden (związek z grupy fenylpirazolin) – 25 g/l (2,58%)	A, A	Nalistny	1,2 l/ha	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-29 (jesienią od fazy drugiego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Tribe 75 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-39 (jesienią od fazy drugiego liścia do fazy rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Minstrel	fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 288 g/l (28,6%), co odpowiada 200 g/l (20,43 %) czystego fluroksypyru	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-25 (jesienią od trzeciego liścia do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Alister Grande 190 OD IP	diflufenikan (substancja z grupy anilidów) - 180 g/l (17,39 %) mezosulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 6 g/l (0,58 %) jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 4,5 g/l (0,43 %)	F1, B, B	Nalistny	0,8-1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-29 (jesienią od trzeciego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Opal 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,86%)	C2	Nalistny	2,0 l.	1	ND	
		Ziotosar 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,86%)	C2	Nalistny	2,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Ranga 75 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13 - Kw (od fazy trzeciego liścia do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Axial 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylpirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistny	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Fraxial 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylpirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistny	0,6-0,9 l.	1	ND	
Chwasty	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dicurex Flo 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%),	C2	Nalistny	2,0 l.	1	ND	
		Huzar 05 WG IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 5 %	B	Nalistny	0,15-0,20 kg.	1	ND	

Jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Legato Pro 425 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 25 g/l (2,2%) chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 400 g/l (35,7%)	F1, C2	Nalistny	2,0-2,5 l.	1	ND	
		Lentipur Flo 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistny	2,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 14-23 (od fazy czwartego liścia do fazy trzech rozkrzewień)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Adiunkt 500 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1		0,24-0,3 l.	1	ND	
		Herubin 500 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1		0,24-0,3 l.	1	ND	
		Saper 500 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)	F1	Nalistny	0,24-0,3 l.	1	ND	Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulił czepnej.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 21-29 (jesienią od początku do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chwastox D 179 SL IP	MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%) dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 17,8 g/l (1,64%)	O, O	Nalistny	5,0 l.	1	ND	
		Esteron 600 EC IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 905 g/l	O	Nalistny	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Pielik 85 SP IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) 85% (850 g/kg)	O	Nalistny	1,5- 2 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH Rw-25 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Attribut 70 SG IP	propoksykarbazon sodowy (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 70%.	B	Nalistny	60-100 g.	1	ND	
		Dicurex Flo 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistny	3,0 l.	1	ND	
		Lentipur Flo 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistny	3,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Toluton 700 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) -700 g/l (43,98%)	C2	Nalistny	1,4 - 1,75 l.			
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH Rw-29 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia)									
Miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Flash 069 EW IP	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistny	1,0 – 1,2 l.	1	ND	W celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 E. W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych stosować łącznie ze środkiem Nuance 75 WG
		Foxtrot 069 EW IP	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistny	1,0 – 1,2 l.	1	ND	W celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 E. W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych stosować łącznie ze środkiem Nuance 75 WG
		Norton 069 EW IP	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistny	1,0-1,2 l.	1	ND	W celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 E. W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych stosować łącznie ze środkiem Nuance 75 WG
		Rumba 069 EW IP	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	F1	Nalistny	1,0-1,2 l.	1	ND	W celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 E. W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych stosować łącznie ze środkiem Nuance 75 WG
		Agritox Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Agroxone Max 750 SL IP	MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Agroxone Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Ceridor MCPA 750 SL IP	MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Dicoherb 750 SL IP	MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dicoherb Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzooesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Diffanil 500 SC IP	diffufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,18-0,3 l.	1	ND	
		Dina 500 SC IP	diffufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,18-0,3 l.	1	ND	
		Nutox Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzooesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Premazor Sad 500 SC IP	diffufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,18-0,3 l.	1	ND	
		Toscana 75 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	0,2 g.	1	ND	
		Ukulele 500 SC IP	diffufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)	F1	Nalistny	0,18-0,3 l.	1	ND	
		Weed Tox Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzooesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Concert SX 44 SGIP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 % (400 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4 % (40 g/kg)	B, B	Nalistny	0,15 kg.	1	ND	
		Huzar 05 WG IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5 %	B	Nalistny	0,15-0,2 kg.	1	ND	
		Huzar 100 OD IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100g/l	B	Nalistny	75-100 ml.	1	ND	
		Huzar Activ 387 OD	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l (0,95 %), 2,4-D -(związek z grupy fenoksykwasów)– 377 g/l (35,87%)	B, O	Nalistny	0,75-1,0 l.	1	ND	
		Huzar 05 WG + Esteron 600 EC IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 5 % + 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 905 g/l (co odpowiada 600 g/l formy kwasu 2,4-D)	B + O	Nalistny	0,2 kg + 0,5 l.	1	ND	
		Zeus 208 WG IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 8,3 g/kg, propoksykarbazon sodowy (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 140 g/kg, amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/kg.	B, B, B	Nalistny	0,3 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH Rw-30 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Atlantis 12 OD IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 2 g/l, mezosulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/l	B, B	Nalistny	0,45-1,2 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	GalGone EC	fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %))	O	Nalistny	0,75-1,0 l.	1	ND	
		Glean 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	10-15 g.	1	ND	
		Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (789g/l) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 0,05%	1	ND	
		Naxel 75 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 g.	1	ND	Można stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. Dodatek adiuwanta zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytuliłi czepnej. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową owies głuchy środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Foxtrot 069 EW w dawce 1 l/ha.
		Nuance 75 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 g.	1	ND	Można stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. Dodatek adiuwanta zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytuliłi czepnej. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową owies głuchy środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Foxtrot 069 EW w dawce 1 l/ha.
		Nuher 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	10-15 g.	1	ND	
		Platform 61,5 SG IP	karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin)– 15 g/kg (1,5%) mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g/kg (60%)	E, O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	

		Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g + 1,5 l.	1	ND	
		Ranga 75 WG + Silwett IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g + 1,5 l.	1	ND	
		Viking 75 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 g.	1	ND	Można stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. Dodatek adiuwanta zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytuliłi czepnej. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową i owies głuchy środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Foxtrot 069 EW w dawce 1 l/ha.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH Rw-31 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Herkules 75 SG IP	tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 682 g/kg (68,2%), metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 68 g/kg (6,8%)	B, B	Nalistny	70-90 g.	1	ND	
		Tara IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5 %) piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/kg (5,0%) aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 50 g/kg (5,0%)	B, O	Nalistny	0,2 kg.	1	ND	Zaleca się stosować łącznie z rekomendowanym adiuwantem
		Toto 75 SG IP	tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 682 g/kg (68,2%), metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 68 g/kg (6,8%)	B, B	Nalistny	70-90 g.	1	ND	
		Tytan 75 SG IP	tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 682 g/kg (68,2%), metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 68 g/kg (6,8%)	B, B	Nalistny	70-90 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH Rw-32 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fantom 069 EW IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)	A	Nalistny	1,0-1,2 l.	1	ND	
		Puma Uniwersal 069 EW IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)	A	Nalistny	1,0-1,2 l.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Axial One 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenilopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistny	1,0-1,3 l.	1	ND	
		Axial Komplett IP	pinoksaden (związek z grupy fenilopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistny	1,0-1,3 l.	1	ND	
		Avoxa 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenilopirazolin) – 33,3 g/l (3,15%) piroksulam(związek z grupy triazolopirymidyn) – 8,33 g/l (0,79 %)	A, B	Nalistny	1,35 – 1,8 l/ha	1	ND	
		Apyros 75 WG + Atpolan 80 EC IP	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistny	13,3-26,5 g + 1,5 l.	1	ND	
		Nylon 75 WG + Atpolan 80 EC IP	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistny	13,3-26,5 g + 1,5 l.	1	ND	
		Ossetia IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Nalistny	0,24 kg..	1	ND	Zalecany w uprawie pszenicy durum
		Dicolen 200 EC	fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów (fiołek polny,jasnota purpurowa) środek można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG.
		Fluroherb 200 EC	fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów (fiołek polny,jasnota purpurowa) środek można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG.
		Galaper 200 EC	fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów (fiołek polny,jasnota purpurowa) środek można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG.

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Herbistar 200 EC	fluoroksypr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów (fiołek polny,jasnota purpurowa) środek można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG.
		Flurostar 200 EC	fluoroksypr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %)	O	Nalistny	0,75-1,0 l.	1	ND	W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów (fiołek polny,jasnota purpurowa) środek można stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG.
		Chwastox CF IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (18,23%),Chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 20 g/l (1,82%)Fluoroksypr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 40 g/l (3,65%)	O	Nalistny	2,0 – 3,0 l.	1	ND	
		Bron 500 SG + Trend 90 EC IP	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 20 g/l (1,82%)	B	Nalistny	30-35 g + 0,05%	1	ND	
		Granstar SX 50 SG + Trend 90 EC IP	fluoroksypr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 40 g/l (3,65%)	B	Nalistny	30-35 g. + 0,05%	1	ND	
		Fenfludi 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Nalistny	0,24 kg/ha.	1	ND	
		Mendel 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Nalistny	0,24 kg/ha.	1	ND	
		Triben X 500 SG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistny	30-35 g. + 0,05%	1	ND	
		Trimmer 50 SG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 500 g/kg (50%) + adiuwant	B	Nalistny	30-35 g. + 0,05%	1	ND	
		Vima Florasulam 2,4 D IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %), 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH Rw-37 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy początku liścia flagowego)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aron 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylpirazolin) - 50 g/l (5,05%)	A	Nalistny	0,6-1,2 l/ha	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Paxio 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylpirazolin) - 50 g/l (5,05%)	A	Nalistny	0,6-1,2 l/ha	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aneks SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 40%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 10% + adiuwant	B, B	Nalistny	120-150 g. + 0,1%	1	ND	
		Rubin SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 40%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 10% + adiuwant	B, B	Nalistny	120-150 g. + 0,1%	1	ND	
Chwasty dwuliścienne		Calibre SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistny	48-60 g. + 0,05%	1	ND	
		Pragma SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistny	48-60 g. + 0,05%	1	ND	
		Granstar Ultra SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistny	48-60 g. + 0,05%	1	ND	
		Picaro SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistny	48-60 g. + 0,05%	1	ND	
		Aloksypyr 250 EC	fluoroksypr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (25 %)	O	Nalistny	0,5-0,8 l.	1	ND	
		Fluoroxane 200 EC	fluoroksypr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	

		Fluxyr 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200g/l (20,29%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Galarane 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Helm Flurox 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Hurler 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Jackdow 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Saroksypr 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (25 %)	O	Nalistny	0,5-0,8 l.	1	ND	
		Stamigan 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistny	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Wikary 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-29 (wiosną od pierwszego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Lexus 50 WG IP	fluprysulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Nalistny	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-29 (wiosną od fazy drugiego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Tomigan Forte 102,5 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (10,07%)	B, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-31 (wiosną od fazy 2 liści do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chisel Nowy 51,6 WG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 469g/kg (46,9%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 47 g/kg (4,7%). + adjuwant	B, B	Nalistny	90 g. +0,1%	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-32 (wiosną od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Camaro 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Deresz Bis 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Diablo 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Eguo 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Feniks 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Horse 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		King 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Kojot 306 SEIP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Muskato 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Mustang 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Rumak 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Vima- Florasulam 2,4-D IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistny	0,4-0,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-39 (wiosną od fazy 2 liści do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego)									
		Fluxyr Pro	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20,43%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Lumer 50 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Nalistny	30 g.	1	ND	
		Minstrel	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20,43%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Saracen Max 80 WG IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 200 g/kg (20%), tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 600 g/kg (60%)	B, B	Nalistny	25 g.	1	ND	
		Tripali 27,1 WG	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 105 g/kg (10,5%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 83 g/kg (8,3%) tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 83 g/kg (8,3%)	B, B, B	Nalistny	50 g.	1	ND	Środek może powodować na niektórych odmianach zbóż objawy fitotoksyczności m.in. w postaci przebarwień czy zahamowania wzrostu. Objawy te mają jednak charakter przemijający i nie wpływają na plonowanie.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-25 (wiosną od fazy 3 liści do fazy pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Caliban 178 WG IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 10 g/kg (1,1%), propoksylkarbazon sodowy (związek z grupy sulfoniloaminokarbonylotriazolinonów) – 168 g/kg (17,7%)	B, B	Nalistny	0,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-29 (wiosną od fazy 3 liści do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aurora 40 WG IP	karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 40%	E	Nalistny	50 g.	1	ND	
		Aurora 40 WG + Pike 20 WG IP	karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 40% + metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 200 g/kg (20%)	E + B	Nalistny	40 g + 20 g.	1	ND	
		Fox 480 SC IP	bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l (40,6 %)	E	Nalistny	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-31 (wiosną od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Traxos 50 EC IP	klodinafop (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropinowego) – 25 g/l (2,58%) pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) –25 g/l (2,58%)	A, A	Nalistny	1,2 l/ha	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Gold 450 EC	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 360 g/l (33,68%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 90 g/l (8,42%).	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-32 (wiosną od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Floram 50 SC IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%)	B	Nalistny	0,1 l.	1	ND	
		Kantor 050 SC IP	florasulam (związek z grupy sulfonoamidów) - 50 g/l (4,84 %)	B	Nalistny	0,08-0,1 l.	1	ND	
		Saracen 050 SC IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%)	B	Nalistny	0,1 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-33 (wiosną od fazy 3 liści do trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Finy 200 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) -200 g/kg (20%)	B	Nalistny	22,5-30 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-37 (wiosną od fazy 3 liści do fazy początku liścia flagowego)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Axial 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistny	0,6-1,2 l.	1	ND	
		Fraxial 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistny	0,6-1,2 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Starane 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistny	0,6-0,8 l.	1	ND	
		Taran 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistny	0,6-0,8 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-39 (wiosną od fazy 3 liści do w pełni rozwiniętego liścia flagowego)									
		Assynt 500 SG	tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Nalistny	30 g.	1	ND	
		Biathlon 4 D IP	tritosulfuron - związek z grupy pochodnych triazyntosulfonilomocznika – 714 g/kg (71,4%), florasulam - związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 54 g/kg (5,4%)	B, B	Nalistny	0,04-0,07 kg.	1	ND	W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmoćnić działanie środka poprzez dodatek adiuwantu Dash HC w dawce 1 l/ha

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Blusky 500 WG IP	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistny	16-20 g.	1	ND	
		Flame 500 SG	tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Nalistny	30 g.	1	ND	
		Hadden 550 WG IP	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistny	0,08-0,1 g.	1	ND	
		Mofat 500 WG IP	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistny	16-20 g.	1	ND	
		Nautius WG IP	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistny	0,08-0,1 g.	1	ND	
		Pygmee 550 WG IP	tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 400 g/kg (40%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 150 g/kg (15 %)	B, B	Nalistny	0,08-0,1 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-45 (wiosną od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Mattera	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l (0,54 %) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopolikolinyowych) – 6,25 g/l (0,76 %)	B, O	N	0,5-1,0 l.	1	50	
		Pixxaro IP	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopolikolinyowych - 12 g/l (1,16%), fluoksypyr meptylu (pochodne kwasów pirydynokarboksylowych) - 280 g/l (27,03%)	O,B	Nalistne	0,5 l.	1	ND	
		Renitar IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l (0,54 %) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopolikolinyowych) – 6,25 g/l (0,76 %)	B, O	Nalistne	0,5-1,0 l.	1	50	
		Zypar IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l (0,54 %) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopolikolinyowych) – 6,25 g/l (0,76 %)	B, O	Nalistne	0,5-1,0 l.	1	50	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 20-29 (wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Major 300 SL IP	chloryalid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)	O	Nalistne	0,3-0,4 l/ha	1	ND	
		ProSto 300 SL IP	chloryalid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)	O	Nalistne	0,3-0,4 l/ha	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 20-39 (wiosną od początku krzewienia do końca fazy strzelania w źdźbło – faza w pełni rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Omnera LQM IP	fluoksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 135 g/l(13,65%), tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) -30g/l(3,03%), metsulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 5 g/l (0,51%)	O, B, B	Nalistny	0,5 - 1,0 l/ha	1	ND	
		Trailer 750 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 g/ha	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-29 (wiosną od początku do końca krzewienia)									
Chwasty jednoliscienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Sekator 125 OD IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 25 g/l (2,21%), amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 100 g/l (8,86%)	B, B	Nalistny	0,15 l.	1	ND	
		Aminopielik D MAXX 430 EC IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l (35,84%), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l (5,15%)	O, O	Nalistny	1,0-1,5 l.	1	ND	
		Aminopielik Standard 600 SL IP	2,4-D- kwas (związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l	O	Nalistny	1,25-1,5 l.	1	ND	
		Chwastox 500 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistny	1,5 l.	1	ND	
		Chwastox 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Chwastox D 179 SL IP	MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%) dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 17,8 g/l (1,64%)	O, O	Nalistny	5,0 l.	1	ND	
		Chwastox Extra 300 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)	O	Nalistny	3,0 l.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chwastox Nowy Trio 390 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (16,7%) mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) - 150 g/l (12,5%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,3 %)	O, O, O	Nalistny	2,0 l.	1	ND	
		Chwastox Professional 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Chwastox Turbo 340 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)	O, O	Nalistny	2,5 l.	1	ND	
		Cloe 300 SL IP	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g/l (26,13%)	O	Nalistny	0,3-0,4 l/ha	1	ND	
		Dicopur 600 SL IP	2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l (50,17 %)	O	Nalistny	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Dicopur Top 464 SL IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O, O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Esteron 600 EC IP	2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l (50,17 %)	O	Nalistny	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Faworyt 300 SL IP	dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O	Nalistny	0,3-0,4 l.	1	ND	
		Helion 300 SL IP	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g/l (25,8%)	O	Nalistny	0,3-0,4 l.	1	ND	
		Jatagan 75 WG IP	tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonilomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistny	0,2 kg.	1	50	
		Lider 300 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%)	O	Nalistny	3,0 l.	1	ND	
		Lider D 750 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Mocarz 75 WG IP	tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonilomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistny	0,2 kg.	1	ND	
		Nokaut 75 WG IP	tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonilomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistny	0,2 kg.	1	ND	
		Pielik 85 SP IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) 85% (850 g/kg)	O	Nalistny	1,5- 2 kg.	1	ND	
		Premier 300 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%)	O	Nalistny	3,0 l.	1	ND	
		Premier 500 SL IP	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistny	1,5 l.	1	ND	
		Premier 750 SL IP	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)	O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Premier D 750 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Silacz 75 WG IP	tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonilomocznika) - 250 g/kg (25%), dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 500 g/kg (50%)	B, O	Nalistny	0,2 kg.	1	ND	
		Silacz Max 75 WG IP	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonilomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistny	0,2 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 21-30 (wiosną od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chlorsulfuron 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Nalistny	10 g.	1	ND	
		Sulfen 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Doglebowy / Nalistny	10 g.	1	ND	
		Tacyt 75 WG IP	chlorsulfuron (substancja z grupy sulfonilomoczników) - 750 g/kg (75 %)	B	Doglebowy / Nalistny	10 g.	1	ND	
		Chwastox Trio 540 SL IP	mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%) MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 200 g/l (16,20%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w postaci soli potasowej) - 40 g/l (3,24%)	O, O, O	Nalistny	2,0 l.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bron 750 WG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 0,05%	1	ND	
		Granstar 75 WG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 0,05%	1	ND	
		Helgran 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Helmstar 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Helm Tribi 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Pleban 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Tribex 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistny	20-25 g. + 1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 21-31 (wiosną od początku krzewienia do pierwszego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dragon NT 450 WG + Nomad 75 WG + Atpolan Bio 80 EC IP	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15%) aminopyralid - (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 300 g/kg (30%) + piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B, O + B	Nalistny	33g + 100-120 g + 1,0 l.	1	ND	
		Dragon NT 450 WG + Nomad 75 WG + Olstick 90 EC IP	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15%) aminopyralid - (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 300 g/kg (30%) + piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B, O + B	Nalistny	33g + 100-120 g + 1,0 l.	1	ND	
		Galmet 20 SG IP	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 20% (200 g/kg).	B	Doglebowy / Nalistny	30 g.	1	ND	
		Lancet Plus 125 WG IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%) piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/kg (5,0%) aminopyralid (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 50 g/kg (5%)	B, B, O	Nalistny	0,2 kg.	1	ND	
		Mover 75 WG + Atpolan Bio 80 EC IP	piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B	Nalistny	100-120 g + 1,0 l.	1	60	
		Nomad 75 WG + Atpolan Bio 80 EC IP	piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%) + adiuwant	B	Nalistny	100-120 g + 1,0 l.	1	60	
		Chenkar 750 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 68 g/kg (6,8%), tlfensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 682 g/kg (68,2%)	B, B	Nalistny	75 g.	1	ND	
		Dragon NT 450 WG IP	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15%) aminopyralid - (związek z grupy pirydynowych kwasów karboksylowych) - 300 g/kg (30%)	B, O	Nalistny	33 g.	1	ND	
		Ergon 750 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 68 g/kg (6,8%), tlfensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 682 g/kg (68,2%)	B, B	Nalistny	75 g.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Galmet 20 SG + Asystent 90 EC IP	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistny	30 g + 0,1 l.	1	ND	
		Looma 750 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 68 g/kg (6,8%), tífensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 682 g/kg (68,2%)	B, B	Nalistny	75 g.	1	ND	
		Primstar 20 SG + Asystent 90 EC IP	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistny	30 g + 0,1 l.	1	ND	
		Superherb 20 SG + Asystent 90 EC IP	metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 20% (200 g/kg) + adiuwant	B	Nalistny	30 g + 0,1 l.	1	ND	
		Vima-Tifenmet IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 68 g/kg (6,8%), tífensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 682 g/kg (68,2%)	B, B	Nalistny	75 g.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenoxinn 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistny	0,7 l.	1	ND	
		Herbos 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistny	0,5-0,7 l.	1	ND	
		Monarchi 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistny	0,7 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 21-32 (wiosną od początku krzewienia do drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Ambasador 75 WG IP	amidosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20-40 g.	1	ND	
		Agria 2,4 DeFlor-aminopyralid 195 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistny	1,0 l.	1	60	
		Ambasador 75 WG + Chwastox Turbo 340 SL IP	amidosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%) + MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)	B + O, O	Nalistny	10-20 g + 2,5 l.	1	ND	
		Atlantis Star IP	mezosulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 45 g/kg (4,5%) tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) - 22,5 g/kg (2,25%) jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 9 g/kg (0,9%)	B	Nalistny	0,2 kg.	1	ND	Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze adiuwantem Biopower
		Chwastox AS 600 E IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l (56,44%)	O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Chwastox CF IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (18,23%), chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 20 g/l (1,82%), fluoksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 40 g/l (3,65%)	O, O, O	Nalistny	2,0 – 3,0 l/ha	1	ND	
		Chwastox Complex 260 EW IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (18,23%), chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 20 g/l (1,82%), fluoksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 40 g/l (3,65%)	O, O, O	Nalistny	2,0 – 3,0 l.	1	ND	
		Chwastox MP 600 SL IP	mekoprop-P(związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli dimetyloaminowej - 600 g/l (52,9 % w/w)	O	Nalistny	2,0 l.	1	ND	
		Haksar Complex 260 EW IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (18,23%), chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 20 g/l (1,82%), fluoksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 40 g/l (3,65%)	O, O, O	Nalistny	2,0 – 3,0 l.	1	ND	
		Kantor Forte 195 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistny	1,0 l.	1	60	
		MCPA Plus 340 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,84 %) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,44 %)	O, O	Nalistny	2,5 l.	1	ND	

		Monolith 11,25 WG IP	propoksykarbazon sodowy(związek z grupy triazolinonów) – 67,5 g/kg (6,75%) mezosulfuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 45 g/kg (4,5%)	B, B	Nalistny	0,2 – 0,33 kg/ha	1	ND	Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Biopower
		Mustang Forte 195 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%), aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Quelex IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%) haloaksyfen metylu — Arylex™ (substancja z grupy związków arylokololinowych) – 104,2 g/kg (10,4%)	B, O	Nalistny	50 g.	1	ND	Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
		Saracen Delta 550 SC IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,10%)	F1	Nalistny	0,1 l.	1	ND	
		Starane 333 EC IP	fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych w postaci estru fluoksypyr 1-metyloheptylu) - 333 g/l (31,56%)	O	Nalistny	0,54 l.	1	ND	
		Tomahawk 200 EC	fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20,41%)	O	Nalistny	0,9 l/ha	1	ND	
		Weedox Plus 340 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,84 %) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,44 %)	O, O	Nalistny	2,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 21-33 (wiosną , od początku fazy krzewienia do fazy 3-go kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chwastox Moc 60 SG IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 600 g/kg (60 %)	O	Nalistny	1,0 - 1,25 kg.	1	ND	
		Chwastox Uniwersalny 60 SG	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 600 g/kg (60 %)	O	Nalistny	1,0 - 1,25 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 22-30 (wiosną od dwóch rozkrzewień do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Zlotosar 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,86%)	C2	Nalistny	2,5 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Finish SX 40 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 33,3% (333 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 6,7% (67 g/kg) + adiuwant	B, B	Nalistny	60-75 g + 0,05%	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 22-33 (wiosną od dwóch rozkrzewień do trzeciego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Feniks 069 EW IP	fenoksaprop-p-etylu (substancja z grupy pochodnych arylofenoksykwasów karboksylowych) – 69 g/l (6,54%)	A	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Fenoksaprop 069 EW IP	fenoksaprop-p-etylu (substancja z grupy pochodnych arylofenoksykwasów karboksylowych) – 69 g/l (6,54%)	A	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
		Hermes 069 EW IP	fenoksaprop-p-etylu (substancja z grupy pochodnych arylofenoksykwasów karboksylowych) – 69 g/l (6,54%)	A	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 23-31 (wiosną od początku fazy krzewienia roślin do końca fazy 1-go kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Huzar Activ Plus IP	2,4-D w postaci estru (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,8 %) jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 10 g/l (0,96 %) tienkarbazon metylowy (związek z grupy triazolinonów) – 7,5 g/l (0,72 %)	O,B,B	Nalistny	1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 23-33 (wiosną od trzech rozkrzewień do trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agritox 500 SL IP	MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%)	O	Nalistny	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 25 (wiosną w fazie pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Toluron 700 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 700 g/l (43,98%)	C2	Nalistny	2,0-2,5 l.	1	ND	
		Tolurex 500 SC IP	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,98%)	C2	Nalistny	2,0-2,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 25-29 (wiosną w fazie od pełni do końca krzewienia)									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Gradio 74,4 SG + Trend 90 EC IP	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O,B	Nalistny	0,8-1,0 kg.	1	ND	
		Granstar Power 74,4 SG + Trend 90 EC IP	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O,B	Nalistny	0,8-1,0 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 25-32 (wiosną od pełni krzewienia do końca fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Faraon 75 WG IP	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20-40 g.	1	ND	
		Grodyl 75 WG IP	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20-40 g.	1	ND	
		Tamigan 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)	O	Nalistny	0,6-0,8 l.	1	ND	
		Tomigan 250 EC	fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego - 250 g/l (24,78%)	O	Nalistny	0,6-0,8 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 25-33 (wiosną od pełni krzewienia do końca fazy trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Desperado 20 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistny	30 g.	1	ND	
		Pike 20 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistny	30 g.	1	ND	
		Winnetou 20 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistny	30 g.	1	ND	
BBCH 26-32 (wiosną od 6 rozkrzewień do końca fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Toraya 50 SG IP	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Nalistny	30 – 40 g.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulił czepnej) można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC
		Triben Super 50 SG IP	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistny	30-40 g.	1	ND	
		Tristar 50 SG IP	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 50% (500 g/kg)	B	Nalistny	30-40 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 31-39 (wiosną od pierwszego kolanka do całkowicie wykształconego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Adentis	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 – 25 g.	1	ND	
		Corida IP	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistny	20 – 25 g.	1	ND	
		Tomigan Forte 102,5 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,5 g/l (0,25%), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (10,07%)	B, O	Nalistny	1,0-1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 32-37 (wiosną od drugiego kolanka do początku liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Alladyn 71,4 WG IP	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonilomocznika) –714 g/kg (71,4%)	B	Nalistny	0,07 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 85-87 (dojrzałość woskowa miękka do twardej)									
		Agenor 450 SL IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistny	4,0 l.	1	7	
		Agrosar 360 SL IP	glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) - 360 g/l (36,0 %)	G	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
		Ardee Super 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
		Atut Bis 360 SL IP	glifosat – (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	ND	
		Barclay Barbarian Xtra 450 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistny	2,4-3,2 l.	1	14	
		Barclay Gallup Super 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
		Barclay Gallup Xtra 450 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistny	2,4-3,2 l.	1	14	
		Boom Efekt 360 SL IP	glifosat w formie soli izopropylloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	7	
		Bros zwalcza chwasty i korzenie glifosat 360 SL	glifosat: (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (31%)	G	Nalistny	4,0 l.	1	10	

Desykacja i
równoczesne
nieselektywne
niszczenie chwastów

Cordian 450 SL IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistny	3,2-4,0 l.	1	7	
Dominator Clean 360 SL IP	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	7	
Dominator Green 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,4%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	10-14	
Dominator HL 480 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 480 g/l (39,28%)	G	Nalistny	2,25-3,0 l.	1	10	
Envision 450 SL IP	glifosat (substancja z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,36 %)	G	Nalistny	2,5-3,2 l.	1	10	
Gallup Premium 360 IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Gallup Special 360 IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Gallup TF 360 IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Glifoherb 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (36,0 %)	G	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
Glifopol 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (36%)	G	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
Glifostar 360 SL IP	glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) – 360 g/l (30,85%)	G	Nalistny	3,0 l.	1	ND	
Glytoflash Super 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Glyphoflash Xtra 450 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistny	2,4-3,2 l.	1	14	
Helosate Plus 450 SL IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistny	3,2-4,0 l.	1	7	
Huragan Nowy 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Klean G IP	glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l(30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Klinik 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,7%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Klinik Duo 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,7%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Klinik Max 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,7%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Kosmik 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85%)	G	Nalistny	3,0 l.	1	ND	
Koyote 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Landmaster Clean 360 SL IP	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	7	
Marker 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	ND	
Master Gly IP	glifosat w formie soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Monosate G IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3 l. w 100-150 l wody lub 4 l. w 200-300 l wody	1	14	
Nufosate 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,7%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Resolva Total IP	glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) - 360 g/l (36,0 %)	G	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
Rosate Clean 360 SL IP	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	7	
Roundup 360 Plus IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 360 g/l (28,77%)	G	Nalistny	1,875-4,0 l.	1	ND	
Roundup Active 360 IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (28,5%)	G	Nalistny	1,3-4,0 l.	1	10	
Roundup Flex 480 IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 480 g/l (35,75%)	G	Nalistny	1,0-3,0 l.	1	7	
Roundup Trans Energy 450 SL IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (34,5%)	G	Nalistny	1,5-3,2 l.	1	10	
Roundup Ultra 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,87%)	G	Nalistny	4,0 l.	1	ND	
Sniper SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Taifun 360 SL IP	glifosat – (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	ND	
Tartan Super 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	14	
Trustee Hi-Aktiv SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 490 g/l (40,0%)	G	Nalistny	2,2-2,9 l.	1	14	
Trustee Xtra 450 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistny	2,4-3,2 l.	1	14	

		Zevio IP	glifosat – (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %)	G	Nalistny	3,0-4,0 l.	1	ND	
--	--	-----------------	---	---	----------	------------	---	----	--

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Zaprawy	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna / klasyfikacja (FRAC)	Działanie	Dawka	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
PRZED SIEWEM							
ŚNIEĆ CUCHNĄCA PSZENICY (Tilletia caries)	Prawidłowy plodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Amarant 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Bariton Super 97,5 FS IP	protriokonazol (50 g/l), fludioksonil (37,5 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 400–800 ml wody	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Baytan Trio 180 FS IP	triadimenol (150 g/l), fluksastrobina (25 g/l), fluopiram (5 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), pirydynoetylobenzamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawców mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septorioz liści.
		Beltone 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Beret Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Celest 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Celest Extra 050 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1200 ml wody	
		Celest Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Certicor 050 FS IP	metalaksyl-M (20 g/l), tebukonazol (30 g/l)	fenyloamidy (A1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500–900 ml wody	
		Difend FS IP	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 400–800 ml wody	
		Difend Extra FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 200 ml wody	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1200 ml wody	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0–1200 ml wody.
		Fluarto 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Funaben Plus 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 g + 900 ml wody	

		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400-800 ml wody	
		Kinto Duo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Madron 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Maredo 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Maxim 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-800 ml wody	
		Maxim Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Omnix Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 300 ml wody	
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 400 ml wody	
		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	

		Rancona 15 ME IP	Ipkonazol (15 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Rancona i-MIX ME IP	Ipkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 200 ml wody	
		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Redigo Pro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 400-800 ml wody	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Sarfun Duo 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Sarox Duo Active IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Sarox T 500 FS IP	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 700 ml wody	
		Sedextra Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści.
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 0-1500 ml wody	
		Syrius 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 g + 900 ml wody	
		Tebseme IP	tebukonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	120 ml	
		Tiosild Top 370 EC IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Tresser 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.

		Trigof 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Triter 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
		Vibrance Duo IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Duo 050 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1000 ml wody	
		Vibrance Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	
		Vibrance Star 070 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	
		Vibrance Trio 060 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	
		Vitavax 200 FS	karboksyna (200 g/l), tiuram (200 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 300 ml wody	
		Zaprawa Domnic 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS IP	tiuram (750 g/kg)	ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 g lub 200 g + 800 ml wody	
		Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS IP	karboksyna (375 g/l), tiuram (375 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 g + 800 ml wody	
		Zaprawa zbożowa Orius 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 g + 900 ml wody	
		Zaprawian 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.

ŚNIEĆ GŁADKA PSZENICY Tilletia laevis	Prawidłowy plodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Amarant 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Beltone 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Certicor 050 FS IP	metalaksyl-M (20 g/l), tebukonazol (30 g/l)	fenyloamidy (A1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500–900 ml wody	
		Fluarto 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400-800 ml wody	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Madron 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Maredo 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Rancona 15 ME IP	IPkonazol (15 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Rancona i-MIX ME IP	IPkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 200 ml wody	

		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Sarfun Duo 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Sarox Duo Active IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Sarox T 500 FS IP	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 700 ml wody	
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści.
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 0-1500 ml wody	
		Tiosild Top 370 EC IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Tresser 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
		Trigof 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Triter 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
		Zaprawa Domnic 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS IP	tiuram (750 g/kg)	ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 g lub 200 g + 800 ml wody	
		Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS IP	karboksyna (375 g/l), tiuram (375 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 g + 800 ml wody	
		Zaprawa zbożowa Orius 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Zaprawian 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.

ŚNIEĆ KARŁOWA PSZENICY (Tilletia controversa)	Prawidłowy plodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Celest Extra 050 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1200 ml wody	
		Difend 30 FS IP	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	250 ml + 400 ml wody	
		Difend Extra FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 200 ml wody	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1200 ml wody	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0–1200 ml wody.
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1000 ml wody	
ZGORZEL SIEWEK (kompleks patogenów)	Prawidłowy plodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Amarant 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Bariton Super 97,5 FS IP	protiokonazol (50 g/l), fludioksonil (37,5 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 400–800 ml wody	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Baytan Trio 180 FS IP	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), pirydynoetylobenzamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawców mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septorioz liści.
		Beltone 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Beret Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Celest 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Celest Extra 050 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1200 ml wody	
		Celest Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Certicor 050 FS IP	metalaksyl-M (20 g/l), tebukonazol (30 g/l)	fenyloamidy (A1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500–900 ml wody	
		Difend 30 FS IP	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	250 ml + 400 ml wody	
		Difend FS IP	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 400–800 ml wody	

		Difend Extra FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 200 ml wody	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1200 ml wody	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0–1200 ml wody.
		Fluarto 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Funaben Plus 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 g + 900 ml wody	
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400-800 ml wody	
		Kinto Duo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Madron 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Maredo 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Maxim 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-800 ml wody	
		Maxim Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 300 ml wody	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	

		Omnix Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Rancona 15 ME IP	IPkonazol (15 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Rancona i-MIX ME IP	IPkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 200 ml wody	
		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Redigo Pro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	66,7 ml + 400-800 ml wody	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Sarfun Duo 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Sarox Duo Active IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Sarox T 500 FS IP	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 700 ml wody	
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści.
		Sedextra Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 0-1500 ml wody	
		Syrius 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 g + 900 ml wody	

		Tiosild Top 370 EC IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Tresser 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
		Trigof 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Triter 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
		Vibrance Duo IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Duo 050 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1000 ml wody	
		Vibrance Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Vibrance Star 070 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Vibrance Trio 060 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Vitavax 200 FS	karboksyna (200 g/l), tiuram (200 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 300 ml wody	
		Zaprawa Domnic 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	
		Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS IP	tiuram (750 g/kg)	ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 g lub 200 g + 800 ml wody	
		Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS IP	karboksyna (375 g/l), tiuram (375 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 g + 800 ml wody	
		Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 g + 900 ml wody	

		Zaprawian 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw.
PLEŚŃ ŚNIEGOWA ZBÓŻ I TRAW (Monographella nivalis, anamorf: <i>Microdochium nivale</i>)	Prawidłowy plodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Bariton Super 97,5 FS IP	protiokonazol (50 g/l), fludioksonil (37,5 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 400–800 ml wody	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Baytan Trio 180 FS IP	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), pirydynyloetylobenzamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawców mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septorioz liści.
		Beltone 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Beret Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Celest 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Celest Extra 050 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1200 ml wody	
		Celest Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400–800 ml wody	
		Fluarto 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 500 ml wody	Środek wykazuje średni poziom zwiczenia.
		Goliat 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Goliat Trio 060 FS IP	difeokonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400-800 ml wody	
		Kinto Duo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Madron 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	
		Maredo 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	20 ml + 300 ml wody	
		Maxim 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-800 ml wody	

		Maxim Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 300 ml wody	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Omnix Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Rancona i-MIX ME IP	IPkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 200 ml wody	
		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Redigo Pro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	66,7 ml + 400-800 ml wody	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Sarox Duo Active IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Sarox T 500 FS IP	karboksyna (250 g/l), tiuram (250 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	300 ml + 700 ml wody	
		Savea 333 FS IP	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksamid (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 ml	Środek jest zarejestrowany również do zwalczania septoriozy liści i mączniaka prawdziwego (średni poziom zwalczania). Do zwalczania septoriozy liści można stosować Savea 333 FS w mieszaniu z Kinto Duo 080 FS (200 ml).
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści.
		Sedextra Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksamid (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Systiva 333 FS IP	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksamid (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150 ml	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści i mączniaka prawdziwego (średni poziom zwalczania). Do zwalczania septoriozy liści środek zarejestrowany jest również w mieszaniu ze środkiem Kinto Duo 080 FS w dawce 200 ml.
		Tiosild Top 370 EC IP	tiofanat metylowy (350 g/l), tetrakonazol (20 g/l)	benzimidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	
		Trigof 50 FS IP	fludioksonil (50 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 700 ml wody	

		Vibrance Duo IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Duo 050 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1000 ml wody	
		Vibrance Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	
		Vibrance Star 070 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	
		Vibrance Trio 060 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	
		Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS IP	karboksyna (375 g/l), tiuram (375 g/l)	karboksyanilidy (C2), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 g + 800 ml wody	
GŁOWNIA PYŁĄCA PSZENICY (Ustilago tritici)	Prawidłowy plodozmiń. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Amarant 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Belton 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 400 ml wody	
		Beret Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400-800 ml wody	
		Celest Extra 050 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1200 ml wody	
		Celest Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400-800 ml wody	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1200 ml wody	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0-1200 ml wody.
		Goliat Trio 060 FS IP	difeokonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400-800 ml wody	
		Kinto Duo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Konazol Duo 80 FS	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Maxim Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Omnix Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 300 ml wody	
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 400 ml wody	

		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150–200 ml + 400 ml wody	
		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 400 ml wody	
		Redigo Pro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	50 ml + 400-800 ml wody	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Sarfun Duo 515 FS IP	tebukonazol (15 g/l), tiuram (500 g/l)	triazole (G1), ditiokarbaminiany (M3)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	150-200 ml + 800 ml wody	
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 500 ml wody	Środek zapobiega występowaniu septoriozy liści.
		Sedextra Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	100 ml + 0-1500 ml wody	
		Vibrance Duo IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Duo 050 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0-1500 ml wody	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1000 ml wody	
		Vibrance Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Vibrance Star 070 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Vibrance Trio 060 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
ZGORZEL PODSTAWY ŻDŻBŁA (<i>Gaeumannomyces</i> <i>graminis</i> , <i>anamorfa:</i> <i>Harpophora</i> spp.)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Latitude 125 FS IP	siltiofam (125 g/l)	sililoamidy (C7)		200 ml	
		Latitude XL IP	siltiofam (125 g/l)	sililoamidy (C7)		200 ml	
OŚTRA PLAMISTOŚĆ OCZKOWA (<i>Rizoktonioza</i>) (<i>Ceratobasidium</i> <i>cereale</i> , <i>anamorfa:</i> <i>Ceratorhiza cerealis</i> ; <i>Thanatephorus</i> <i>cucumeris</i> , stadium strzępkowe: <i>Rhizoctonia cerealis</i>)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1000 ml wody	Środek wykazuje średni poziom zwłczania.
		Vibrance Opti IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek wykazuje średni poziom zwłczania.
		Vibrance Star 070 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek wykazuje średni poziom zwłczania.

		Vibrance Trio 060 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	Środek wykazuje średni poziom zwiczenia.
--	--	-----------------------------------	--	--	---	------------------------------------	--

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)									
Łamliwość źdźbła zbóż i traw (<i>Oculimacula acutiformis</i> , <i>Oculimacula yallundae</i>)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Antero 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści.
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Atropos 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	proiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		

Bansuri	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
Boogie Xpro 400 EC IP	protriokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.
Delaro 325 SC IP	protriokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminary i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.
Eyetak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Faxer	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Helmtop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	42	
Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Juwel TT 483 SE IP	epoksikonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1	35	
Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 08.11.2019 r.
Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

Murena	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.
Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.
Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (450 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Princess 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
ProchloGuard IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prochlorus	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Proplex 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Proszek 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Proton 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Quern 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	

Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinoxoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinoxoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinoxoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Toben 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	42	
Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksikonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
Tocata Duo IP	epoksikonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		

		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolino (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	węglony, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	węglony, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolino (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolino (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Virta 50 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	węglony, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolino (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI (Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp.)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolino (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolino (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		

		Aviator Xpro 225 EC IP	protriakonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		
		Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować w dawce 2 l/ha, przy dużym nasileniu tej choroby.
		Delaro 325 SC IP	protriakonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Input 460 EC IP	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kroton IP	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Proline Max 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	

		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
MAĆZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) RDZA BRUNATNA PSZENICY (Puccinia recondita f. sp. tritici) SEPTORIOZY LIŚCI (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza naszkowana liści	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

przewodna na rosn pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podługowego lub 1% liści z owocnikami. Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia;		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole (G1) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC IP	pentiopirad (200 g/l)	karboksyamid (C2)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopirad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopirad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1) + ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		

w fazie strzelania w
żdźbło 20% porażonej
powierzchni liścia
podflagowego lub 1%
liści

Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	
Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści.
Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw oraz septoriozy plew można stosować do 19.10.2019 r.
Aviator Xpro 225 EC IP	protriokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		
Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azoscan 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanka nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Boogie Xpro 400 EC IP	protriokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
Brasifun 250 EC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	

Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Buzz Ultra DF IP	tebukonazol (750 g/kg)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,33 kg/ha	1		Środek wykazuje średni poziom zwalczania Septoriozy paskowanej liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dąb 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

Delaro 325 SC IP	protriokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	
Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Fundand 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Harcer 425 SC	propikonazol (100 g/l), difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (225 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	61	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamid (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Imbrex XE IP	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw. Środek ogranicza tłamiwość źdźbła zboż i traw oraz brunatną plamistość liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Input 460 EC IP	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż i traw. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kier 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Kroton IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw można stosować w dawce 0,75 l/ha w fazie T1.
Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Ksystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek wdawce 2 l/ha ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż.
Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw jest skuteczny przy stosowaniu zapobiegawczym lub w początkowej fazie rozwoju choroby.
Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Megysto IP	izopirazam (125 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		

Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
Mollis 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw oraz septoriozy plew można stosować do 08.11.2019 r.
Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	30	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Ogam IP	epoksikonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i translaminary, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2)	układowy i translaminary, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek można stosować do 28.11.2019 r.
ProchloGuard IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Profuso IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Proline Max 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Prosaro 250 EC IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

Regalon IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek w dawce 2,0 l/ha ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż. Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Roosky 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	2/20	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż.
Rubric XL 300 IP	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Soligor 425 EC IP	protriokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest również dozwalczania fuzariozy liści.
Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sparta 200 EC IP	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	
Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Tarcza łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.

Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew.
Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej.
Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksamid (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,25 l/ha	2/14	35	Środek w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści stosować w dawce 1,5 l/ha.
Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew.
Vertisan 200 EC IP	pentiopirad (200 g/l)	karboksamid (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		

Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	penthiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, węglany i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	penthiopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, węglany i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
Vima-Propikonazol IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinoxoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, węglany i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinoxoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglany i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglany i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglany i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglany i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglany i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Afrodyta 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole (G1) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1) + ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści.
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 19.10.2019 r.
		Aviator Xpro 225 EC IP	protriakonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	
		Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	

		Azoscán 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania glównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania glównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Biomil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Boogie Xpro 400 EC IP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania glównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Dąb 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protriokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Elatas Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		

		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	
		Florian 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1		Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksikonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Juwel TT 483 SE IP	epoksikonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Klemens 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Ksystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek w dawce 2,0 l/ha ogranicza występowanie łamliwości źdźbła.

		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 08.11.2019 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	

		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		ProchloGuard IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Profuso IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Proline Max 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prosaro 250 EC IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Regalon IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek w dawce 2,0 l/ha ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż. Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	

		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Robin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Soligor 425 EC IP	protriokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest również do zwalczania fuzariozy liści.

		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	

		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksikonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	

		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do 12.12.2018r.
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		

		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ulysses 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 39). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	2/14	35	
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		

		Vertisan 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od pełni fazy krzewienia (BBCH 27).
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
MAĆZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek późniwnych, na których dojrzewają kleistoteczja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek późniwnych, na których dojrzewają kleistoteczja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Afrodyta 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Antero 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Atropos 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		

Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Clayton Roulette IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuza riozы kłosów.
Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Flexity 300 SC IP	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować od pełni fazy krzewienia (BBCH 22).
Florian 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	
Gloria 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	
Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.

Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Helmtop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	42	
Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
Klemens 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Profinity 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14		

Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Property 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14		
Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Quern 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
Robin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
Tern 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Toben 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	42	
Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tonki 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenylacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
Ulysses 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 39). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	

SEPTORIOZY LIŚCI (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach)		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 39). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Virta 50 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Abringo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Afrodyta 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Antero 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Atropos 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Avoca 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Azoxin 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Banko 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	
		Banko 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			

		Banko 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Bansuri	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Bolid 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bravo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Bumper 250 EC + Gwarant 500 SC IP	propikonazol (250 g/l) + chlorotalonil (500 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 1,0 l/ha			
		Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Chron 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	Środek wykazuje średni poziom zwalczania do BBCH 37.
		Chron 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			

		Chron 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Crotalo IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek wykazuje średni poziom zwalczania. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Comrade IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Cyproxy IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dithane NeoTec 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Divexo IP	chlorotalonil (375 g/l), fluksapyroksad (37,5 g/l)	ftalany, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Dove 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	Środek wykazuje średni poziom zwalczania do BBCH 37.
		Dove 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/15		

		Dove 500 SC + Soprano 125 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/15		
		Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protriokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczążającego	1,0 l/ha	1		
		Elatus Plus IP	benzowindylupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1		
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Eyetak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Faxer	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Florian 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1		Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Gloria 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Gwarant 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	Środek wykazuje średni poziom zwalczania do BBCH 37.
		Gwarant 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Guliver 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	Środek wykazuje średni poziom zwalczania do BBCH 37.

		Guliver 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Guliver 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Helmtop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Klemens 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Makler 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Mancozeb 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Murena	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Perseo IP	azoksystrobina (68 g/l, chlorotalonil (233 g/l)	strobiluryny (C3), ftalany (M5)	kontaktowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Princess 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Proceed IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prochlorus	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Proplex 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proton 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proszek 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	

		Robin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
		Rotazol IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sancozeb 80 WP IP	mankozeb (800 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14	42	
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sendo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sinconil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/7		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Spartakus	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Talonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	Środek wykazuje średni poziom zwalczania do BBCH 37.
		Talonil 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Talonil 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Toben 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Ulysses 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 39). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).

		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 39). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 27).
		Virta 50 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zoxis 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zoxy Plus IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Azoxin 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bolid 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	
		Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Elatus Era IP	benzowindylfupyr (75 g/l), protriokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		
		Elatus Plus IP	benzowindylfupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	

		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Makler 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Perseo IP	azoksystrobina (68 g/l, chlorotalonil (233 g/l)	strobiluryny (C3), ftalany (M5)	kontaktowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	2/14		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Zoxis 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) RDZA ŻDZBŁOWA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia graminis) Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 30% porażonej powierzchni liścia	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści.
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.

podflagowego.		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Elatus Plus IP	benzowindylupyr (100 g/l)	karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Imbrex XE IP	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza lamiwość żdźbła zbóż i traw oraz brunatną plamistość liści pszenicy. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż i traw. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Rubric XL 300 IP	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy źdźbłowej.

		Vima-Propikonazol IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO FAZY WIDOCZNYCH PIERWSZYCH OŚCI (BBCH 41–49)									
MACZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) RDZA BRUNATNA PSZENICY (Puccinia recondita f. sp. tritici) SEPTORIOZY LIŚCI (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) Macznik prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia.	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy.
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole (G1) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1-2/21	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cypikonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszaninę stosować od fazy 1.-go kolanka.
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolino (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Ares 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek stosować od fazy liścia flagowego (BBCH 39). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksamid (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		

Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1) + ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	
Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści.
Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw oraz septoriozy plew można stosować do 19.10.2019 r.
Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
Aviator Xpro 225 EC IP	protriokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		

Aylora 350 SC IP	penthiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, węglony i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azoscán 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Balear 720 SC IP	chlorotalonil (720 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy i węglony, do stosowania zapobiegawczego	1,0–1,4 l/ha	2/7	35	
Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Boogie Xpro 400 EC IP	protriokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksamid (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
Brasifun 250 EC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Joga 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Bukat 500 SC + Propico 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Weto 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Buzz Ultra DF IP	tebukonazol (750 g/kg)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,33 kg/ha	1		Środek wykazuje średni poziom zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dąb 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dafne 250 EC + Ares 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Dafne 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dafne 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dafne 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksikonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Delaro 325 SC IP	protriakonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, transaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	
Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
Fandango 200 EC IP	protriokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Fundand 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Guliver Max 720 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0-1,4 l/ha	2/7	35	Środek można stosować od fazy BBCH 37.
Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

Harcer 425 SC	propikonazol (100 g/l), difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (225 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	61	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Hutton 450 EC IP	protriokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 l/ha	1	35	Środek stosować od fazy liścia flagowego BBCH 37.
Imbrex XE IP	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek ogranicza brunatną plamistość liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Input 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Kier 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1	35	
Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Ksystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw jest skuteczny przy stosowaniu zapobiegawczym lub w początkowej fazie rozwoju choroby.
Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Megysto IP	izopirazam (125 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		
Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
Mollis 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy plew można stosować do 08.11.2019 r.
Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	30	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Perseo IP	azoksystrobina (68 g/l, chlorotalonil (233 g/l)	strobiluryny (C3), ftalany (M5)	kontaktowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Porter 250 EC + Ares 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Porter 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Porter 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Porter 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek można stosować do 28.11.2019 r.
ProchloGuard IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Propico 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

Regalon IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Roosky 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	2/20	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Rubric XL 300 IP	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sparta 200 EC IP	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	
Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Tarcza Łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	

Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,4 l/ha	1	35	
Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew.
Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej.
Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
Variano Xpro 190 EC IP	protriokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,25-1,5 l/ha	2/14	35	Środek w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści stosować w dawce 1,5 l/ha.

Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew.
Vertisan 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
Vima-Propikonazol IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolino (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolino (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Zafra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole (G1) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC IP	pentiopiryad (200 g/l)	karboksamid (C2)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopiryad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopiryad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		

		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1) + ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści.
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 19.10.2019 r.
		Aviator Xpro 225 EC IP	proiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	
		Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	

		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azteq 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azoscán 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Boogie Xpro 400 EC IP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	

		Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, transaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dąb 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, transaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), ciprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, transaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamid (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Hutton 450 EC IP	protriakonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować od fazy liścia flagowego BBCH 37.
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Input 460 EC IP	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	

		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Ksystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		

		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 08.11.2019 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	

		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		ProchloGuard IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

		Proline Max 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prosaro 250 EC IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Regalon IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21-28	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	

		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest również dozwalczania fuzariozy liści.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksikonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		

		Travis 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Treoris 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	2/14	35	
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Vertisan 200 EC IP	pentopirad (200 g/l)	karboksyamidy (C2)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		

		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, węglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, węglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, węglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		

		Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
MACZNIK PRAWDZIWE ZBÓŻE TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzejają kleistotęcza (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samyh Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzejają kleistotęcza (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samyh gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Antero 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Atropos 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	

Clayton Roulette IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
Bagani 125 ME IP	tetrazonol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 40). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Flexity 300 SC IP	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/21	35	
Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	
Gloria 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	
Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozyny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowania liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Profinity 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14		
Property 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14		
Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Quern 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Tern 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Tonki 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	

RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) RDZA ŻDŻBŁOWA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia graminis) Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 30% porażonej powierzchni liścia podflagowego.	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Virta 50 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bagani 125 ME IP	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 40). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.

		Elatus Era IP	benzowindylflupyr (75 g/l), protriokonazol (150 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.
		Elatus Plus IP	benzowindylflupyr (100 g/l)	karboksyamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.
		Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Imbrex XE IP	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza brunatną plamistość liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamid (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.
		Rubric XL 300 IP	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtawej.

		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksikonazol (90 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej.
		Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej.
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej.
		Soligor 425 EC IP	protriokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej.
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej.
		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej.
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej.
		Vima-Propikonazol IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Azoxin 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bagani 125 ME IP	tetrazonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i lecniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 40). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bolid 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.

Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	
Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
Cigal Plus 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	
Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	
Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,0 l/ha	1		
Elatus Plus IP	benzowindylupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	
Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Makler 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
Perseo IP	azoksystrobina (68 g/l), chlorotalonil (233 g/l)	strobiluryny (C3), ftalany (M5)	kontaktowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	2/14		
Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY (Mycosphaerella graminicola) SEPTORIOZA PLEW PSZENICY (Phaeosphaeria nodorum)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tonga 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Zoxis 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Abringo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Antero 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Atropos 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Avoca 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Azoxin 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bagani 125 ME IP	tetrazonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 40). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Banko 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			

		Banko 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Bolid 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.
		Bumper 250 EC + Gwarant 500 SC IP	propikonazol (250 g/l) + chlorotalonil (500 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 1,0 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51)
		Bravo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cigal Plus 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Chron 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Chron 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	

		Comrade IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Crotalo IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Cyproxy IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Dithane NeoTec 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Divexo IP	chlorotalonil (375 g/l), fluksapyroksad (37,5 g/l)	ftalany, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Dove 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/15		
		Dove 500 SC + Soprano 125 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/15		
		Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protriokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		
		Elatus Plus IP	benzowindylupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	
		Eyetak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Gloria 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Gwarant 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Guliver 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Guliver 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wycinającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wycinającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Makler 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści.

		Mancozeb 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Mastana IP	mankozeb (500 g/l)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	3/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Perseo IP	azoksystrobina (68 g/l, chlorotalonil (233 g/l)	strobiluryny (C3), ftalany (M5)	kontaktowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Princess 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolino (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Proceed IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Proplex 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Proton 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Proszek 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Quern 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować od fazy liścia flagowego BBCH 37. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Rotazol IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Sancozeb 80 WP IP	mankozeb (800 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14	42	
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sendo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sinconil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/7		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Spartakus	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talonil 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Talonil 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tonga 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unizeb Gold IP	mankozeb (500 g/l)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	3/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Virta 50 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zoxis 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zoxy Plus IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
FAZA BBCH 51–59 (FAZA KŁOSZENIA)									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) RDZA BRUNATNA PSZENICY (Puccinia recondita f. sp. tritici) SEPTORIOZY LIŚCI (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości:	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy.
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole (G1) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1-2/21	35	
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).

Septorioza liści w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści		Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolina (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
		Ares 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksamidy (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksamidy (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	penthiopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1) + ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Aviator Xpro 225 EC IP	proiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		
Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek do zwalczania mączniaka prawdziwego i septoriozy plew można stosować do 19.10.2019 r.
Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		

		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy, węglony i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, węglony i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoscán 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azteq 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Balear 720 SC IP	chlorotalonil (720 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	1,0–1,4 l/ha	2/7	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Boogie Xpro 400 EC IP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Brasifun 250 EC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	
Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).

Bukat 500 SC + Ares 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Joga 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Propico 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Weto 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Buzz Ultra DF IP	tebukonazol (750 g/kg)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,33 kg/ha	1		Środek wykazuje średni poziom zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek ogranicza występowanie fuzariozy kłosów.
Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego (U8), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cypromkonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Dafne 250 EC + Ares 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Dafne 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Dafne 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Dafne 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Dąb 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Delaro 325 SC IP	protriokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i węglony, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		v
Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Fundand 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Guliver Max 720 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0-1,4 l/ha	2/7	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Harcer 425 SC	propikonazol (100 g/l), difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (225 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	61	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		

Hutton 450 EC IP	protriokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 l/ha	1	35	
Imbrex XE IP	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw. Środek ogranicza brunatną plamistość liści pszenicy. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Input 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

Kier 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	dekŚrodek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
Kystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw jest skuteczny przy stosowaniu zapobiegawczym lub w początkowej fazie rozwoju choroby.
Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	

Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
Megysto IP	izopirazam (125 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
Mollis 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek do zwalczania mączniaka prawdziwego i septoriozy plew można stosować do 08.11.2019 r.

Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	30	
Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Porter 250 EC + Ares 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Porter 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Porter 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Porter 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Propico 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
ProchloGuard IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
Prosaro 250 EC IP	protriakonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		

Regalon IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
Roosky 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	2/20	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Rubric XL 300 IP	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do pełnifazy kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest również do zwalczania fuzariozy liści. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
Sparta 200 EC IP	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	1		
Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	
Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Tarcza łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew. Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej.
Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
Ulysses 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinoxoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,25-1,5 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści stosować w dawce 1,5 l/ha.
Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Vertisan 200 EC IP	pentiopirad (200 g/l)	karboksyamidy (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopirad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopirad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Vima-Propikonazol IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinoxoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.

Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinoxoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
Zakeo Opti + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		

		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w żdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		AgriStar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole (G1) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		

		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinoxoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
		Areva 200 EC IP	penthiopyrad (200 g/l)	karboksyamid (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	penthiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	penthiopyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamid (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1) + ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 19.10.2019 r.
		Aviator Xpro 225 EC IP	protriakonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

		Azoscán 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Boogie Xpro 400 EC IP	protriokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksikonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksikonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

		Dąb 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protriokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Elatys Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Fandango 200 EC IP	protriokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamid (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Hutton 450 EC IP	protriokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	35	

		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Input 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Kroton IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Ksystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Lotus Top 140 EC IP	epoksikonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksikonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l, azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 08.11.2019 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		ProchloGuard EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Profuso IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Proline Max 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Prosaro 250 EC IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Regalon IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		

		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Robin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Soligor 425 EC IP	protriakonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolino (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolino (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początkufazy kwitnienia (BBCH 61).
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początkufazy kwitnienia (BBCH 61).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanie można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Treoris 350 SC IP	penthiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid (C2), fitalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Ulysses 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamid (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny (C2), triazole (G1) + po pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Vertisan 200 EC IP	penthiopirad (200 g/l)	karboksyamid (C2)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopryad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, węglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopryad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, węglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, węglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		

		Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
MAĆZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzejawą kleistotęcja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samyh Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzejawą kleistotęcja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samyh gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Antero 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy BBCH 57.
		Atropos 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy BBCH 57.
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		
		Bagani 125 ME IP	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
Clayton Roulette IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	
Gloria 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	
Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza również występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczajającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Profinity 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	Środek stosować do pełnifazy kwitnienia (BBCH 65).
Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Property 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	Środek stosować do pełnifazy kwitnienia (BBCH 65).
Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Quern 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Robin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15-0,25 l/ha	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15-0,25 l/ha	2/14		
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
		Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
		Tern 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15-0,25 l/ha	2/14		
		Tonki 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza również występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0-2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15-0,25 l/ha	2/14		
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15-0,25 l/ha	2/14		
		Virta 50 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy BBCH 57.

RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) RDZA ŻDŻBŁOWA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia graminis) Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 30% porażonej powierzchni liścia podługowego.	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek zwalcza również fuzariozę liści. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/10	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bagani 125 ME IP	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Elatus Era IP	benzowindylflupyr (75 g/l), proiokonazol (150 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.

		Elatus Plus IP	benzowindylfupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Imbrex XE IP	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek ogranicza brunatną plamistość liści pszenicy. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Keypro IP	cypkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14–21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Rubric XL 300 IP	azoksystrobina (200 g/l), epoksykonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.

		Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy zdźblowej.
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy zdźblowej.
		Soligor 425 EC IP	protriakonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy zdźblowej.
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy zdźblowej.
		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy zdźblowej.
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy zdźblowej.
		Vima-Propikonazol IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy zdźblowej.
	RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Azoxin 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Bagani 125 ME IP	tetrazakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Bolid 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Cigal Plus 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protikonazol (150 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Elatus Plus IP	benzowindylupyr (100 g/l)	karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Keypro IP	cypkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Makler 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Perseo IP	azoksystrobina (68 g/l), chlorotalonil (233 g/l)	strobiluryny (C3), ftalany (M5)	kontaktowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminary, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		

SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY (Mycosphaerella graminicola) SEPTORIOZA PLEW PSZENICY (Phaeosphaeria nodorum)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Tarcza Plus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Tonga 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,25 l/ha	1		
		Zoxis 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Abringo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Antero 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy BBCH 57. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Atropos 500 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy BBCH 57. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Avoca 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Azoxin 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

		Bagani 125 ME IP	tetrakonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Bolid 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Bravo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Bravo Premium IP	propikonazol (62,5 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	40	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Chamane 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cigal Plus 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminary, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Comrade IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Crotalo IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cyproxy IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Dithane NeoTec 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Divexo IP	chlorotalonil (375 g/l), fluksapyroksad (37,5 g/l)	ftalany, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protriokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Eyetak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Gloria 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	2/14	45	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Keypro IP	cyprokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Inovor IP	piraklostrobina (200 g/l), fluksapyroksad (30 g/l), propikonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Makler 250 SE IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Mastana IP	mankozeb (500 g/l)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	3/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mancozeb 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Perseo IP	azoksystrobina (68 g/l, chlorotalonil (233 g/l)	strobiluryny (C3), ftalany (M5)	kontaktowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Princess 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Proceed IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Proplex 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Proton 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Proszek 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Quern 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Robin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Rotazol IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sancozeb 80 WP IP	mankozeb (800 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Sendo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sinconil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/7		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sinstar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Spartakus	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tonga 500 SC IP	tebukonazol (125 g/l), chlorotalonil (375 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Travis 350 SC IP	penthiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unizeb Gold IP	mankozeb (500 g/l)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	3,0 l/ha	3/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Virta 50 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy BBCH 57. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zoxy Plus IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zoxis 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
SEPTORIOZA PLEW PSZENICY (Phaeosphaeria nodorum)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksikonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agria Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Agria Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Allegro 250 SC IP	epoksikonazol (125 g/l), kreksosym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole (G1) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1-2/21	35	
Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Ambrossio 500 SC + Ares 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozoliny (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.

Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2) + triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1) + ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 19.10.2019 r.

Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
Aviator Xpro 225 EC IP	protriokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14		
Avoca 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Azoscán 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).

Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Balear 720 SC IP	chlorotalonil (720 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	1,0–1,4 l/ha	2/7	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
Boogie Xpro 400 EC IP	protriokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	
Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).

Bukat 500 SC + Ares 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Joga 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Propico 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Bukat 500 SC + Weto 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Ceando plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Dafne 250 EC + Ares 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Dafne 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Dafne 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Dafne 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Dąb 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksikonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).

Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		
Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Elatus Plus IP	benzowindylupyr (100 g/l)	karboksamid (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek ogranicza występowanie fuzariozy kłosów.
Fandango 200 EC IP	protriokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Fundand 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	
Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Guliver Max 720 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0-1,4 l/ha	2/7	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolino (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Harcer 425 SC	propikonazol (100 g/l), difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (225 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	61	
Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Hutton 450 EC IP	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 l/ha	1	35	
Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksikonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Juwel TT 483 SE IP	epoksikonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).

Kier 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	
Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
Ksystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny (G2) + imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

Megysto IP	izopirazam (125 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole (G1), ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
Mollis 450 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), difenokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9 l/ha - 1,0 l/ha	2/21	61	
Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	węglony, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 08.11.2019 r.
Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	30	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	
Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Porter 250 EC + Ares 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Porter 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Porter 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Porter 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r.
Prima Duo 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do 28.11.2019 r. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
ProchloGuard IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Prochloraz Bis 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Profuso IP	protriakonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Prokonazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1), imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Proline Max 460 EC IP	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	

Prosaro 250 EC IP	protriakonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinoxoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Prozid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinoxoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinoxoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinoxoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		

Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młeczej ziarna (BBCH 75).
Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany (M5)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		

Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek ograniczać występowanie fuzariozy kłosów.
Soligor 425 EC IP	protriakonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	35	
Sparta 200 EC IP	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	1		
Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

Talian 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	
Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Tarcza łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1), pochodne kwasu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	

Travis 350 SC IP	penthiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Treoris 350 SC IP	penthiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamid (C2), ftalany (M5)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Ulysses 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamid (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczajającego	1,25 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Vertisan 200 EC IP	penthiopirad (200 g/l)	karboksyamid (C2)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopryrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopryrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Vima-Propikonazol IP	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin (E1) + imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), quinozolin (E1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).

		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
	FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ (Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp., Monographella nivalis)	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksikonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamid (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha			Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole (G1)	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azbany 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		AzoGuard IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azteq 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azoscán 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminary i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania.
		Elatus Era IP	benzowindylupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania.
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fandango 200 EC IP	protriokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fezan IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/15	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany (M5), triazole (G1)	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Komilfo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ksystro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do 31.07.2019 r.
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	30	
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek w dawce 1,5 l/ha ogranicza występowanie fusariozy kłosów.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Polygreen Fungicide WP IP	oospori Pythium oligandrum	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha			Środek stosować w następujących terminach: - pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3–5 liści (BBCH 13–15), - drugi zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25–37), - trzeci zabieg wykonać od fazy kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55–65).
		Profuso IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Prosaro 250 EC IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	

		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Sendo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Sintop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sparta 200 EC IP	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	1		
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Spartakus	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Strobin 250-II IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tiofan 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tiptop 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,25 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Ulysses 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5-1,75 l/ha	1	42	
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Zakeo 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Zakeo Opti IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2-2,5 l/ha	2/14		
		Zetar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
CZERŃ ZBÓŻ (Alternaria spp., Cladosporium spp.)	Zapobieganie rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).	Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,8 l/ha	1		
Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Conclude AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dedal 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Dubler Mega 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Duo 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Epofanat 497 SC	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Globaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Profuso IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
Prosaro 250 EC IP	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		

Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21-28	35	
Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21-28		
Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	

		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Zakeo Opti + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany (M5), strobiluryny (C3) + triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		

SZKODNIKI									
Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna (IRAC/FRAC)	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11–23 (Pierwszy liść – krzewienie)									
Mszyce (Aphidodea) – wektory chorób wirusowych	Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, późny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N).	Arkan 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać jesienią. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Fastac Active 050 ME	alfa-cypermetyryna – 50 g/l (5,02%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,25 l/ha	2 / 7–10 dni	30	UWAGA: Środek stosować po zakończeniu dziennego oblotu pszczoł. Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Inazuma 130 WG IP	acetamipryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15 kg/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH13–19). Środek jest skuteczny niezależnie od temperatury powietrza panującej na plantacji.
		Inpower 130 WG IP	acetamipryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15 kg/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH13–19). Środek jest skuteczny niezależnie od temperatury powietrza panującej na plantacji.
		Judo 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać jesienią. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Karate Zeon 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać jesienią. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Karate Zeon 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,4%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją. W razie konieczności stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kusti 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać jesienią. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		LambdaCe 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać jesienią. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Nepal 130 WG IP	acetamipryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15 kg/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH13–19). Środek jest skuteczny niezależnie od temperatury powietrza panującej na plantacji.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Alfazot 025 EC	beta-cyflutryna – 25 g/l (2,75%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	35	UWAGA: Środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku okresu wylęgania się larw. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Alistar 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C
		Ammo Super 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.
		Arkan 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Asteria 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Bi 58 Nowy 400 EC IP	dimetoeat – 400 g/l (37,38%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 59–77). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Bi 58 Top 400 EC IP	dimetoeat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 40–99).Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Bulldock 025 EC	beta-cyflutryna – 25g/l	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	25	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku okresu wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Chlorop-Pro 480 EC	chloropirifos – 480 g/l (44,4%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo i wglębnie	0,5–0,6 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować na początku wylęgania się larw – faza rozwoju rośliny chronionej; początek kłoseń; widoczny wierzchołek kłosa – widoczne 30% kłosa (BBCH 50–53).Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Cimetryna 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cimex Forte 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cymetra 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyper-Fas 100 EC IP	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyperfor 100 EC	cypermetyryna –100 g/l (10,76%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25–0,3 l/ha	1	14	UWAGA: Niebezpieczne dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoseń do końca fazy kłoseń (BBCH 55-59). Środek stosować maksymalnie jeden raz w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyperkill Max 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65).Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyren 480 EC	chloropirifos – 480 g/l (44,86%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,6 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw, od fazy odstawiania się 40% kwiatostanu do pełni fazy kwitnienia. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Cythrin 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Danadim 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Danadim Progress 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 40–99). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Daskor 440 EC	chloropirifos metylu – 400 g/l (36,97%) + cypermetryna – 40 g/l (3,70%)	fosforoorganiczne (1B) + perytroidy (3A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy/ Na roślinie działa powierzchniowo i wglębnie	0,6 l/ha	1	60	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 30–69). Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15–25°C.
		Decis Mega 50 EW IP	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1–0,125 l/ha	2 / 14–21 dni	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		DelCaps 050 CS IP	deltametryna – 50 g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51–59) z uwzględnieniem progu szkodliwości. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delmetros 100 SC IP	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta 50 EW IP	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1–0,125 l/ha	2 / 14–21 dni	30	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		DelTop 050 CS IP	deltametryna – 50g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51–59) z uwzględnieniem progu szkodliwości. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		DeLux 050 CS IP	deltametryna – 50g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51–59) z uwzględnieniem progu szkodliwości. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Diego 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,9%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Fastac 100 EC	alfa-cypermetryna – 100 g/l (10,87%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Fastac Active 050 ME	alfa-cypermetryna – 50 g/l (5,02%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15–0,2 l/ha	2 / 7–10 dni	30	UWAGA: Środek stosować po zakończeniu dziennego oblotu pszczoł. Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Fiesta 100 EC IP	alfa-cypermetryna – 100 g/l (10,87%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Fury 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.
		Helm-Lambda 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczoł. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Hunter S 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Insektor 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.

		Judo 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kaiso 050 EG IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/kg (5%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 kg/ha	1	25	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty, środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Karate Zeon 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kivano 050 EG IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/kg (5%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 kg/ha	1	25	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty, środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Koron 100 SC IP	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kusti 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		LambdaCe 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Markiz 400 EC IP	dimetot – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Minuet 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Ninja 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pilgro 100 SC IP	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pitbul 025 EC IP	beta-cyflutryna – 25 g/l (2,75%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	35	UWAGA: Środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować od początku okresu wylęgania się larw. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Proalfacypermetrin	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pyrinex 480 EC	chloropirifos – 480 g/l (44,4%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo i włąębnie	0,5–0,6 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować na początku wylęgania się larw (faza rozwojowa rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa – widoczne 30% kłosa, (BBCH 50–53)). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Pyrinex Supreme 262 ZW IP	chloropirifos – 250 g/l (22,78%) + beta-cyflutryna – 12 g/l (1,09%)	fosforoorganiczne (1B) + perytroidy (3A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo i włąębnie	0,7–1 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń. Środek jest skuteczny niezależnie od temperatury powietrza panującej na plantacji.
		Pyrisimex 480 EC	chloropirifos – 480 g/l (44,4%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo i włąębnie	0,5–0,6 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować na początku wylęgania się larw (faza rozwojowa rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa – widoczne 30% kłosa, (BBCH 50–53)). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Rage 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.
		Rapid 060 CS IP	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw skrzyplonek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37-75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

	Rodan S 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51–73).Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
	Rogor 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (38,99%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od początku wylęgania się larw. Stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy mlecznej dojrzłości ziarna (BBCH 51–73).Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
	Rook 480 EC IP	chloropirifos – 480 g/l (44,4%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo i wglębnie	0,5–0,6 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować na początku wylęgania się larw (faza rozwoju rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa – widoczne 30% kłosa (BBCH 50–53)). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
	Rufous 100 EC IP	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Sherpa 100 EC	cypermetyryna – 100 g/l (10,76%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25–0,3 l/ha	1	14	UWAGA: Niebezpieczne dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia lub kiedy występują kwitnące chwasty. Usuwać lub przykrywać ulę podczas zabiegu i przez 2 dni po zabiegu. Opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia (BBCH 55–59). Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować insektycydy należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Sorcerer 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Sumicidin 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Super Cyper 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Superkill 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Supersect 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Tekapo 025 EC	beta-cyflotryna - 25 g/l	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	35	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować od początku okresu wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Titan 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować od początku wylęgania się larw. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
	Wojownik 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Stosować od początku wylęgania się larw. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

FAZA ROZWOJOWA BBCH 50–75 (Początek kłoszenia – dojrzłość mleczna)									
Wciornastki (Thysanoptera)	Zabiegi uprawowe, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie.	Fastac Active 050 ME	alfa-cypermetyryna – 50 g/l (5,02%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25–0,3 l/ha	2 / 7–10 dni	30	UWAGA: Środek stosować po zakończeniu dziennego oblotu pszczoł. Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Mszyce (Aphididae)	Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, późny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N).	A-Cyper 100 EC IP	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		AfiMax 500 EC	cypermetyryna - 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Alciper 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		AlfaCyper 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Alfacypermetyryna 10 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Alfastop 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Alfazot 025 EC	beta-cyflutryna – 25 g/l (2,75%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	35	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemienne ze środkami o innym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Alstar 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego - do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemienne z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C
		Ammo Super 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego - do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemienne z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C
		Arkan 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Asteria 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Bi 58 Nowy 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,38%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żółdkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować po wykoszeniu nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 59–77). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Bi 58 Top 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żółdkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Bulldock 025 EC	beta-cyflutryna – 25g/l	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	35	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cimetryna 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cymetra 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cimex Forte 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyper-Fas 100 EC IP	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żółdkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Cyperfor 100 EC	cypermetryna – 100 g/l (10,76%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25-0,3 l/ha	1	14	UWAGA: Niebezpieczne dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Opryskiwać po wykłoszeniu, po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc; od początku fazy kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63-73). Środek stosować maksymalnie jeden raz w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cythrín 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyreteroidów środek stosować przemienne z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Danadim 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Danadim Progress 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Daskor 440 EC	chloropirifos metylu – 400 g/l (36,97%) + cypermetryna – 40 g/l (3,70%)	fosforoorganiczne (1B) + pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo i węglonie	0,6 l/ha	1	60	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 50–70). Środek działa najsilniej w temperaturze 15–25°C.
		Decis Mega 50 EW IP	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1–0,125 l/ha	2 / 14–21 dni	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta 50 EW IP	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1–0,125 l/ha	2 / 14–21 dni	30	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Deltakill	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C. Zabieg wykonać wiosną lub latem po wystąpieniu szkodnika, od fazy pełni kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 55-75). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Diego 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,9%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Fastac 100 EC	alfa-cypermetryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Fastac Active 050 ME	alfa-cypermetryna – 50 g/l (5,02%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,25 l/ha	2 / 7–10 dni	30	UWAGA: Środek stosować po zakończeniu dziennego obrotu pszczoł. Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Fiesta 100 EC IP	alfa-cypermetryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Fury 100 EW IP	zeta-cypermetryna – 100 g/l (9,7%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego - do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.
		Helm-Lambda 100 CS IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,74%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,04–0,05 l/ha	1	28	UWAGA: Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczoł. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Hunter S 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.

		Insektor 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Judo 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kaiso 050 EG IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/kg (5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 kg/ha	1	25	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół. Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kaiso Sorbie IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/kg (5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 kg/ha	1	25	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół. Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Karate Zeon 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,16–0,2 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kivano 050 EG IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/kg (5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,10 kg/ha	1	25	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kusti 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		LambdaCe 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Mainman 50 WG IP	flonikamid - 500 g/kg	karboksamidy (29)	W roślinie działa układowo	0,14 kg/ha	2 / 21 dni	28	UWAGA: Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika. Środek należy stosować przemienne z insektycydami z grup chemicznych o innym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 5- 25°C.
		Markiz 400 EC IP	dimetoat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Minuet 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego - do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Ninja 050 CS IP	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075–0,1 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pirimor 500 WG IP	pirymikarb - 500 g/kg (50%)	karbaminiany (1A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / W roślinie działa systemicznie	0,25 kg/ha	1	35	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających dla dawki powyżej 0,42 kg/ha nie stosować na rośliny w czasie kwitnienia, kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Pitbul 025 EC IP	beta-cyflutryna – 25 g/l (2,75%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	35	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemienne ze środkami o innym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Proalfacypermetrin	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pyrinex Supreme 262 ZW IP	chloropirifos – 250 g/l (22,78%) + beta-cyflutryna – 12 g/l (1,09%)	fosforoorganiczne (1B) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo i w glebie	1 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń. Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Rage 100 EW IP	zeta-cypermetyryna – 100 g/l (9,7%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	2 / 14 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od fazy ukazania liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.

		Rapid 060 CS IP	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37-75). Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C
		Rodan S 400 EC IP	dimetostat – 400 g/l (37,84%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Rogor 400 EC IP	dimetostat – 400 g/l (38,99%)	fosforoorganiczne (1B)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,5 l/ha	1	21	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51–73). Środek działa najsilniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Rufous 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (10,87%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 7–10 dni	28	UWAGA: Stosować po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Scatto	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać wiosną lub latem po wystąpieniu szkodnika, od fazy pełnej kłoszenia zboża do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 55–75). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów niż zalecane, stosować zalecane środki owadobójcze zawierające substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Serbot 015 EW IP	deltametryna – 15 g/l (1,45%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,30–0,42 l/ha	1	30	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować z chwilą wystąpienia szkodnika po wykoszeniu zbóż, jednak nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 59–75). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów niż zalecane, stosować zalecane środki owadobójcze zawierające substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C
		Sherpa 100 EC	cypermetyryna – 100 g/l (10,76%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25–0,3 l/ha	1	14	UWAGA: Niebezpieczne dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia lub kiedy występują kwitnące chwasty. Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez 2 dni po zabiegu. Opryskiwać po wykoszeniu, po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63–73). Aby zapobiecjawiskowi oporności środki stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować insektycydy należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sorcerer 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemienne ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sparrow IP	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37 –75). Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20°C.
		Sparviero IP	lambda-cyhalotryna –100 g/l (9,53%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37 –75). Środek działa skutecznie w temperaturze poniżej 20°C.
		Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sumicidin 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Super Cyper 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Z uwagi na możliwość wystąpienia oporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemienne ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Superkill 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Środek działa najsilniej w temperaturze poniżej 20°C.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wolek zbożowy (<i>Sitophilus granarius</i> L.) Spichrzal surynamski (<i>Oryzaephilus surinamensis</i> L.) Trojszyk ulec (<i>Tribolium confusum</i> DuV.) Trojszyk gryzący (<i>Tribolium castaneum</i> Herbst) Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella Hübner) Mklik mączny (Ephestia kuehniella Zell.) Rozplaszczyk rdzawy (<i>Cryptolestes ferrugineus</i> Steph.)	APS	fosforek glinu – 560 g/kg (56%)	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m ³ (4–5 g fosforowodoru/ m ³)	1	ne dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
	APS Peletki	fosforek glinu – 560 g/kg (56%)	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m ³ (4–5 g fosforowodoru/ m ³)	1	ne dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
	APS Tabletki	fosforek glinu – 560 g/kg (56%)	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 4– 5 tabletek/tonę (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 4–5 tabletek/m ³ (4–5 g fosforowodoru/m ³)	1	ne dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
	Fumiphos	fosforek glinu – 560 g/kg (56%)	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m ³ (4–5 g fosforowodoru/ m ³)	1	ne dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
	Greenphos	fosforek glinu – 560 g/kg (56%)	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m ³ (4–5 g fosforowodoru/ m ³)	1	ne dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
	Greenphos Pellets 73 GE	fosforek glinu – 560 g/kg (56%)	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m ³ (4–5 g fosforowodoru/ m ³)	1	ne dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
	Greenphos Tablets	fosforek glinu – 560 g/kg (56%)	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 4–5 tabletek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 4–5 tabletek/m ³ (4–5 g fosforowodoru/m ³)	1	nie dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.

		Morta	fosforek glinu – 56%	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m³ (4–5 g fosforowodoru/ m³)	1	nie dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
		Quickphos Pellets 56 GE	fosforek glinu – 56%	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m³ (4–5 g fosforowodoru/ m³)	1	nie dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
		Quickphos Tablets 56 GE	fosforek glinu – 56%	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 4– 5 tabletek/tonę (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 4–5 tabletek/m³ (4–5 g fosforowodoru/m³)	1	nie dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
		Sobieski 56P	fosforek glinu – 56%	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 20–25 pastylek/t (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 20–25 pastylek/m³ (4–5 g fosforowodoru/ m³)	1	nie dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
		Sobieski 56T	fosforek glinu – 56%	inhibitory transportu elektronów (24A)	Gazowy	Luzem: 4– 5 tabletek/tonę (4–5 g fosforowodoru/t) Worki: 4–5 tabletek/m³ (4–5 g fosforowodoru/m³)	1	nie dotyczy	UWAGA: Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3–8 dni. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.