INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PROGRAM OCHRONY PSZENICY JAREJ

Program ochrony pszenicy ozimej przygotowany w ramach zadania 1.4

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności

Poznań 2021

Program opracowany pod redakcją:
prof. dr hab. Marka Korbasa

Autorzy:
Chwasty - dr hab. Roman Kierzek, mgr inż. Krystyna Miklaszewska
Choroby - prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, mgr inż. Jakub Danielewicz
Szkodniki - prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr Przemysław Strażyński

FAZY ROZWOJOWE

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony)



Komentarz:

Program integrowanej ochrony pszenicy jarej przed chwastami, chorobami i szkodnikami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w maju 2021 roku.

Wszystkie środki należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

CHWASTY

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna	Mechanizm działania substancji aktywnej (wg HRAC)	Działanie	Dawka kg(l). (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-09 (przed wschodami rośliny uprawnej)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenfludi 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg.	1	**ND**	
		Mendel 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg.	1	**ND**	
		Ossetia IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg.	1	**ND**	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10-32 (od początku fazy rozwoju liścia do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Sunda IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,6 %)	A	N	1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-30 (faza od pierwszego liścia do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Glean 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg)	B	Doglebowe / Nalistne	7,0 g.	1	ND	Rośliny inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie.
		Nuher 75 WG IP	chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg)	B	Doglebowe / Nalistne	7 g/ga	1	ND	Rośliny inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-32 (po wchodach aż do fazy strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenfludi 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg.	1	ND	
		Mendel 500 WG IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg.	1	ND	
		Ossetia IP	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/kg (50%)	F1	Doglebowe	0,24 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-37 (faza od pierwszego liścia do początku liścia flagowego)									
Owies głuchy i chwastnica jednostronna	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Addar 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%).	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Aron 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Axel-R 50 EC **IP**	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Axial 50 ECIP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Fraxial 50 ECIP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Kaxia 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Paella 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Paxio 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Pinoxy 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Piksoden50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Rapino 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-31 (faza od 2 liści do pierwszego kolanka)									

Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chisel Nowy 51,6 WG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 469g/kg (46,9%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 47 g/kg (4,7%) + adiuwant	B, B	Nalistne	60 g. + adiuwant stężenie 0,05%	1	ND	Chisel Nowy 51.6 WG powinien być zawsze stosowany z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml adiuwanta na 100 l wody). Środek zwalcza chwasty z rodziny kapustowatych będące wektorami sprawcy kiły kapusty
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 12-32 (faza od 2 liści do drugiego kolanka)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aldaro 306 SE IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%) w formie kwasu, co odpowiada 452 g/l w formie estru 2-etyloheksylowego, florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l (0,59%)	O, B	Nalistne	0,6 l.	1	ND	
		Bachmat 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Deresz Bis 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Deresz Bis I 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Diablo 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Dresz 306 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g /l środka (0,58 %), 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (27,84 %).	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Eguo 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Fendra 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,59 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,12 %)	B, O	Nalistne	0,6 l.	1	ND	
		Feniks 306 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g w 1 l środka (0,58 %). 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (42,32%)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Floras 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Horse 306 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l środka (0,58 %). 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		King 306 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/1 (0,58%) 2,4-D(związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (42,32%)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Kojot 306 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g /l środka (0,58 %). 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (27,84 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Matbach 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Muskato 306 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g w 1 l środka. 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Mustang 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Pegas IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,59 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,12 %)	B, O	Nalistne	0,6 l.	1	ND	
		Rumak 306 SE IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	

		Vima-Florasulam 2,4 D	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 12-39 (od 2 liści do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fluxyr Pro	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 288g/l (28,6%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Galaper Extra 200 EC	fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 288 g/l (28,6%), co odpowiada 200 g/l (20,43 %) czystego fluroksypyru	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Minstrel	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 288g/l (28,6%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Omnera LQM IP	fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 135 g/l (13,65%), tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 30 g/l (3,03%), metsulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 5 g/l (0,51%)	O, B, B	Nalistne	0,5 - 1,0 l	1	ND	
		TrlPali 27,1 WG	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 105 g/kg (10,5%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 83 g/kg (8,3%) tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 83 g/kg (8,3%)	B, B, B	Nalistne	50 g.	1	ND	Środek może powodować na niektórych odmianach zbóż objawy fitotoksyczności m.in. w postaci przebarwień czy zahamowania wzrostu. Objawy te mają jednak charakter przemijający i nie wpływają na plonowanie.
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 13-25 (faza od 3 liści do pełni krzewienia)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Jatagan 75 WG IP	tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg) dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	
		Mocarz 75 WG IP	tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg) dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	0,2 kg.	1	ND	
		Nokaut 75 WG IP	tritosulfuron(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)- 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	0,2 kg.	1	ND	W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
		Siłacz 75 WG IP	tritosulfuron(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)- 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	0,2 kg.	1	ND	
		Siłacz Max 75 WG IP	tritosulfuron(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)- 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	0,2 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 13-29 (faza od 3 liści do końca krzewienia)**									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Concert SX 44 SG IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 % (400 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 4 % (40 g/kg)	B, B	Nalistne	100 g.	1	ND	Po zastosowaniu środka możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (m.in. w formie rozjaśnień blaszek liściowych), które nie mają wpływu na plonowanie zbóż.
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Alliance 660 WG IP	diflufenikan (związek z grupy anilidów)- 600 g/kg (60 %) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)- 60 g/kg (6 %)	F1, B	Nalistne	100g.	1	ND	W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		Artegon 450 WG IP	florasulam - (związek z grupy triazolopirymidyn) - 150 g/kg (15% aminopyralid – (związek z grupy pochodnych kwasu pyridynokarboksylowego) - 300 g/kg (30%)	B, O	Nalistne	25 g.	1	ND	środek należy stosować wyłącznie w mieszaninie z rekomendowanym adiuwantem np. DASSOIL

		Aurora 40 WG IP	karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 40%	E	Nalistne	50 g.	1	ND	
		Gildox 660 WG IP	diflufenikan (związek z grupy anilidów)- 600 g/kg (60 %) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)- 60 g/kg (6 %)	F1, B	Nalistne	100g.	1	ND	W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		Siłacz M 75 WG **IP**	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)	B, O	Nalistne	0,2 kg.	1	ND	
		Sebbus 125 OD IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,21%) amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)	B, B	Nalistne	0,1-0,15 l.	1	ND	
		Sekator 125 OD IP	jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,21%) amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)	B, B	Nalistne	0,1-0,15 l.	1	ND	
		Starane 250 EC + Granstar 75 WG	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%) + tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%	O + B	Nalistne	0,3 l. + 15 g.	1	ND	
		Taran 250 EC + Granstar 75 WG	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%) + tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%	O + B	Nalistne	0,3 l. + 15 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 13-30 (od fazy 3 liści do strzelania w źdźbło)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Tamigan 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)	O	Nalistne	0,6-0,8 l.	1	ND	
		Tomigan Antra 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)	O	Nalistne	0,6-0,8 l.	1	ND	
		Tomigan 250 EC	fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego - 250 g/l (24,78%).	O	Nalistne	0,6-0,8 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 13-31 (od fazy 3 liści do pierwszego kolanka)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Gold 450 EC	2,4-D - związek z grupy fenoksykwasów - 360 g/l (33,68%). fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych - 90 g/l (8,42%).	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 13-32 (od fazy 3 liści do drugiego kolanka)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bron 500 SG + Trend 90 EC 0,05% IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg) + adiuwant	B	Nalistne	25-30 g. + adiuwant 0,05%	1	ND	
		Emcee IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 750 g/l (63,8 %)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Granstar SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 50% + adiuwant	B	Nalistne	25-30 g. + adiuwant 0,05%	1	ND	
		Laserto 050 SC **IP**	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%	B	Nalistne	0,08-0,1 l.	1	ND	
		Saracen 050 SC IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%	B	Nalistne	0,08-0,1 l.	1	ND	

		Sekator Plus IP	2,4-D 2-EHE (związek z grupy estrów fenoksykwasów) – 433 g/l (39,36%) amidosulfuron w formie soli sodowej (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,41%) jodosulfuron metylo sodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,25 g/l (0,57%)	O, B, B	Nalistne	0,45 - 0,6 l	1	ND	
		Triben X 500 SG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 50% + adiuwant	B	Nalistne	25-30 g. + adiuwant 0,05%	1	ND	
		Trimmer 50 SG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 50% + adiuwant	B	Nalistne	25-30 g. + adiuwant 0,05%	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-37 (od fazy 3 liści do początku liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Calibre SX 50 SG + Trend 90 EC 0,05% IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 16,7% + adiuwant	B, B	Nalistne	36 - 48 g. + adiuwant 0,05 %	1	ND	
		Granstar Ultra SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.	B, B	Nalistne	40-48 g. + adiuwant 0,05%	1	ND	
		Picaro SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25% + adiuwant	B, B	Nalistne	40-48 g. + adiuwant stężenie0,05%	1	ND	
		Pragma SX 50 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 16,7% + adiuwant	B, B	Nalistne	36-48 g. + adiuwant stężenie 0,05	1	ND	
		Starane 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistne	0,6 l.	1	ND	
		Taran 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,77%)	O	Nalistne	0,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-39 (od fazy trzeciego liścia do fazy w pełni wykształconego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Biathlon 4 D + Dash HC IP	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 71,4% (714 g/kg), florasulam - związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 5,4% (54 g/kg) + adiuwant	B, B	Nalistne	0,04-0,07 kg. + 0,1 l.	1	ND	
		Blusky 500 WG IP	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	16-20 g.	1	ND	
		Croupier OD IP	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowego) - 225 g/l (20,56%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 9 g/l (0,82 %)	O, B	Nalistne	0,67 l.	1	ND	
		FlorasuGuard IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Loop IP	bensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50,0%), metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/kg (4,0%)	B, B	Nalistne	100 g.	1	ND	

		Mofat 500 WG IP	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	16-20 g.	1	ND	
		TrimetGuard IP	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%	B, B	Nalistne	16-20 g.	1	ND	
		Scriven 050 SC IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Ultegra 050 SC IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Upton 050 SC IP	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Xanadu IP	bensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50,0%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/kg (4,0%)	B, B	Nalistne	100 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 13-45 (od 3 liści do końca nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	GF-2573 IP	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 7,5 g/l (7,81 %)	O	Nalistne	0,4-0,8 l.	1	ND	
		Mattera IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l (0,54 %) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 6,25 g/l (0,76 %)	B, O	Nalistne	0,5-1,0 l.	1	50	
		Pixxaro IP	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 12 g/l (1,16%), fluroksypyr meptylu (pochodne kwasów pirydynokarboksylowych) - 280 g/l (27,03%)	O, O	Nalistne	0,25-0,5 l.	1	50	
		Renitar IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l (0,54 %) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 6,25 g/l (0,76 %)	B, O	Nalistne	0,5-1,0 l.	1	50	
		Zypar IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l (0,54 %) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 6,25 g/l (0,76 %)	B, O	Nalistne	0,5-1,0 l.	1	50	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 14-29 (pd fazy czwartego liści do końca krzewienia)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agroxone Max 750 SL IP	MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)	O	Nalistne	0,75 l.	1	ND	
		Chwastox 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	0,75 l.	1	ND	
		Dicoherb 750 SL IP	MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)	O	Nalistne	0,75 l.	1	ND	
		Dicopur 600 SL IP	2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l (50,17 %)	O	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Esteron 600 EC IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 905 g/l	O	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Flurostar Super SE IP	fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 100 g/l (9,96%) Florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn)– 1 g/l (0,10%)	O, B	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	ND	W celu zwalczania przytulii czepnej w późnych fazach rozwojowych środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH do 39)
		Pielik 85 SP IP	2,4-D w formie jednowodnej soli sodowej (związek z grupy fenoksykwasów) 85% (850 g/kg)	O	Nalistne	1,0-1,5 kg.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Axial One 50 EC IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	0,67-1,3 l.	1	ND	
		Axial Komplett IP	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	0,67-1,3 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 14-30 (od 4 liści do początku fazy strzelania w źdźbło)**									

Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Galaxo 150 WG IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%) jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50	B, B, B	Nalistne	0,18 kg.	1	ND	Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant Super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.
		Herpende 150 WG IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%) jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50	B, B, B	Nalistne	0,18 kg.	1	ND	Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant Super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.
		Mepengo 150 WG IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%) jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50	B, B, B	Nalistne	0,18 kg.	1	ND	Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant Super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 14-32 (od fazy 4 liści do fazy drugiego kolanka)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agria 2,4 DeFlor - Aminopyralid 195 SE IP	florasulam - związek z grupy triazolopirymidyn – 5 g/l (0,47%), aminopyralid - związek z grupy pirydyn – 10 g/l (0,94 %), 2,4-D –związek z grupy fenoksykwasów - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	0,8 l.	1	45	
		Kantor Forte 195 SE IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%) aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %) 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 180 g/l (17,0 %)	B, O, O	Nalistne	0,8 l.	1	45	
		Kojot Forte 195 SE IP	florasulam - związek z grupy triazolopirymidyn – 5 g/l (0,47%) aminopyralid - związek z grupy pirydyn – 10 g/l (0,94 %) 2,4-D –związek z grupy fenoksykwasów - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	0,8 l.	1	45	
		Mustang Forte 195 SE IP	florasulam - związek z grupy triazolopirymidyn – 5 g/l (0,47%) aminopyralid - związek z grupy pirydyn – 10 g/l (0,94 %) 2,4-D –związek z grupy fenoksykwasów - 180 g/l (17 %)	B, O, O	Nalistne	0,8 l.	1	45	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 15-29 (od fazy 5 liści do końca krzewienia)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Faraon 75 WG IP	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
		Grodyl 75 WG IP	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75% (750 g/kg)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 20-31 (od końca fazy strzelania w źdźbło do pierwszego kolanka)**									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenuxar 069 EW IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów propionowych) - 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	W celu jednoczesnego zwalczania jednoliściennych i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Fenuxar 69 EW w mieszaninie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL w dawce: Fenuxar 69 EW 1,0 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2,0 l/ha
		Sarfenox 69 EW IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów propionowych) - 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	W celu jednoczesnego zwalczania jednoliściennych i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Fenuxar 69 EW w mieszaninie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL w dawce: Fenuxar 69 EW 1,0 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2,0 l/ha
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 20-39 (od końca fazy strzelania w źdźbło do w pełni rozwiniętego liścia flagowego)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bazoka 750 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Botrin 750 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Coalicion 750 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Exanimo 750 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Trailer 750 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 21-29 (od fazy początku krzewienia do końca krzewienia**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aminopielik D Maxx 430 EC IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l (35,84%), dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l (5,15%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Aminopielik Super 464 SL IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,73%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,37%)	O, O	Nalistne	0,8 l.	1	ND	

		Chwastox 500 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistne	1,1 l.	1	ND	
		Chwastox Extra 300 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Chwastox Professional 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	0,75 l.	1	ND	
		Dicopur Top 464 SL IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O, O	Nalistne	0,8 l.	1	ND	Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek.
		Lider 300 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Lider D 750 IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Premier 300 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Premier 500 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 500 g/l (44,3%))	O	Nalistne	1,2-1,5 l.	1	ND	
		Premier 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)	O	Nalistne	0,75 l.	1	ND	
		Premier D 750 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Tayson 464 SL IP	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%)	O, O	Nalistne	0,8 l.	1	ND	Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek.
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 21-30 (od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło)**									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fantom 069 EW IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Flash 069 EW	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC
		Foxtrot 069 EW IP	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC.Środek może powodować przemijające przebarwienia liści nie wpływające jednak na plon.
		Norton 069 EW IP	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC.Środek może powodować przemijające przebarwienia liści nie wpływające jednak na plon.
		Puma Uniwersal 069 EW IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Rumba 069 EW IP	fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)	A	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w celu obniżenia dawki środek stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC.Środek może powodować przemijające przebarwienia liści nie wpływające jednak na plon.
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fantom 069 EW + Chwastox Turbo 340 SL IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%) + MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,9 %) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)	A + O, O	Nalistne	1,0 l. + 2 l.	1	ND	Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie czterech liści właściwych owsa głuchego.
		Fantom 069 EW + Sekator 125 OD IP	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%) + jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,21%) amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)	A + B, B	Nalistne	1,0 l. + 0,1 l.	1	ND	Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie czterech liści właściwych owsa głuchego.
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agritox Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	

		Agroxone Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Bron 750 WG + Trend 90 EC 0,05% IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + adiuwant 0,05%	1	ND	W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		Dicoherb Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (789g/l) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + adiuwant stężenie 0,05%	1	ND	W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		Granstar 75 WG + Trend 90 EC IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + adiuwant stężenie 0,05%	1	ND	W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		Helgran 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Helgran 75 WG + Silwett IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 0,1 l.	1	ND	
		Helm Tribi 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Helm Tribi 75 WG + Silwett IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 0,1 l.	1	ND	
		Helmstar 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Helmstar 75 WG + Silwett IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 0,1 l.	1	ND	
		Nutox Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Platform 61,5 SG IP	karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin)– 15 g/kg (1,5%) mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g/kg (60%)	E, O	Nalistne	0,6-1,0 kg.	1	ND	Środek może spowodować przemijające uszkodzenia zbóż bez wpływu na dalsza wegetację i plon.
		Pleban 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Pleban 75 WG + Silwett IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 0,1 l.	1	ND	
		Ranga 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 1,5 l.	1	ND	
		Ranga 75 WG + Silwett IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 0,1 l.	1	ND	
		Tribex 75 WG + Atpolan 80 EC IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 1,5 l.	1	ND	

		Tribex 75 WG + Silwett IP	tribenuron metylowy – (związek z grupy sulfonylomocznikowych) - 750 g/kg (75%) + adiuwant	B	Nalistne	15-20 g. + 0,1 l.	1	ND	
		Weed-Tox Turbo 750 SL IP	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 21-31 (od początku krzewienia do pierwszego kolanka**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	MCPA 300 SL IP	MCPA – 300 g/l (26,5%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Weedox 300 SL IP	MCPA – 300 g/l (26,5%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenoxinn 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	0,7 l.	1	ND	W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
		Herbos 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	0,7 l.	1	ND	W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
		Monarchi 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	0,7 l.	1	ND	W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 21-32 (od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka)**									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fundamentum 700 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 400 g/kg (40,0%) , metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 135 g/kg (13,5%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)	B, B, B	Nalistne	25-30 g.	1	ND	Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Fundamentum 700 WG 25 g. + Asystent+ 0,1 l.
		Locus 700 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 400 g/kg (40,0%) , metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 135 g/kg (13,5%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)	B, B, B	Nalistne	25-30 g.	1	ND	Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Fundamentum 700 WG 25 g. + Asystent+ 0,1 l.
		MCPA Plus 340 SL IP	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,84 %) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,44 %)	O, O	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Quelex IP	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 104,2 g/kg (10,4%)	B, O	Nalistne	50 g.	1	ND	Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów
		Tomahawk 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20,41%)	O	Nalistne	0,9 l.	1	ND	
		Troping 700 WG IP	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 400 g/kg (40,0%) , metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 135 g/kg (13,5%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)	B, B, B	Nalistne	25-30 g.	1	ND	Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Fundamentum 700 WG 25 g. + Asystent+ 0,1 l.
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Apyros 75 WG + Atpolan 80 EC IP	sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %) + adiuwant	B	Nalistne	26,5 g. + 1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA **BBCH 22-32 (od dwóch rozkrzewień do fazy drugiego kolanka)**									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Finish SX 40 SG + Trend 90 EC IP	tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 33,3% (333 g/kg) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,7% (67 g/kg) + adiuwant	B, B	Nalistne	60-75 g. + adiuwant stężenie 0,05%	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 23-32 (od fazy trzeciego rozkrzewienia do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agritox 500 SL IP	MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%)	O	Nalistne	0,2-1,5 l.	1	ND	
		Gradio 74,4 SG + Trend 90 EC IP	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O	Nalistne	0,8-1,0 l. + adiuwant stężenie 0,05%	1	ND	
		Granstar Power 74,4 SG + Trend 90 EC IP	mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%) tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g/kg (1%) + adiuwant	O	Nalistne	0,8-1,0 l. + adiuwant stężenie 0,05%	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 24-39 (od fazy krzewienia, gdy widoczne są 4 rozkrzewienia aż do fazy liścia flagowego, gdy liść flagowy jest całkowicie rozwinięty)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Arrva IP	fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynylokarboksylowych) – 72 g/l (6,39%), co odpowiada 50 g/l (4,44 %) czystego fluroksypyru, chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 28 g/l (2,49 %)MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 233 g/l (20,69 %)	O, O, O	Nalistne	2,0 - 3,0 l.	1	ND	
		Kinvara IP	fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasow pirydynylokarboksylowych) – 72 g/l (6,39%), co odpowiada 50 g/l (4,44 %) czystego fluroksypyru chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasow pirydynokarboksylowych) – 28 g/l (2,49 %) MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 233 g/l (20,69 %)	O, O, O	Nalistne	2,0 - 3,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25 (faza pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Attribut 70 SG IP	propoksykarbazon sodowy (związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 70%.	B	Nalistne	60 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 25-32 (od fazy pełni krzewienia do fazy trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Pike 20 WG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	20-30 g.	1	ND	
		Winnetou 20 SG IP	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%).	B	Nalistne	20-30 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 85-87 (dojrzałość woskowa miękka do twardej)									
Desykacja i równoczesne nieselektywne niszczenie chwastów	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agenor 450 SL IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	2,5-3,2 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
		Boom Efekt 360 SL SL IP	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
		Cordian 450 SL IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	2,5-4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
		Glyphomax Clean 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	3,0 -4,0 l.	1	ND	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej, można jej używać jako pasze lub podściółkę dla zwierząt.

		Hopper Clean 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	3,0 -4,0 l.	1	ND	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej, można jej używać jako pasze lub podściółkę dla zwierząt.
		Rofosat Agro 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (31%)	G	Nalistne	2,0-4,0 l.	1	ND	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
		Roundup 360 Plus IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	1,875-4,0 l.	1	ND	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
		Roundup 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l	G	Nalistne	4,0 l.	1	ND	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
		Roundup Trans Energy 450 SL IP	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (34,5%)	G	Nalistne	1,5-3,20 l.	1	10	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
		Roundup Ultra 360 SL IP	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,87%)	G	Nalistne	4,0 l.	1	ND	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Zaprawy	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
PRZED SIEWEM							
ŚNIEĆ CUCHNĄCA PSZENICY (Tilletia caries)	Prawidłowy płodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Baytan Trio 180 FS IP**	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), pirydynyloetylobenzamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek zapobiega wystąpowaniu chorób liści do fazy początku strzelania w źdźbło. Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Beltone 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Beret Star IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Celest 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Celest Extra 050 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1200 ml wody**	
		Celest Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek ogranicza występowanie ostrej plamistości oczkowej.
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Certicor 050 FS IP	metalaksyl-M (20 g/l), tebukonazol (30 g/l)	fenyloamidy (A1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500–900 ml wody**	
		Dividend Xtra 030 FS IP	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1200 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0–1200 ml wody.
		Funaben Plus 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Flutik 50 FS IP	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	
		Flutrix 50 FS IP	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Goliat 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	

		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Lamardor 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	
		Maxim 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Maxim Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Omnix Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 300 ml wody**	
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Prepper IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 200-800 ml wody**	
		Rancona 15 ME IP	ipkonazol (15 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	
		Rancona i-MIX ME IP	ipkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Redigo Pro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Retro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	

		Sedextra Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Sedevax 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	
		Syrius 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Tebseme IP	tebukonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**120 ml**	
		Tresser 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Tridox 50 FS IP	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	
		Triter 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Vibrance Duo IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Duo 050 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vibrance Pro IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Vibrance Star IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Vibrance Star 070 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	

		Vigror Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vitona IP	ipkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Zaprawa zbożowa Orius 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Zaprawa Sarfun 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150-200 ml + 400 ml wody**	
		Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Zaprawian 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
ŚNIEĆ GŁADKA PSZENICY Tilletia laevis	Prawidłowy płodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Beret Trio 060 FS IP**	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Certicor 050 FS IP	metalaksyl-M (20 g/l), tebukonazol (30 g/l)	fenyloamidy (A1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500–900 ml wody**	
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Lamardor 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	
		Rancona i-MIX ME IP	ipkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	

		Sedevax 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	
		Seedron 60 FS IP	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vitona IP	ipkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Zaprawa Sarfun 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150-200 ml + 400 ml wody**	
		Zaprawa zbożowa Orius 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
ŚNIEĆ KARŁOWA PSZENICY (Tilletia controversa)	Prawidłowy płodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Difend 30 FS IP**	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**250 ml + 400 ml wody**	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**250 ml + 0–1200 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0–1200 ml wody.
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vigror Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
ZGORZEL SIEWEK (kompleks patogenów)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Baytan Trio 180 FS IP**	triadimenol (150 g/l), fluoksastrobina (25 g/l), fluopyram (5 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), pirydynyloetylobenzamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek zapobiega wsytępowaniu chorób liści do fazy początku strzelania w źdźbło. Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Beltone 25 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Beret Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Celest 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS IP	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Certicor 050 FS IP	metalaksyl-M (20 g/l), tebukonazol (30 g/l)	fenyloamidy (A1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500–900 ml wody**	
		Diadem IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek.

		Difend 30 FS IP	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0–1200 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0–1200 ml wody.
		Flutik 50 FS IP	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	
		Flutrix 50 FS IP	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	
		Funaben Plus 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Goliat 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS IP	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Kareo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek.
		Kinto Duo 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek.
		Lamardor 400 FS IP	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	
		Maxim 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Orius Universal 75 ES IP	prochloraz (15 g/l), tekukonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 300 ml wody**	
		Omnix 025 FS IP	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	
		Premis 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Premis Pro 080 FS IP	prochloraz (60 g/l), tritikonazol (20 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	

		Rancona i-MIX ME IP	ipkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Real 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	
		Real Super 080 FS IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie tej choroby.
		Redigo Pro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Retro 170 FS IP	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia.
		Scenic 080 FS IP	fluoksastrobina (37,5 g/l), protiokonazol (37,5 g/l), tebukonazol (5 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 500 ml wody**	
		Seman IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek.
		Sigona IP	prochloraz (20 g/l), tritikonazol (60 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie zgorzeli siewek.
		Syrius 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Tresser 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Tridox 50 FS IP	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	
		Triter 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vigror Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	

		Vitona IP	ipkonazol (20 g/l), imazalil (50 g/l)	triazole (G1), imidazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 200 ml wody**	
		Zaprawa Sarfun 025 FS IP	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150-200 ml + 400 ml wody**	
		Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS IP	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Zaprawian 050 FS IP	tritikonazol (50 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 700 ml wody**	
GŁOWNIA PYLĄCA PSZENICY (Ustilago tritici)	Prawidłowy płodozmian. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Beret Star IP**	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	200 ml + 0–1500 ml wody	
		Celest Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1200 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania sprawcy septoriozy plew pszenicy, w tym przypadku stosować w dawce 187,5 ml + 0–1200 ml wody.
		Gizmo 060 FS IP	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Maxim Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Omnix Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Sedextra Power IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Vibrance Duo IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Duo 050 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vibrance Pro IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Vibrance Star IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Vibrance Star 070 FS IP	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Vigror Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA (Gaeumannomyces graminis, anamorfa: Harpophora spp.)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż.	**Latitude XL IP**	siltiofam (125 g/l)	sililoamidy (C7)		**200 ml**	

OSTRA PLAMISTOŚĆ OCZKOWA (Rizoktonioza) (Ceratobasidium cereale, anomorfa: Ceratorhiza cerealis; Thanatephorus cucumeris, stadium strzępkowe: Rhizoctonia cerealis)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Vibrance Gold 100 FS IP**	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vigror Gold 100 FS IP	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)									
Łamliwość źdźbła zbóż i traw (Oculimacula acuformis, Oculimacula yallundae) **orientacyjny prógszkodliwości:** 20–30% źdźbeł z	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Aviator Xpro 225 EC IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		Środek ogranicza występowanie tej choroby.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI (Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp.)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie	**Aviator Xpro 225 EC IP**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		Środek ogranicza występowanie tej choroby.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) **RDZA BRUNATNA PSZENICY (Puccinia recondita f. sp. tritici)** **SEPTORIOZY LIŚCI (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum)** **(septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach)** **Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia.** **Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia.** **Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30–50%**		**Amistar 250 SC IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		AsPik 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14	35	
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Clayton Divot 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści		**Clayton Navaro 250 EC IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cortez 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Gigant 275 SC IP	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Juwel TT 483 SE	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Ksykon 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 31.10.2021 r.
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21	30	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39l).
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Prizm 275 SC IP	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		
		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Safir 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sauron 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Secardo XE 125 EC	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Silvestro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Skymaster 280 SC IP	azoksystrobina (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Thesorus 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) **Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		
		AsPik 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek mozna stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Juwel TT 483 SE	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Proguin 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sauron 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Silvestro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Skymaster 280 SC IP	azoksystrobina (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Thesorus 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.

		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,5 l/ha**	2/14		
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Bariba IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

	choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	**Betera 50 EW IP**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Blumeris 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Britibi IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Celsivo 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Cindo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cindo Plus 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clayton Cyflux IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clayton Hybrid IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clufen 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cyflamid 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cyflux 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Eizo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Feris 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Glora 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Juan 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie brunatnaje plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liścici, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Marpica IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie brunatnaje plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liścici, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Prokarb 450 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty (BBCH 37).
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Rodeo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza również występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tern 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tern Turbo 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tonki 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza również występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Umbret 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY (*Mycosphaerella graminicola*)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Azaka 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Bansuri	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek mozna stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Empartis IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Emponor IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Faxer	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Glora 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		

		Lotus Top 140 EC	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14-21	42	
		Metkon 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
		Mezzuri 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
		Mirror 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty (BBCH 37).
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Trovoris IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		X-Met 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
SEPTORIOZA PLEW PSZENICY (*Phaeosphaeria nodorum*)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Metkon 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
		Mezzuri 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).

		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		X-Met 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta,	**Allegro 250 SC**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

	uprawa odmian o podwyższonej odporności.	**Ascra Xpro 260 EC IP**	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek mozna stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Corrib EC	prochloraz (300 g/l), epoksykonazol (75 g/l)	imidazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	1		Środek stosować do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Empartis IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Emponor IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Exactris IP	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Lotus Top 140 EC	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14-21	42	
		Metkon 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
		Mezzuri 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Prokarb 450 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Trovoris IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		X-Met 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do fazy, gdy widoczny jest liść flagowy (BBCH 37).
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) **Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 30% porażonej powierzchni liścia podflagowego.	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	**Bajlando 500 SC**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek mozna stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Exactris IP	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	

		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty (BBCH 37).
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO FAZY WIDOCZNYCH PIERWSZYCH OŚCI (BBCH 41–49)									

MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (Puccinia recondita f. sp. tritici) **SEPTORIOZY LIŚCI** (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) **Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. **Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. **Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. **Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Amistar 250 SC IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		AsPik 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Clayton Divot 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Clayton Navaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cortez 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	
		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	

		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33. Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Gigant 275 SC IP	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Juwel TT 483 SE	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek można stosować do 31.10.2021 r.
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	

		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Prizm 275 SC **IP**	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		
		Profuso **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proline Max 460 EC **IP**	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promesa **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Safir 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Secardo XE 125 EC	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Sauron 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Silvestro 250 EC **IP**	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Skymaster 280 SC **IP**	azoksystrobina (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Sokół 460 EC **IP**	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek można stosować od fazy 3 kolanka (BBCH 33).
		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	
		Soprano 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Thesorus 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) **Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		
		AsPik 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33. Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Juwel TT 483 SE	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.

		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33–0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sauron 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Silvestro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Skymaster 280 SC IP	azoksystrobina (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek można stosować od fazy 3 kolanka (BBCH 33).
		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	

		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Thesorus 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,5 l/ha**	2/14		
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Bariba IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Betera 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Blumeris 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Britibi IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Celsivo 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Cindo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

		Cindo Plus 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clayton Cyflux IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clayton Hybrid IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clufen 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cyflamid 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cyflux 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Eizo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Feris 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Glora 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Juan 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie brunatnaje plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liścici, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Marpica IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie brunatnaje plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liścici, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Prokarb 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-l 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Rodeo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza również występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tern 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tern Turbo 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tonki 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
		Umbret 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) **Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30%	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	**Bajlando 500 SC**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	

roślin z pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 30% porażonej powierzchni liścia podflagowego.		**Comet 200 EC**	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Exactris IP	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	
		Tartaros 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.

		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	**Allegro 250 SC**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Empartis IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Emponor IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Exactris IP	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		

		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Lotus Top 140 EC	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14-21	42	
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Prokarb 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Trovoris IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
SEPTORIOZA PLEW PSZENICY (*Phaeosphaeria nodorum*)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		

		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

PSZENICA (*Mycosphaerella graminicola*)	na sole zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	**Azaka 250 IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Empartis IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Emponor IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Glora 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Lotus Top 140 EC	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14-21	42	
		Mirror 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		

		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,65 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Trovoris IP	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,65 l/ha**	2/14		
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
FAZA BBCH 51–59 (FAZA KŁOSZENIA)									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis) **RDZA BRUNATNA PSZENICY** (Puccinia recondita f. sp. tritici) **SEPTORIOZY LIŚCI** (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) **Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. **Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. **Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. **Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Amistar 250 SC IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		AsPik 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Clayton Divot 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Clayton Navaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Cortez 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Gigant 275 SC IP	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Juwel TT 483 SE	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Środek można stosować do 31.10.2021 r.
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.

		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prizm 275 SC IP	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Safir 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Sauron 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Secardo XE 125 EC	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Silvestro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Skymaster 280 SC IP	azoksystrobina (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	
		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Soprano 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Thesorus 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) (Pyrenophora tritici-repentis) **Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia;	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Allegro 250 SC	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	

w fazie strzelania w zdźbło 5% liści z pierwszymi objawami		**AsPik 250 EC** IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.

		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Harviga IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Juwel TT 483 SE	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Sauron 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Silvestro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Skymaster 280 SC IP	azoksystrobina (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Soligor 425 EC **IP**	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sparta 250 EW **IP**	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Starami 250 SC **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Starjet 250 SC **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tartaros 300 EC **IP**	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Teodot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Thesorus 460 EC **IP**	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.

		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,5 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Bariba IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Betera 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Blumeris 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

	jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	**Britibi** IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Celsivo 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Cindo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cindo Plus 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clayton Cyflux IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clayton Hybrid IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Clufen 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cyflamid 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Cyflux 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Eizo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Feris 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Glora 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Juan 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
		Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie brunatnaje plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liścici, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Marpica IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie brunatnaje plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liścici, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Prokarb 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

		Proquin 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Prozid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Rodeo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza również występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teodot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tern 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tern Turbo 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tonki 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza również występowanie: brunat nej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Umbret 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		

RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (Puccinia striiformis) **Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości:** w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 30% porażonej powierzchni liścia podflagowego.	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	**Bajlando 500 SC**	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).

		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
RDZA BRUNATNA (Puccinia recondita f. sp. tritici)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	**Allegro 250 SC**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Lotus Top 140 EC	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14-21	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Metkon 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Mezzuri 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Prokarb 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole (G1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tartaros 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Wadera 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		X-Met 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY (Mycosphaerella graminicola)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawce choroby.	**Agria Proquinazid IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Azaka 250 IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		

		Basior 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fossa 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Glora 633 EC IP	prochloraz (333 g/l), fenpropidyna (300 g/l)	imidazole (G1), morfoliny (G2)	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	45	
		Judym 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Kanonik 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Lotus Top 140 EC	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0–2,5 l/ha**	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole (G1), ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14-21	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Metkon 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Mezzuri 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Mirror 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Prokonazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Podstawa 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Procer 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Promino 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).

		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Protendo 300 EC **IP**	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Protenol **IP**	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Proquin 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Proguin-I 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Prozid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Starjet 250 SC **IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW **IP**	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Talius 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Talian 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tarot Pro 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tartaros 300 EC **IP**	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Teodot 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teogenes 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Teonas 200 EC **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Vima-Proquinazid **IP**	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC **IP**	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		X-Met 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.

		Zefir 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
SEPTORIOZA PLEW PSZENICY (Phaeosphaeria nodorum)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.	**Allegro 250 SC**	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		AsPik 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Ascra Xpro 260 EC IP	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8–1,0 l/ha**	2/14		Środek ogranicza występowanie tej choroby.
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Bastion 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Blizzard Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Clayton Divot 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Clayton Navaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Cortez 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	
		District 450 EC IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l), fenpropidyna (750 g/l)	imidazole (G1), triazole (G1), morfoliny (G2)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	

		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Echilon Super IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Era IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Plus IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Eldorado IP	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Gigant 275 SC IP	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Juwel TT 483 SE	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), morfoliny (G2)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2–1,5 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Kroton IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ksykon 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	28	Środek można stosować do 31.10.2021 r.
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Metkon 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Mezzuri 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.

		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Ogam	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Prizm 275 SC IP	izopirazam (125 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Proline Max 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Protenol IP	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Safir 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Sauron 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Skymaster 280 SC IP	azoksystrobina (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Silvestro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Soprano 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75). Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Thesorus 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		X-Met 100 SL IP	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/21	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zakeo 250 SCIP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ (*Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella* sp., *Monographella nivalis*)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią,	**Amistar 250 SC IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	

	właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**AsPik 250 EC** IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Bajlando 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Clayton Divot 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Clayton Navaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Duett Star 334 SE	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek można stosować do 30.10.2021 r.
		Exactris IP	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek można stosować do 01.09.2021 r.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Fieldsar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Horea Plus IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		MetcoGuard	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Metkon	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Moderator 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Pabi 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pecari 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Polygreen Fungicide WP IP	oospory Pythium oligandrum	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	**0,1 kg/ha**			Środek stosować w następujących terminach: - pierwszy zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25–37), - drugi zabieg wykonać od fazy kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55–65).
		Profuso IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	

		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Poleposition 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,65 l/ha**	1	35	Środek zastosować zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
		Protendo 300 EC IP	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek zastosować zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
		Protendo Extra IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Sauron 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Sendo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Silvestro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Sintop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Sokół Max IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,7–1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Spartakus	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Tiptop 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.

		Tiofan 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Tiofanat Metylowy 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsano 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole (B1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,4 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2–1,5 l/ha**	2/21	35	
		Ultralegend 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole (B1), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5-1,75 l/ha**	1	42	Środek można stosować do 19.10.2021 r.
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zakeo 250 SCIP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
CZERŃ ZBÓŻ (*Alternaria* spp., *Cladosporium* spp.)	Zapobieganie rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).	**Amistar 250 SC IP**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azarius-Pro 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Azoksar 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Baltazar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8–1,0 l/ha**	1	35	
		Conclude AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Djembe 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek można stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	

		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Fungistar IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Globaztar AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Ortofin IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Promesa IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Sakura 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,2 l/ha**	1	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do 30.06.2021 r.
		Starjet 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Starjet 250 SC + Tarcza Łan Extra EW IP	azoksystrobina (250 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	strobiluryny (C3) + triazole (G1)	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha + 0,8 l/ha**	1		
		Zaftra AZT 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Zakeo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	

SZKODNIKI									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość**	**Grupa chemiczna (IRAC)**	**Działanie**	**Dawka [kg (l)/ha]**	**Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 49–69 (Początek kłoszenia – koniec kwitnienia)									
Skrzypionka zbożowa (*Oulema melanopa* L.) Skrzypionka błękitek (*Oulema cyanella* Voet.)	**Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, prawidłowy płodozmian, wysiew odmian, które wcześniej się kłoszą i dojrzewają, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie.**	Afi Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cimex Forte 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cimex Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65).Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cypermoc	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cythrin 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Insektus 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Insektus Duo 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sorcerer 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Super Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Superkill 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Superkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39–65). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65).Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

FAZA ROZWOJOWA BBCH 50–75 (Początek kłoszenia – dojrzałość mleczna)									
Mszyce (Aphididae)	**Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, późny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N).**	Afi Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Aphox 500 WG	pirymikarb - 500 g/kg (50%)	karbaminiany (1A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / W roślinie działa systemicznie	0,25 kg/ha	1	35	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających dla dawki powyżej 0,42 kg/ha nie stosować na rośliny w czasie kwitnienia, kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Cimex Forte 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cimex Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cypermoc	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Cythrin 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Globe	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	35	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Insektus 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Insektus Duo 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancje z grupy pyretroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kidrate	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	35	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pirigold 500 WG	pirymikarb - 500 g/kg (50%)	karbaminiany (1A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / W roślinie działa systemicznie	0,25 kg/ha	1	35	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających dla dawki powyżej 0,42 kg/ha nie stosować na rośliny w czasie kwitnienia, kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Pirimor 500 WG	pirymikarb - 500 g/kg (50%)	karbaminiany (1A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / W roślinie działa systemicznie	0,25 kg/ha	1	35	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających dla dawki powyżej 0,42 kg/ha nie stosować na rośliny w czasie kwitnienia, kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek. Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
		Sorcerer 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sparrow	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37 –75). Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sparviero	lambda-cychalotryna –100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37 –75). Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Super Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Superkill 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Superkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenie występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.