INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

PROGRAM OCHRONY JĘCZMIENIA OZIMEGO

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności”

Poznań 2025

Program opracowany pod redakcją:
prof. dr hab. Marka Korbasa

Autorzy:
Chwasty - dr hab. Roman Kierzek, mgr Krystyna Miklaszewska,
Choroby - prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz, dr inż. Jakub Danielewicz
Szkodniki - prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr inż. Przemysław Strażyński, dr inż. Monika Jaskulska

FAZY ROZWOJOWE

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony)



Program integrowanej ochrony jęczmienia ozimego przed chwastami, patogenami i szkodnikami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w kwietniu 2025 roku.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej ochronie roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

CHWASTY									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna**	**Mechanizm działania substancji**	**Działanie**	**Dawka kg(l). (stężenie %)**	**Maksymalna liczba zabiegów /**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
FAZA ROZWOJOWA									
Przed siewem, po wschodach chwastów									
Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Candela Energy	glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego, w formie soli izopropyloaminowej) – 540 g/l (43,64 %)	G	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00-09 (po siewie przed wschodami)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Arnold	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,20%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%)	F1, K3	Doglebowe	0,6 l.	1	ND	
		Cetnik 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) –- 500 g/l (42,3 %)	K3	Doglebowo	0,3 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cetnik 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Cevino 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) –- 500 g/l (42,3 %)	K3	Doglebowo	0,3 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cevino 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Glosset ACE	aklonifen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 540 g/l (43,97%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 60 g/l (4,89%)	F3, K3	Doglebowe / Nalistne	1,5-2,0 l.	1	ND	
		Glosset SC	flufenacet(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 600 g/l (48,78 %)	K3	Doglebowe	0,2 – 0,4 l.	1	ND	
		Ikar	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,20%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%)	F1, K3	Doglebowe	0,6 l.	1	ND	
		Inker 500 SC	acet (z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42	K3	Doglebowe	0,24-0,3 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Łucznik	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,20%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%)	F1, K3	Doglebowe	0,6 l.	1	ND	
		Merkur 433 SC	diflufenikan - 20 g/l (1,76 %)(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów); flufenacet - 80 g/l (7,03 %)(związek z grupy oksyacetamidów); pendimetalina - 333 g/l (29,26 %)(związek z grupy dinitroanilin)	K3, F1, K1	Doglebowe / Nalistne	2,25 3,0 l.	1	ND	
		Naceto SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,26%), flufenacet (z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,52%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,3 - 0,6 l	1	ND	
		Pencot 330 EC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)	K1	Doglebowe	3,0-5,0 l.	1	ND	
		Penfox 330 EC	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)	K1	Doglebowe	3,0-5,0 l.	1	ND	
		Penpol 400 SC	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (38,04%)	K1	Doglebowe	2,5-4,1 l.	1	ND	
		Sharpen 330 EC	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)	K1	Doglebowe	3,0-5,0 l.	1	ND	
		Sharpen 400 SC	pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (38,04%)	K1	Doglebowe	2,5-4,1 l.	1	ND	
		Sirionova	flufenacet(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,11 %)	K3	Doglebowe	0,48 l.	1	ND	
Chwasty jednoliscienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cadou	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,12%)	K3	Doglebowo	0,24 - 0,48 l.	1	ND	
		Ramtic 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	
		Shelter 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	

		Starfire 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) — 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	
		Sunfire 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) — 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	
		Vulcanus	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 600 g/l (48,78 %)	K3	Doglebowo	0,2 - 0,4 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Brodal 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,05%)	F1	Doglebowe	0,1-0,2 l.	1	ND	
		Carthago SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,26%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,52%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,3 - 0,6 l.	1	ND	
		Jura Max	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,06%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Mertil 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (163%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (33%)	F1, K3	Nalistne	0,6 l.	1	ND	
		Penshui	pendimetalina (substancja z grupy dinitroanilin) - 455g/l (38,87 %)	K1	Doglebowe / Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Reliance 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (163%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (33%)	F1, K3	Nalistne	0,6 l.	1 lub 2/co 15 dni	ND	
		Roxy XL	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 900 g/l (86,75%)	K3	Doglebowe / Nalistne	3,5 l.	1	ND	
		Sirinova	flufenacet (substancja z grupy (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,11 %)	K3	Doglebowe / Nalistne	0,48 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Flash 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,2%)	F1	Nalistne	0,28 l.	1	ND	
		Pico	pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 750 g/l (75 %)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,067 - 0,133 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-13 (bezpośrednio po siewie do fazy trzech liści)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Amstaf 800 EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Baset 800 EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Boxer 800 EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Fantasia 800 SC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Krum 800 EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Lees 800 SC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Mahak 800 EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Piroseo	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Tiara 800 EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%)	N	Doglebowe / Nalistne	3,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-21 (bezpośrednio po siewie do początku fazy krzewienia zbóż)									

Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Elipris	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów)180 g/ L (15,26 %), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) 240 g/ L(20,34 %), halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) 11,7 g/ L (1 %)	F1, K3, O	Doglebowe / Nalistne	0,375 – 0,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-29 (bezpośrednio po siewie do końca fazy krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Hukkata 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,81%)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,2 - 0,375 l.	1	ND	
		Perpet	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 240 g/l (20,98%) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (8,74%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	0,5-1,0 l.	1	ND	
		Pontos	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 240 g/l (20,98%) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (8,74%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	0,5-1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 01-09 (od skiełkowania do momentu poprzedzającego wschody)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Boxer Evo EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%), diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistne	4,0 l.	1	ND	
		Jura EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistne	4,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 01-29 (od skiełkowania do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Delfin 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,375 l.	1	ND	
		Diflotex 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,73%)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,2 - 0,25 l.	1	ND	
		Kinara 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,375 l.	1	ND	
		Liskam 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,73%)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,2 - 0,25 l.	1	ND	
		Sempra 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,375 l.	1	ND	
		Skye	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (41,55%)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,375 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10-13 (jesienią od szpilkowania do fazy trzech liści)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Activus 400 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (36%)	K1	Doglebowe / Nalistne	4,0 l.	1	ND	
		Bacara Trio 516 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)- 233 g/l (19,58%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów)- 200 g/l (16,81%), metrybuzyna (związek z grupy triazynonów)- 83 g/l (6,98%)	F1, F3, C1	Doglebowe / Nalistne	0,45 l.	1	ND	

		Bat 600 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	0,35 l.	1	ND	
		Battle Delta 600 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	0,35 l.	1	ND	
		Boxer Evo EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%), diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistne	4,0 l.	1	ND	
		Carthago SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,26%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,52%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,3 - 0,6 l.	1	ND	
		Cayman Pro 440 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Demeter 440 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	2,5 l.	1	35	
		Expert Met 56 WG	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%)	C1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,35 kg.	1	ND	
		Glosset SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 600 g/l (48,78 %)	K3	Doglebowe	0,2 – 0,4 l.	1	ND	
		Glosset 600 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 600 g/l (48,78%)	K3	Doglebowe	0,4 l.	1	ND	
		Jura EC	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	N, F1	Nalistne	4,0 l.	1	ND	
		Mateno Duo	aklonifen (związek z grupy difenyloeterów) – 500 g/l (40,98%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)– 100 g/l (8,0%)	F3, F1	Doglebowy / Nalistny	0,35 l.	1	ND	
		Merkur 433 SC	diflufenikan - 20 g/l (1,76 %)(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów); flufenacet - 80 g/l (7,03 %)(związek z grupy oksyacetamidów); pendimetalina - 333 g/l (29,26 %)(związek z grupy dinitroanilin)	K3, F1, K1	Doglebowe / Nalistne	2,25 3,0 l.	1	ND	
		Naceto SC	diflufenikan - 200 g/l (16,26%) flufenacet - 400 g/l (32,52%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,3 - 0,6 l.	1	ND	
		Nucleus 600 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,3%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,1%)	K3, F1	Doglebowe / Nalistne	0,35 l.	1	ND	
		Ordago Pro 440 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (35,61%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,56%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Pendigan Strong 400 SC	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) -400 g/l (36,0%)	K1	Doglebowe / Nalistne	4,0 l.	1	ND	
		Penshui	pendimetalina (substancja z grupy dinitroanilin) - 455g/l (38,87 %)	K1	Doglebowe / Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Picus	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) -400 g/l (36,0%)	K1	Doglebowe / Nalistne	4,0 l.	1	ND	

		Vulcanus	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 600 g/l (48,78 %)	K3	Doglebowo	0,2 - 0,4 l.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cadou	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,12%)	K3	Doglebowo	0,24 - 0,48 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10-14 (jesienią od fazy pierwszego liścia do fazy czterech liści)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Arnold	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,20%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%)	F1, K3	Doglebowe	0,6 l.	1	ND	
		Ikar	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,20%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%)	F1, K3	Doglebowe	0,6 l.	1	ND	
		Łucznik	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 200 g/l (16,20%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 400 g/l (32,41%)	F1, K3	Doglebowe	0,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10 - 21 (od szpilkowania do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Herold 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,25-0,35 l.	1	ND	
		Jura Max	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,06%) diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)	K3, F1	Nalistne	3,2 l.	1	ND	
		Mertil 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,5 %) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (33 %)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,6 l.	1 lub 2/co 15 dni	ND	W dawkach dzielonych środek stosować jesienią lub wiosną po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy widocznych czterech rozkrzewień (BBCH 10-24).
		Reksio 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,25-0,35 l.	1	ND	
		Reliance 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,5 %) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (33 %)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,6 l.	1 lub 2/co 15 dni	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	GF-2573	haluksyfen metylu (związki arylopikolinowe)– Arylex™ - 7,5 g/l (7,81 %)	O		0,6-1,0 l.	2/90	ND	W sezonie wegetacyjnym łączna dawka środka nie może przekroczyć 1,8 l.. Środek może być stosowany dwa razy w sezonie wegetacyjnym zbóż ozimych pod warunkiem co najmniej 3 miesięcznego odstępu między zabiegami
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10 - 23 (od szpilkowania do początku rozkrzewiania)									
Chwasty jednoliscienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Ramtic 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) — 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	
		Shelter 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	
		Starfire 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) — 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	
		Sunfire 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) — 500 g/l (42,05 %)	K3	Doglebowo	0,36 - 0,48 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Sirionova	flufenacet(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,11 %)	K3	Doglebowe	0,48 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10 - 25 (od szpilkowania do pełni krzewienia)									

Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	BeFlex 500 SC	beflubutamid (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,46 %)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,25 - 0,5 l.	1	ND	
		Komandos 560 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,4-0,5 l.	1	ND	
		Kompleks 560 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,4-0,5 l.	1	ND	
		Komplet 560 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,4-0,5 l.	1	ND	
		MeriFlex 500 SC	beflubutamid (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,46 %)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,25 - 0,5 l.	1	ND	
		Picona	pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 320 g/l (28,83%) pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 16 g/l (1,44%)	K1, F1	Doglebowe / Nalistne	2,0-3,0 l.	1	ND	
		Premium 560 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,4-0,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10 - 29 (od szpilkowania do końca fazy krzewienia i wystąpienia pierwszych mrozów)									
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bruster 400 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 280 g/l (24,73%), diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 40 g/l (3,53%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 80 g/l (7,07%)	C2, F1, K3	Doglebowe / Nalistne	1,2-1,8 l.	1	ND	
		Chrome 400 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 280 g/l (24,73%), diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 40 g/l (3,53%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 80 g/l (7,07%)	C2, F1, K3	Doglebowe / Nalistne	1,2-1,8 l.	1	ND	
		Trinity Pro 400 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 280 g/l (24,73%), diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 40 g/l (3,53%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 80 g/l (7,07%)	C2, F1, K3	Doglebowe / Nalistne	1,2-1,8 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Falcetto Turbo	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,3 l.	1	ND	
		Reksio Turbo	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,3 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Brodal 500 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,05%)	F1	Doglebowe	0,1-0,2 l.	1	ND	
		Roxy XL	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 900 g/l (86,75%)	K3	Doglebowe / Nalistne	3,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10-Kw (od szpilkowania do końca wegetacji jesiennej)									

Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Expert 600 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%)	F1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,25-0,35 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-13 (jesienią od fazy pierwszego do trzeciego liścia)									
Chwasty dwuliścienne i miota zbozowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Coliseum	flufenacet (z grupy oksyacetamidów) – 420 g/l (42%) metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%)	K3,C1	Doglebowe / Nalistne	0,35 kg.	1	ND	
		Expose 56 WG	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%)	C1, K3	Nalistne	0,35 kg.	1	ND	
		Film	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%)	C1, K3	Nalistne	0,35 kg.	1	ND	
		Flumet 56 WG	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%)	C1, K3	Nalistne	0,35 kg.	1	ND	
		Twin-Go	metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 140 g/kg (14%) flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 420 g/kg (42%	C1, K3	Doglebowe / Nalistne	0,35 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-23 (jesienią od pierwszego liścia do trzech rozkrzewień)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bizon	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Legion	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Viper	diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l (9,48%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%), penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%)	F1, B, B	Doglebowe / Nalistne	1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-25 (jesienią od pierwszego liścia do fazy widocznego piątego rozkrzewienia)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Proof	prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (77,85%)	N	Doglebowe / Nalistne	5,0 l.	1	ND	
		Cezaro 574 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.83%) diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.7%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 12 g/l (0.99%)	K3, F1, B	Doglebowe / Nalistne	0,4 l.	1	ND	
		Huron 574 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.83%) diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.7%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 12 g/l (0.99%)	K3, F1, B	Doglebowe / Nalistne	0,4 l.	1	ND	
		Konark	flufenacet (substancja z grupy oksyacetamidów) – 60 g/l (6,06%) pendimetalina (substancja z grupy dinitroanilin) - 300 g/l (30,29 %)	K3, K1	Doglebowe / Nalistne	4,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11-27 (jesienią od fazy 1 liścia do fazy 7 rozkrzewień)									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Matrican 100 SC	florasulam(związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)	B	Nalistne	50 ml.	1	ND	
		Plonarius 100 SC	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)	B	Nalistne	50 ml.	1	ND	
		Rassel 100 SC	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 100 g/l (9,26%)	B	Nalistne	50 ml.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-29 (jesienią od pierwszego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Quelex	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 104,2 g/kg (10,4%)	B, O	Nalistne	37,5 g.	1	ND	Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-Kw (od fazy pierwszego liścia do końca wegetacji)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Addar 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Axel-R 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Axial 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Fraxial 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Herbena 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,9 – 1,2 l.	1	ND	
		Kaxia 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Munesis	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Paxio 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) - 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	0,6-0,9 l.	1	ND	
		Paxio Duo 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Pino4Herbi 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6–1,2 l	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		UniAX 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-14 (jesienią od fazy drugiego do czwartego liścia)									
Chwasty dwiliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Trinity 590 SC	chlorotoluron - (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l (21,7%) diflufenikan - (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,5%) pendimetalina - (związek z grupy dinitroanilin) - 300 g/l (26,1%)	C2, F1, K1	Nalistne	2,0 – 2,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-Kw (jesienią od fazy drugiego liścia do końca wegetacji - do pierwszych przymrozków)									
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	CTN 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	1,5-2,0 l.	1	ND	
		Tolurex 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	1,5-2,0 l.	1	ND	
		Toluron 700 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) -700 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	1,4 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-22 (jesienią od fazy drugiego liścia do końca fazy widocznego drugiego rozkrzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Saracen Delta 550 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,10%)	F1, B	Nalistne	75 ml.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-25 (jesienią od fazy drugiego liścia do pięciu rozkrzewień)									

Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cetnik 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) — 500 g/l (42,3 %)	K3	Doglebowo	0,35 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cetnik 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Cetnik 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) –- 500 g/l (42,3 %)	K3	Doglebowo	0,35 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cetnik 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC
		Inker 500 SC	flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)	K3	Nalistne	0,35 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności zaleca się stosowanie w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC i środkiem Galmet 20 SG/Primstar 20 SG/Superherb 20 SG
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-23 (jesienią od fazy 3 liści do fazy 3 rozkrzewień)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Haksar +	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 550 g/kg (55 %), tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 15 g/kg (1,5 %)	O, B	Nalistne	1,0 kg.	1	ND	W uprawie zbóż ozimych na glebach zasadowych w aplikacji jesiennej dopuszcza się stosowanie środka raz na trzy lata.
		Haksar Top 565 SG	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 550 g/kg (55 %), tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 15 g/kg (1,5 %)	O, B	Nalistne	1,0 kg.	1	ND	W uprawie zbóż ozimych na glebach zasadowych w aplikacji jesiennej dopuszcza się stosowanie środka raz na trzy lata.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-29 (jesienią od trzeciego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dyplomata 600 SC	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %) diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F1	Nalistne	1,25-1,5 l.	1	ND	
		Snajper 600 SC	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 500g/l (42,71 %), diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %)	C2, F1	Nalistne	1,25-1,5 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Coma Max 20 WG	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		FlorasuGuard	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,075 l.	1	ND	
		Kantor 050 SC	florasulam (związek z grupy sulfonoamidów) - 50 g/l (4,84 %)	B	Nalistne	0,075 l.	1	60	
		Pike Max 20 WG	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Toscana Top 75 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Ultegra 050 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,075 l.	1	ND	
		Upton 050 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,075 l.	1	ND	
		Winnetou Max 20 WG	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13 - Kw (od fazy trzeciego liścia do końca wegetacji jesiennej)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dicurex Flo 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%).	C2	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Lentipur Flo 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Razer	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
Miotła zbożowa i chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Desperado 500 SC	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	2,0 l	1	ND	

FAZA ROZWOJOWA BBCH 14-30 (od fazy czwartego liścia do do końca fazy krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Esteron 600 EC	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 905 g/l	O	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Flurostar Super SE	fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowych) – 100 g/l (9,96%) florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn)– 1 g/l (0,10%)	O, B	Nalistne	1,0 - 1,5 l.	1	ND	Środek stosować jeden raz w sezonie wegetacyjnym wiosną lub jesienią od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 14-29). W celu zwalczania przytulii czepnej w późnych fazach rozwojowych środek można stosować do fazy liścia flagowego zbóż (BBCH do 39).
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-25 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dicurex Flo 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Lentipur Flo 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Razer	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Toluron 700 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 700 g/l (43,98%)	C2	Doglebowe / Nalistne	1,4 - 1,75 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-29 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agritox Turbo 750 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O,O	Nalistne	1,0 - 1,25 l.	1	ND	
		Agroxone Turbo 750 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O,O	Nalistne	1,0 - 1,25 l.	1	ND	
		Chwastox 500 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Darby 600 SL	2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l (50,0%)	O	Nalistne	0,8 - 1,0 l.	1	ND	
		Dicoherb 750 SL	MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Dicoherb Turbo 750 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O,O	Nalistne	1,0 - 1,25 l.	1	ND	
		Dicopur 600 SL	2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l (50,17 %)	O	Nalistne	0,8-1,0 l.	1	ND	
		Emdee	MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Nutox Turbo 750 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,59%)	O,O	Nalistne	1,0 - 1,25 l.	1	ND	
		Pico	pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 750 g/l (75 %)	F1	Doglebowe / Nalistne	0,067 - 0,133 kg.	1	ND	
		Stapler 600 SL	2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g/l (50,0%)	O	Nalistne	0,8 - 1,0 l.	1	ND	
		Toscana 75 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sul fonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	0,2 g.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Desperado 500 SC	chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (35,71%)	C2	Nalistne	3,0 l	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-30 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Platform 61,5 SG	karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin)– 15 g/kg (1,5%) mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g/kg (60%)	E, O	Nalistne	0,6-1,0 kg.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-32 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Axial One 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	1,0-1,3 l.	1	ND	
		Axial Komplett	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 45 g/l (4,55%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,51%)	A, B	Nalistne	1,0-1,3 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	GF-2573	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 7,5 g/l (7,81 %)	O	Nalistne	0,4-0,8 l.	1	ND	Termin stosowania środka: wiosną, po wznowieniu wegetacji, niezależnie od fazy rozwojowej zbóż do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (do BBCH 45). W sezonie wegetacyjnym łączna dawka środka nie może przekroczyć 1,8 l.. Środek może być stosowany dwa razy w sezonie wegetacyjnym zbóż ozimych pod warunkiem co najmniej 3 miesięcznego odstępu między zabiegami.
FAZA ROZWOJOWA BBCH Rw-37 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy początku liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Heptal 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Fluroxane 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Galarane 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Galistop 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Helm Flurox 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Hudson 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Hurler 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Scalar 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	W celu uzyskania szerszego spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, środek Scalar 200 EC można stosować w mieszaninie zbiornikowej z preparatami HELM – Tribi 75 WG lub Chwastox Extra 300 SL.
		Tandus 200 EC	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (20%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Wikary 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l (19,9%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie	Addar 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	0,6–1,2 l	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego

	zabiegów przedsiewnych	Axel-R 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Axial 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	
		Dobalta	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	
		Fraxial 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Herbena 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,9 – 1,2 l.	1	ND	
		Kaxia 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Munesis	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%)	A	Nalistne	0,6-1,2 l.	1	ND	
		Paxio Duo 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6–1,2 l	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		Pino4Herbi 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,6–1,2 l	1	ND	Wyższe dawki stosować do zwalczania wyczyńca polnego
		UniAX 50 EC	pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,17%)	A	Nalistne	0,9 – 1,2 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 10-32 (wiosną od początku fazy rozwoju liścia do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Sunda	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,6 %)	A	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Vega	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,6 %)	A	Nalistne	1,2 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-22 (jesienią od fazy drugiego liścia do końca fazy widocznego drugiego rozkrzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Saracen Delta 550 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,10%)	F1, B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-29 (od fazy drugiego liścia do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Tribe 75 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-32 (wiosną od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aldaro 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,59 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,12 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Black 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) , 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4–0,6 l	1	ND	
		Bombardier 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) , 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4–0,6 l	1	ND	
		Caballo 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,59 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,12 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Camaro 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Combo 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	

		Cheval 306 SE	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	O, B	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)
		Diablo 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Fendra 306 SE	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	O, B	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Mustang 306 SE	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %) 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)	B, O	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Pegas	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%) w formie kwasu, co odpowiada 452 g/l w formie estru 2-etyloheksylowego, florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l (0,59%).	O, B	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-37 (wiosną od fazy 2 liści do początku fazy liścia flagowego zbóż)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Clayton Flurry	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (20%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	
		Decathlon	fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 288 g/l (29.7%)	O	Nalistne	0,6-1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12-39 (wiosna od fazy 2 lisci do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Lumer 50 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 500 g/kg (50%)	B	Nalistne	30 g.	1	ND	
		Trali 27,1 WG	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 105 g/kg (10,5%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 83 g/kg (8,3%) tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 83 g/kg (8,3%)	B, B, B	Nalistne	50 g.	1	ND	Środek może powodować na niektórych odmianach zbóż objawy fitotoksyczności m.in. w postaci przebarwień czy zahamowania wzrostu. Objawy te mają jednak charakter przemijający i nie wpływają na plonowanie.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-29 (wiosną od fazy 3 liści do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aurora 40 WG	karfentrazon etylowy - związek z grupy triazolinin - 40%	E	Nalistne	50 g.	1	ND	W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych chwastów zalecane jest stosowanie środka w mieszaninach z innymi herbicydami. Szczegóły w etykiecie.
		Fox 480 SC	bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l (40,6 %)	E	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-31 (wiosną od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka)									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Glit 450 EC	2,4-D - związek z grupy fenoksykwasów - 360 g/l (33,68%). fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych - 90 g/l (8,42%).	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Gold 450 EC	2,4-D - związek z grupy fenoksykwasów - 360 g/l (33,68%). fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych - 90 g/l (8,42%).	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-32 (wiosną od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Laserto 050 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Linnea	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Saracen 050 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-39 (wiosną od fazy 3 liści do w pełni rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Assynt 500 SG	tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Nalistne	30 g.	1	ND	
		Biathlon 4 D	tritosulfuron - związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika – 71,4% (714 g/kg), florasulam - związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 5,4% (54 g/kg).	B, B	Nalistne	0,04-0,07 kg.	1	ND	W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka poprzez dodatek adiuwanta Dash HC
		Blusky 500 WG	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	16-20 g.	1	ND	
		Bresser 4D	tritosulfuron - związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 71,4% (714 g/kg). florasulam - związek z grupy pochodnych triazolopirymidyn – 5,4% (54 g/kg)	B, B	Nalistne	0,04-0,07 kg.	1	ND	W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka poprzez dodatek adiuwanta Dash HC w dawce 1 l.
		Flame 500 SG	tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50%)	B	Nalistne	30 g.	1	ND	
		FlorasuGuard	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Flyer	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,92%)	B	Nalistne	0,1- 0,15 l.	1	ND	
		Haksar +	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 550 g/kg (55 %), tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 15 g/kg (1,5 %)	O, B	Nalistne	1,0 kg.	1	ND	
		Haksar Top 565 SG	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - 550 g/kg (55 %), tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 15 g/kg (1,5 %)	O, B	Nalistne	1,0 kg.	1	ND	
		Loop	bensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50,0%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/kg (4,0%)	B, B	Nalistne	100 g.	1	ND	

		Mofat 500 WG	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	16-20 g.	1	ND	
		Scriven 050 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Sunlight 50 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Toscana Top 75 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	25 g.	1	ND	
		TrimetGuard	metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%) tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250 g/kg (25%)	B, B	Nalistne	16-20 g.	1	ND	
		Ultegra 050 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Upton 050 SC	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,84%)	B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Xanadu	bensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50,0%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/kg (4,0%)	B, B	Nalistne	100 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 13-45 (wiosną od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Pixxaro	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych - 12 g/l (1,16%), fluroksypyr meptylu (pochodne kwasów pirydynokarboksylowych) - 280 g/l (27,03%)	O,O	Nalistne	0,25 - 0,5 l.	1	50	
		Orpen 102 SE	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,0 g/l (0,2 %), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (9,7 %).	B, O	Nalistne	1,2-1,6 l.	1	ND	
		Starane Forte	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych - 12 g/l (1,16%), fluroksypyr meptylu (pochodne kwasów pirydynokarboksylowych) - 280 g/l (27,03%)	O,O	Nalistne	0,25 - 0,5 l.	1	50	
		Valentia 102 SE	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 2,0 g/l (0,2 %), fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyno karboksylowego) – 100 g/l (9,7 %).	B, O	Nalistne	1,2-1,6 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 14-32 (wiosną od fazy 4 liści do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Aminopielik Standard 600 SL	2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksyoctowy formie soli dimetyloamoninowej ((związek z grupy fenoksykwasów)) - 600 g/l (50%)	O	Nalistne	1,25 l.	1	ND	
		Osnova 600 SL	2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksyoctowy formie soli dimetyloamoninowej ((związek z grupy fenoksykwasów)) - 600 g/l (50%)	O	Nalistne	1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 20-29 (wiosną od początku do końca fazy krzewienia)									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Flurostar Forte	fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowych) – 400 g/l (36,61%)	O	Nalistne	0,5 l.	1	ND	W celu zwalczaniaprzytulii czepnej w późnych fazach rozwojowych środek można stosować do fazy liścia flagowego zbóż (BBCH do 39).
FAZA ROZWOJOWA BBCH 20-31 (wiosną od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenoxinn Max 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,60%)	A	Nalistne	0,7 l.	1	ND	
		Herbos Max 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,60%)	A	Nalistne	0,7 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 20-32 (wiosną od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fragma Delta 550 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,10%)	F1, B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Laserto D 550 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,1%)	F1, B	Nalistne	100 ml.	1	ND	
		Lector Delta 550 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,10%)	F1, B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Saracen Delta 550 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,10%)	F1, B	Nalistne	0,1 l.	1	ND	
		Viking Delta 550 SC	diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (40,98%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,1%)	F1, B	Nalistne	100 ml.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 20-39 (wiosną od początku krzewienia do końca fazy strzelania w źdźbło – faza w pełni rozwiniętego liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bazoka750 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Botrin 750 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Coalicion 750 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Croupier OD	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowego) - 225 g/l (20,56%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 9 g/l (0,82 %)	O, B	Nalistne	0,67 l.	1	ND	
		Exanimo 750 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
		Omnera LQM	fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 135 g/l(13,65%), tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 30g/l(3,03%), metsulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 5 g/l (0,51%	O, B, B	Nalistne	0,5 - 1,0 l.	1	ND	

		Sentrallas LQM	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 150 g/l (15,20 %); tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 30 g/l (4,04 %)	O, B	Nalistne	0,5 - 1,0 l.	1	ND	
		Trailer 750 WG	tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%	B	Nalistne	20 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 21-29 (wiosną od początku do końca krzewienia)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Alliance 660 WG	diflufenikan - 600 g/kg (60 %),metsulfuron metylowy - 60 g/kg (6 %)	F1, B	Nalistne	100g.	1	ND	W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
		ChwasTech Turbo 340 SL	MCPA (związek z grupy pochodnych kwasu fenoksyoctowego - 300 g/l (25,9 %) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)	O, O	Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Chwastox 750 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Chwastox Turbo 340 SL	MCPA (związek z grupy pochodnych kwasu fenoksyoctowego - 300 g/l (25,9 %) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,4 %)	O, O	Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Chwastox D 179 SL	MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%) dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 17,8 g/l (1,64%)	O, O	Nalistne	5,0 l.	1	ND	
		Chwastox Extra 300 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Chwastox Nowy Trio 390 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 200 g/l (16,7%) mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) - 150 g/l (12,5%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 40 g/l (3,3 %)	O, O, O	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Chwastox Professional 750 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli dimetyloaminowej) - 750 g/l (63,6%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Lider 300 SL	MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,5%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Lider 750 SL	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Lider D750 SL	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
		Micam	MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%) dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 17,8 g/l (1,64%)	O, O	Nalistne	5,0 l.	1	ND	
		Premier 300 SL	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%)	O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Premier 500 SL	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 500 g/l (44,3%)	O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Premier 750 SL	MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	

		Premier D 750 SL	MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%) dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)	O, O	Nalistne	1,0-1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-31 (wiosną od początku krzewienia do pierwszego kolanka)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Fenoxinn 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	0,7 l.	1	ND	W celu rozszerzenia spektrum zwalczania chwastów o chwasty dwuliścienne, środek stosować w mieszaninie z środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
		Herbos 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	0,5-0,7 l.	1	ND	W celu rozszerzenia spektrum zwalczania chwastów o chwasty dwuliścienne, środek stosować w mieszaninie z środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
		Monarchi 110 EC	fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 110 g/l (10,8%)	A	Nalistne	0,7 l.	1	ND	W celu rozszerzenia spektrum zwalczania chwastów o chwasty dwuliścienne, środek stosować w mieszaninie z środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC
FAZA ROZWOJOWA BBCH 21-32 (wiosną od początku krzewienia do drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Battery	MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%) dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 17,8 g/l (1,64%)	O, O	Nalistne	5,0 l.	1	ND	
		Centaur 306 SE	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	O, B	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Konik 306 SE	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	O, B	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Pony 306 SE	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	O, B	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Quelex	florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%) halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 104,2 g/kg (10,4%)	B, O	Nalistne	50 g.	1	ND	Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
		Vitong	2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,12%), florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)– 6,25 g/l (0,59%)	O, B	Nalistne	0,4-0,6 l.	1	ND	
		Sekator Plus	2,4-D 2-EHE (związek z grupy estrów fenoksykwasów) – 433 g/l (39,36%) amidosulfuron w formie soli sodowej (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l (2,41%) jodosulfuron metylo sodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,25 g/l (0,57%)	O, B	Nalistne	0,6 l.	1	ND	
		Starane 333 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych w postaci estru fluroksypyr 1-metyloheptylu) - 333 g/l (31,56%)	O	Nalistne	0,54 l.	1	ND	
		Tomahawk 200 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych w postaci estru fluroksypyr 1-metyloheptylu) - 200 g/l (20.41%)	O	Nalistne	0,9 l.	1	ND	
		Uri	2,4-D w formie soli DMA (związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g/L (49,99 %)	O	Nalistne	1,25 l.	1	ND	

Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Rexade	florasulam - 100 g/kg (10 %) halauksyfen metylu – Arylex™ - 104,23 g/kg (10,42 %) piroksysulam - 240 g/kg (24,0%)	O, B	Nalistne	50 g.	1	ND	Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 21-39 (wiosną , od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Tricera 480 EC	2,4-D 2-EHE w formie estru (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) – 562,5 g/l (51,61%) (co odpowiada 375 g/l 2,4-D w formie kwasu) chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 30 g/l (2,75%) fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydyloksykarboksylowego) – 75 g/l (6,88%)	O, O, O	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 22-45 (wiosną od fazy widocznego drugiego krzewienia do końca fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Clyde FX	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 100 g/l (9,74 %) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 1g/l (0,097 %)	O, B	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 23-33 (wiosną od trzech rozkrzewień do trzeciego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agritox 500 SL	MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%)	O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 23-39 (wiosną od trzech rozkrzewień do fazy widocznego języczka liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Flame Duo 354 SG	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) – 104 g/kg (10,4 %) tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 250 g/kg (25,0 %)	B, B	Nalistne	40-60 g.	1	ND	
		Puro Maxx	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) – 104 g/kg (10,4 %) tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 250 g/kg (25,0 %)	B, B	Nalistne	40-60 g.	1	ND	
		Tercero Duo 354 SG	florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) – 104 g/kg (10,4 %) tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 250 g/kg (25,0 %)	B, B	Nalistne	40-60 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 25 (wiosną w fazie pełni krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	CTN 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	2,0-2,5 l.	1	ND	
		Tolurex 500 SC	chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/1 (43,98%)	C2	Nalistne	2,0-2,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 25-32 (wiosną od pełni krzewienia do końca fazy drugiego kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów	Faraon 75 WG	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20-40 g.	1	ND	

	przedsiewnych	Grodyl 75 WG	amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20-40 g.	1	ND	
		Planet	2,4-D –w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 275 g/l (23,43%) MCPA- w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów)) - 275 g/l (23,43%)	O, O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Tamigan 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)	O	Nalistne	0,6-0,8 l.	1	ND	
		Tomigan Antra 250 EC	fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 250 g/l (24,75%)	O	Nalistne	0,6-0,8 l.	1	ND	
		Tomigan 250 EC	fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego - 250 g/l (24,78%)	O	Nalistne	0,6-0,8 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 30-32 (wiosną od fazy strzelania w źdźbło do fazy 2 kolanka)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Coma Max 20 WG	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	30 g.	1	ND	
		Pike Max 20 WG	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	30 g.	1	ND	
		Winnetou Max 20 WG	metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 200 g/kg (20%)	B	Nalistne	30 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 31-39 (wiosną od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Adentis	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/ka (75%)	B	Nalistne	20-25 g.	1	30	
		Animus	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/ka (75%)	B	Nalistne	20-25 g.	1	30	
		Corida	tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/ka (75%)	B	Nalistne	20-25 g.	1	ND	
		Emcee	MCPA (związek z grupy fenoksykwasow karboksylowych) - 750 g/l (63,8 %)	O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Shlem	tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)	B	Nalistne	20 – 25 g.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 32-37 (wiosną od fazy drugiego kolanka do fazy liścia flagowego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Alladyn 71,4 WG	tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 714 g/kg (71,4%)	B	Nalistne	0,07 kg.	1	ND	W celu podniesienia skuteczności stosować w mieszaninie ze środkiem Starane 250 EC i adiuwantem Dash HC
FAZA ROZWOJOWA BBCH 85-87 (dojrzałość woskowa miękka do twardej)									
Desykacja i równoczesne nieselektywne niszczenie chwastów	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agenor 450 SL	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Boom Efekt 360 SL	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Cordian 450 SL	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	3,2-4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

		Glyphomax Clean 360 SL	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego
		Helosate Plus 450 SL	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (37,5%)	G	Nalistne	3,2-4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt
		Hopper Clean 360 SL	glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego
		Roundup Ultra 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,87%)	G	Nalistne	4,0 l.	1	ND	Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt

CHOROBY

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Zaprawy	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
PRZED SIEWEM							
ZGORZEL SIEWEK (kompleks patogenów)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Bariton Super 97,5 FS**	protiokonazol (50 g/l), fludioksonil (37,5 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 400–800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia; zarejestrowany do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.
		Beret Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Bejca 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml/100kg + 500 ml wody**	
		Celest 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-800 ml wody**	
		Celest Extra 050 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1200 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Difend Extra FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 200 ml wody**	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0–1200 ml wody**	
		Diflud 050 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 800 ml wody**	
		Flutik 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Flutrix 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Fludio Żel 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–800 ml wody**	
		Funaben Plus 02 WS	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Gizmo 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	

		Goliat Star	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1200 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Grangello 025 FS	fludioksonil (25g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/ 100 kg + 0-800 ml wody**	
		Grano	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 800 ml wody**	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia od początku fazy strzelania w źdźbło.
		Lamardor Pro	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Latifam	siltiofam (125 g/l)	sililoamidy (C7)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–200 ml wody**	
		Latifam Extra	siltiofam (125 g/l), fludioksonil (25 g/l)	sililoamidy (C7), fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 200 ml wody**	
		Laurel	fludioksonil (25g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/ 100 kg + 0-800 ml wody**	
		Maxim 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-800 ml wody**	
		Omnix 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Premis 025 FS	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	Ogranicza występowanie pleśni śniegowej, plamistości siatkowej i rynchosporiozy zbóż do początku fazy strzelania w źdźbło.
		Proseed 050 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 800 ml wody**	
		Prepper	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/100kg + 200-800 ml wody**	Wykazuje średni poziom zwalczania
		Real 025 FS	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw, plamistość siatkową jęczmienia oraz rynchosporiozę zbóż.

		Redigo Pro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Retro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Seedron 60 FS	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia od początku fazy strzelania w źdźbło.
		Sedextra 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/100kg + 0–800 ml wody**	
		Sedevax 60 FS	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Sistemio	difekonazol (30g)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**187,5 ml/ 100 kg + 0 – 1200 ml wody**	
		Syrius 02 WS	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Tridox 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Zaprawa nasienna 050 FS	difenokonazol (25g/l) fludioksonil (25/g/l	triazole (G1), fenylopirole (E2),	układowe i powierzchniowe, przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego	**200 ml + 800 ml wody**	
		Zaprawa Nasienna D	difekonazol (30g)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**150 ml/ 100 kg + 0 – 1200 ml wody**	
		Zaprawa zbożowa Orius 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	Środek ogranicza występowanie choroby.
GŁOWNIA PYLĄCA JĘCZMIENIA (*Ustilago nuda*)	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek. Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego,	**Bariton Super 97,5 FS**	protiokonazol (50 g/l), fludioksonil (37,5 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 400–800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia; zarejestrowany do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.
		Bejca 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml/100kg + 500 ml wody**	

	zdrowego materiału siewnego. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju roślin.	**Beret Opti**	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Beret Star	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Beret Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Careo Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml /100klg+ 0-1050 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Funaben Plus 02 WS	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
		Flutik 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Flutrix 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Gizmo 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Goliat Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/100kg + 0–1500 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Konazol Trio	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml/100kg + 0-1050 ml wody**	
		Konazol Tres	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml/100kg + 0-1050 ml wody**	
		Kinto Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	

		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia od początku fazy strzelania w źdźbło.
		Lamardor Pro	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Premis 025 FS	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	Ogranicza występowanie pleśni śniegowej, plamistości siatkowej i rynchosporiozy zbóż do początku fazy strzelania w źdźbło.
		Premis Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Real 025 FS	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw, plamistość siatkową jęczmienia oraz rynchosporiozę zbóż.
		Real Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Redigo Pro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Retro Duo	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	
		Retro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Rubin Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Sedevax 60 FS	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Seedron 60 FS	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia od początku fazy strzelania w źdźbło.
		Sigona Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Syrius 02 WS	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	

		Tridox 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia
		Vibrance Duo	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Duo 050 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Opti	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Pro	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star 070 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Trio 060 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Zaprawa zbożowa Orius 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	
		Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS	tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 g + 900 ml wody**	
GŁOWNIA ZWARTA (*Ustilago hordein*)		**Beret Opti**	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Beret Star	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Celest Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Flutik 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.

		Flutrix 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Goliat Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/100kg + 0–1500 ml wody**	
		Omnix Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Sedextra Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Tridox 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia
		Vibrance Duo	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Duo 050 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Gold 100 FS	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vibrance Opti	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Pro	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star 070 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Trio 060 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
PLEŚŃ ŚNIEGOWA ZBÓŻ I TRAW (Monographella	Prawidłowy płodozmian. Dokładne przyoranie resztek.	**Bariton Super 97,5 FS**	protiokonazol (50 g/l), fludioksonil (37,5 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 400–800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia; zarejestrowany do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.

nivalis, anamorfa: Microdochium nivale)	Niszczenie samosiewów zbóż. Wybór mniej podatnych odmian. Używanie kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego.	**Beret Opti**	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Beret Star	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Beret Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Celest Extra 050 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1200 ml wody**	
		Celest Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Fludio Żel 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–800 ml wody**	
		Goliat Star	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1200 ml wody**	
		Goliat Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/100kg + 0–1500 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Grangello 025 FS	fludioksonil (25g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/ 100 kg + 0-800 ml wody**	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia od początku fazy strzelania w źdźbło.
		Lamardor Pro	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Maxim Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Omnix Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Redigo Pro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Retro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Savea 333 FS	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia i mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Do zwalczania tych chorób można stosować Savea 333 FS w mieszaninie z Kinto Duo 080 FS (250 ml).

		Sedevax 60 FS	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Sedextra Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Seedron 60 FS	fludioksonil (50 g/l), tebukonazol (10 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 0-1500 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia od początku fazy strzelania w źdźbło.
		Systiva 333 FS	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia i mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Vibrance Duo	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Duo 050 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Opti	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Pro	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star 070 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Trio 060 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Zaprawa nasienna 050 FS	difenokonazol (25g/l) fludioksonil (25/g/l	triazole (G1), fenylopirole (E2),	układowe i powierzchniowe, przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego	**200 ml + 800 ml wody**	
		Zn Premium 333 FS	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml**	Zapobiega występowaniu mączniaka prawdziwego zbóż I traw oraz plamistości siatkowej jęczmienia.
PASIASTOŚĆ LIŚCI JĘCZMIENIA (*Pyrenophora graminea, anamorfa: Drechslera graminea*)		**Bariton Super 97,5 FS**	protiokonazol (50 g/l), fludioksonil (37,5 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**100 ml + 400–800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści do końca fazy krzewienia; zarejestrowany do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.
		Bejca 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml/100kg + 500 ml wody**	Wykazuje średni poziom zwalczania
		Beret Opti	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.

		Beret Star	sedaksan (25 g/), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Beret Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Careo Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml /100klg+ 0-1050 ml wody**	
		Celest 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-800 ml wody**	
		Celest Extra 050 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1200 ml wody**	
		Celest Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Celest Trio 060 FS	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400–800 ml wody**	
		Dividend Xtra 030 FS	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1200 ml wody**	
		Fludio Żel 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–800 ml wody**	
		Flutik 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Flutrix 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Gizmo 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	Środek wykazuje średni poziom zwalczania.
		Goliat Star	difenokonazol (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1200 ml wody**	
		Goliat Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/100kg + 0–1500 ml wody**	
		Goliat Trio 060 FS	difekonazol (25g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol 10g/l)	triazole (G1), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 400-800 ml wody**	
		Grangello 025 FS	fludioksonil (25g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/ 100 kg + 0-800 ml wody**	
		Interest	difenokonazol (30 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 50-150 ml wody**	
		Kinto Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Konazol Trio	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml/100kg + 0-1050 ml wody**	

		Konazol Tres	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml/100kg + 0-1050 ml wody**	
		Lamardor 400 FS	protiokonazol (250 g/l), tebukonazol (150 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**20 ml + 300 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Lamardor Pro	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Laurel	fludioksonil (25g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/ 100 kg + 0-800 ml wody**	
		Maxim 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-800 ml wody**	
		Maxim Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Omnix 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Omnix Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Premis 025 FS	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	Ogranicza występowanie pleśni śniegowej, plamistości siatkowej i rynchosporiozy zbóż do początku fazy strzelania w źdźbło.
		Premis Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Real 025 FS	tritikonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150–200 ml + 400 ml wody**	Środek ogranicza występowanie pleśni śniegowej zbóż i traw, plamistość siatkową jęczmienia oraz rynchosporiozę zbóż.
		Real Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Redigo Pro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**66,7 ml + 400-800 ml wody**	Zapobiega występowaniu chorób liści, w tym plamistości siatkowej jęczmienia do końca fazy krzewienia.
		Retro 170 FS	protiokonazol (150 g/l), tebukonazol (20 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 400-800 ml wody**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia.
		Rubin Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Savea 333 FS	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml**	Środek zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia i mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Do zwalczania tych chorób można stosować Savea 333 FS w mieszaninie z Kinto Duo 080 FS (250 ml).
		Sedextra 025 FS	fludioksonil (25 g/l)	fenylopirole (E2)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml/100kg + 0–800 ml wody**	
		Sedextra Power	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	
		Sigona Plus	fludioksonil (33,3 g/l), fluksapyroksad (33,3 g/l), tritikonazol (33,3 g/l)	fenylopirole (E2), karboksyamidy (C2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml + 0-1050 ml wody**	
		Systiva 333 FS	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia i mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

		Tebseme	tebukonazol (25 g/l)	triazole (G1)	układowe, przeznaczony do ochrony ziarna	**120 g/100kg**	
		Tridox 50 FS	fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (25 g/l)	fenylopirole (E2), triazole (G1)	powierzchniowy i układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 700 ml wody**	Zapobiega występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia
		Vibrance Duo	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Duo 050 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0-1500 ml wody**	
		Vibrance Gold 100 FS	sedaksan (50 g/l), fludioksonil (25 g/l), difenokonazol (25 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1000 ml wody**	
		Vibrance Opti	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Pro	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Star 070 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tritikonazol (20 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Vibrance Trio 060 FS	sedaksan (25 g/l), fludioksonil (25 g/l), tebukonazol (10 g/l)	karboksyamidy (C2), fenylopirole (E2), triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**200 ml + 0–1500 ml wody**	Środek zarejestrowany do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.
		Zaprawa nasienna 050 FS	difenokonazol (25g/l) fludioksonil (25/g/l	triazole (G1), fenylopirole (E2),	układowe i powierzchniowe, przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego	**200 ml + 800 ml wody**	
		Zn Premium 333 FS	fluksapyroksad (333 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**150 ml**	Zapobiega występowaniu mączniaka prawdziwego zbóż I traw oraz plamistości siatkowej jęczmienia.
		Zaprawa zbożowa Orius 060 FS	tebukonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, przeznaczony do ochrony ziarna	**50 ml + 500 ml wody**	

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)									
Łamliwość źdźbła zbóż i traw (Oculimacula acuformis, Oculimacula yallundae) **orientacyjny prógszkodliwości:** 20–30% źdźbeł z objawami porażenia	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Ascra Xpro 260 EC**	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2 l/ha**	1		
		Acrisio Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Ogranicza występowanie choroby
		Atrium-X	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), pirydynyloetylobenzamidy triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,2 l/ha**	2/14		
		Attenzo Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6–0,8 l/ha**	2/14		Środek ogranicza występowanie łamliwości źdźbła zbóż i traw.
		Cayunis	biksafen (75 g/l), spiroksamina (150 g/l), trifloksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Biromil 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	
		Delaro Forte	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l) spiroksamina (107 g/g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3) ketoaminy	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Hint	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Input 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Input Triple	proquinazid (40 g/l), protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,25 l/ha**	1	35	
		Inovis Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	Ogranicza występowanie choroby
		Kayak Era	cyprodynil (225 g/l) protiokonazol (75 g/l)	anilinopirymidyny (D1) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**2,0 l/ha**	1		
		Kayak Next	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Kroton	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Padelli	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Protio-Spirox-Life	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spirotech	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Thesorus 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Unix 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	
		Vangard 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŹDŹBŁA I KORZENI (Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp.)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Aviator Xpro 225 EC**	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6–0,8 l/ha**	2/14		Środek ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i zbóż.
		Hint	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Input 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Kroton	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Protio-Spirox-Life	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Spirotech	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Thesorus 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*) **PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA** (*Pyrenophora Teres*) **RDZA JĘCZMIENIA** (*Puccinia hordei*) **RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ** (*Rynchosporium secalis)* **Mączniak prawdziwy zbóż i traw** – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 25–35% roślin z pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło – 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. **Plamistość siatkowa jęczmienia** – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w źdźbło 15–20% liści z objawami	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Agristar 250 SC**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Amistar Max	azoksystrobina (93,5 g/l) folpet (500 g/l)	strobiluryny (C3) ftalamidy	wgłębne i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1		Termin zużycia: 31.12.2025
		Amplitude	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia.
		Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Apron-X 190 EC	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,25 l/ha**	2/14	35	Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz plamistości siatkowej jęczmienia stosować w dawce 1,25 l/ha.
		Ascra Xpro 260 EC	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2 l/ha**	1		
		AsPik 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Atrium-X	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), pirydynyloetylobenzamidy triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,2 l/ha**	2/14		
		Attenzo Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Avastel	fluksapyroksad (75g/l) protiokonazol (150g/l)	karboksyamidy (C2) triazole (G1)	do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego	**1,0-1,25 l/ha**	1		
		Aviator Xpro 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6–0,8 l/ha**	2/14	35	

choroby. **Rdza jęczmienia** – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% powierzchni liści z pierwszymi objawami porażenia. **Rynchosporioza zbóż** – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w źdźbło 15–20% powierzchni liści z objawami choroby.		**Azaka 250**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	
		Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoxymoc	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoscan 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Basior Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		Biromil 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; ogranicza występowanie plamistości liści.
		Cayunis	biksafen (75 g/l), spiroksamina (150 g/l), trifloksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Broteas 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Capetus Extra 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Clayton Divot 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Clayton Navaro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Dakar 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Delaro Forte	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l) spiroksamina (107 g/g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3) ketoaminy	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Sokół Forte	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Delaro 325 SC	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Duo Legend 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Divality	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż; środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Dyllis	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	

		Elatus Era	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elatus Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Eldorado	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Flexity	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Finoro	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Wykazuje średni poziom skuteczności w zwalczaniu mączniaka prawdziwego
		Forapro 425 EC	fenpropidyna (250 g/l) protiokonazol (175 g/l)	morfoliny (G2) triazole (G1)	układowe do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Stosować od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)
		Erazer	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Harviga	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	
		Harvinta Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Hint	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Honsiu 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Ogranicza występowanie następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
		Hutton	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6-0,8 l/ha**	1	35	Środek dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 0,8 l/ha oraz dla rynchosporiozy zbóż i plamistości siatkowej jęczmienia stosować w dawce 0,6 l/ha. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Imbrex XE	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Input 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Input Triple	proquinazid (40 g/l), protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,25 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Innox	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65) Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		LS Prothio-Tebuc	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Midgard 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6-0,8 l/ha**	1-2/14		Wykazuje średni poziom skuteczności zwalczania mączniaka; stosować do fazy początkukwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61
		Jade	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Kanonik Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	
		Kayak Era	cyprodynil (225 g/l) protiokonazol (75 g/l)	anilinopirymidyny (D1) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**2,0 l/ha**	1		
		Kayak Next	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Komilfo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Korazzo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Kroton	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Ksystro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Lenvyor	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia; stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Librax	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia; stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Maganic	protiokonazol (175 g/l) difenokonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 – 1,0 l/ha**	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		Maxentis	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Maxtima	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia, wykazuje średni poziom zwalczania plamistiości siatkowej oraz rynchosporiozy zbóż
		Midgard 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Miralon	azoksystrobina (75g) fluksapyroksad (50g)	strobiluryny (C3) karboksyamidy (C2)	układowe i translaminarne, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		Moc-Legenda 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Pioli	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Movegra	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Myresa Pro	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż; nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Osiris Revy	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Orius 200 EW	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
		Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Patronius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż.; stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Padelli	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Priaxor	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Procer Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Profuso	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promino Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Pro-Protio Plus	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protefin	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protenol	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

		Prosaro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo Extra	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Regalon	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Pro-Yoyo	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
		Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Protiocare	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protio-Spirox-Life	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Protio-Tebu-Life	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Revyflex plus	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l) metrafenon (100 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2), pochodne ketonu difenylowego)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	56	
		Shield 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6- l/ha**	1-2/14		
		Sheriff 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6- l/ha**	1-2/14		
		Silvestro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Sinbad	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Sinstar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Soligor 425 EC	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6–0,8 l/ha**	1	35	
		Soratel	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Nie posiada rejetracji do zwalczania mączniaka prawdziwego Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)..
		Strobin 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Strobin 250-I	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Sting 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)
		Strobin 250-II	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Sulky	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Supremum	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Syrius 200 EW	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

		Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Talius 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Tarot Pro 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tokio 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1-2/14		Wykazuje średni poziom skuteczności zwalczania mącznika prawdziwego
		Soratel	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Nie posiada rejetracji do zwalczania mączniaka prawdziwego Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)..
		Spirotech	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Thesorus 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; ogranicza występowanie plamistości liści (niepatogeniczne czynniki - oparzenia słoneczne).
		Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; tosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Tokama	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Ultralegend 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Uni Ken 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Ogranicza występowanie: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż
		Unicorn	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Nie posiada rejetracji do zwalczania rynchosporiozy; Stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Unix 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Vangard 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Variano Xpro 190 EC	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,25 l/ha**	2/14	35	Środek w zwalczaniu plamistości siatkowej jęczmienia i mączniaka prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 1,25 l/ha.
		Velogy Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego
		Vitissimo	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i transla minarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż; nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Wadera Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Zefir 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	

MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria graminis)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	**Afi-Fen 50 EW**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Acrisio Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Altan 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Bomilo	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Betera 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Blumeris 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Britribi	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Britribi	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Celsivo 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Concorde 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Clayton Cyflux	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Cindo Extra 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Cindo Plus 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Clayton Hybrid	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Clufen 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Conclude SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Cyflamid 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Cyflu4Fungi 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Cyflux 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Diopyr	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/14		
		Eizo 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Feris 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Fenamid 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	
		Globaztar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	

		Halny 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek można stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Inovis Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Juan 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Kendo 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Intervio 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Leander 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Marpica	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Merces 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Ozawa 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	
		Profinity 180 SC	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/14		
		Property 180 SC	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/14		
		Proqu 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek można stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Prondo	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Rodeo 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	
		Tern 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tern Turbo 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tonki 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Umbret 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Procort Duo	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Tizen	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Wirtuoz Pro	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Verben	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	
		Zaftra SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
RDZA JĘCZMIENIA (*Puccinia hordei*)		**Abran 250**	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Aluma X	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	2/14	35	Stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69);

		Agrizole XL	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Bolt 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Corrib 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Conclude SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Daxur	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Euskatel 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)
		Globaztar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Halny 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek można stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Juwel Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Legado	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Panorama	protiokonazol (250 g/l) metkonazol (90 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Proqu 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek można stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Pro-Yoyo	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Revypro	mefentriflukonazol (50 g/l) protiokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,5 l/ha**	**1**	35	
		Skeldon	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14		
		Silvron Xpro	biksafen (100 g/l) fluopyram (100g/l)	karboksamidy (C2) benzamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	1		
		Teko 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Tocata Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/21	35	Stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49)
		Zaftra SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (*Rynchosporium secalis*)		**Aderya**	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Amistar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Alonty	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Astrolab	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	

		Azoguard AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Azoksar Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Azuba	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Wykazuje średni poziom zwalczania
		Azo-Mat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Azoxy-Life	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Azoxone 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Balaya	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Basior 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bolid Plus 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby
		Cactai	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Clayton Augusta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Conclude AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Cortina	protiokonazol (400 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,4-0,5 l/ha**	2/14	35	
		Currando	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Dedal	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Dyllis	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Dobromir 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Felyco	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Fungistar	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Globaztar AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Termin zużycia: 30.06.2024; Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Hill-Star	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Inovor Uno	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	

		Judym 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Kanonik 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Legado	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		LS-Azoxy	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Makler Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Mirador 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Mirror 500 SC	fołpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Mizona	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Ortofin	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Patel 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61)
		Panorama	protiokonazol (250 g/l) metkonazol (90 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Pecari 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Phoenix 500 SC	fołpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Piastun 250 EC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Podstawa 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Poleposition 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Procer 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Promesa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Promino 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Pro-Protio	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
		Protendo 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Revycare	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	

		Revypro	mefentriflukonazol (50 g/l) protiokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,5 l/ha**	**1**	35	
		Revysky	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Selytor	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Subigon	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		ERA	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Procort Duo	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy l układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Tartaros	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Telescope	difenokonazol (100 g/l) metkonazol (54 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/21	42	
		Tizen	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy l układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Wirtuoz Pro	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy l układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Verben	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	
		Verydor	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Vorona 500 SC	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Proviso 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Zaftra AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Zakeo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Zingaro Extra 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Termin zużycia 31.12.2025
		Zoxis 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA (*Pyrenophora Teres*)		**Aderya**	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Aluma X	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	2/14	35	Stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69);
		Agrizole XL	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Abran 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)

		Acrisio Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Alonty	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Avtar	protiokonazol (250 g/l), difenokonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6-0,7 l/ha**	2/14		
		Balaya	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Basior 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bolt 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Cortina	protiokonazol (400 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,4-0,5 l/ha**	2/14	35	
		Currando	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Dedal	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Corrib 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Cactai	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Chamane 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Daxur	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Empartis	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Emponor	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Entargo	boskalid (500 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7 l/ha**	1	56	
		Euskatel 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)
		Felyco	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Halny 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek można stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
		Inovis Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Inovor Uno	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Juwel Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Judym 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Kanonik 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Legado	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	

		Mizona	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Pabi 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Patel 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61)
		Pecari 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Podstawa 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Poleposition 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty (BBCH 37).
		Procer 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Promino 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Pro-Protio	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
		Protendo 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Proqu 200 EC	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny (E1)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,15–0,25 l/ha**	2/14		Środek można stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w żdźbło (BBCH 39).
		Revycare	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Revypro	mefentriflukonazol (50 g/l) protiokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,5 l/ha**	**1**	35	
		Revysky	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Silvron Xpro	biksafen (100 g/l) fluopyram (100g/l)	karboksamidy (C2) benzamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	1		
		Skeldon	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14		
		Subigon	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Selytor	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		ERA	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Procort Duo	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy l układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Telescope	difenokonazol (100 g/l) metkonazol (54 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/21	42	
		Teko 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Tartaros	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Tizen	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy l układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	

		Tocata Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/21	35	Stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49)
		Wirtuoz Pro	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Verben	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	
		Verydor	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Proviso 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Zoxi	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Zoxis 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
RAMULARIA LIŚCI (*Ramularia collo-cygni*)		**Aderya**	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Alonty	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Ascra Xpro 260 EC	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2 l/ha**	1		
		Atrium-X	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), pirydynyloetylobenzamidy triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,2 l/ha**	2/14		
		Balaya	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Cayunis	biksafen (75 g/l), spiroksamina (150 g/l), trifloksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21		
		Amistar Max	azoksystrobina (93,5 g/l) folpet (500 g/l)	strobiluryny (C3) ftalamidy	wgłębne i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1		Termin zużycia: 31.12.2025
		Amplitude	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Divality	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Elatus Era	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elanvy	azoksystrobina (100g/l) mefentriflukonazol (66,7g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Finoro	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Felyco	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Imbrex XE	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	

		Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6-0,8 l/ha**	1-2/14		Wykazuje średni poziom skuteczności zwalczania; stosować do fazy początkukwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61
		Kayak Era	cyprodynil (225 g/l) protiokonazol (75 g/l)	anilinopirymidyny (D1) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**2,0 l/ha**	1		
		Lenvyor	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Maxtima	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
		Miralon	azoksystrobina (75g) fluksapyroksad (50g)	strobiluryny (C3) karboksyamidy (C2)	układowe i translaminarne, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Movegra	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25).
		Myresa Pro	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Protenol	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Revycare	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Revysky	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Selytor	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	
		Sulky	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Velogy Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Verydor	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Vitissimo	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO POCZĄTKU FAZY KŁOSZENIA, A NIEKIEDY DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 41–59)									
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (*Blumeria graminis*) **PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA** (*Pyrenophora Teres*) **RDZA JĘCZMIENIA** (*Puccinia hordei*) **RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ** (*Rynchosporium secalis)* **Mączniak prawdziwy zbóż i traw** – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 25–35% roślin z pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło – 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia.	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Agristar 250 SC**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Amistar Max	azoksystrobina (93,5 g/l) folpet (500 g/l)	strobiluryny (C3) ftalamidy	wgłębne i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1		Termin zużycia: 31.12.2025
		Amplitude	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania plamistości siatkowej jęczmnienia.
		Apron-X 190 EC	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,25 l/ha**	2/14	35	Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz plamistości siatkowej jęczmienia stosować w dawce 1,25 l/ha; stosować do początku fazy kwiatnienia (BBCH 61).
		Ascra Xpro 260 EC	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2 l/ha**	1		Środek można stosować do początku fazy kwiatnienia (BBCH 61).
		AsPik 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Avastel	fluksapyroksad (75g/l) protiokonazol (150g/l)	karboksyamidy (C2) triazole (G1)	do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego	**1,0-1,25 l/ha**	1		
		Aviator Xpro 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6-0,8 l/ha**	2/14		

Plamistość siatkowa jęczmienia – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w źdźbło 15–20% liści z objawami choroby. **Rdza jęczmienia** – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% powierzchni liści z pierwszymi objawami porażenia. **Rynchosporioza zbóż** – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w źdźbło 15–20% powierzchni liści z objawami choroby.		**Atrium-X**	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), pirydynyloetylobenzamidy triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,2 l/ha**	2/14		
		Azaka 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/10	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoscan 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Azoxymoc	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Basior Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		Biromil 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Bushi	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; ogranicza występowanie plamistości liści ; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Cayunis	biksafen (75 g/l), spiroksamina (150 g/l), trifloksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Broteas 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Capetus Extra 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Clayton Divot 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Capetus Extra 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Clayton Navaro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Dakar 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw
		Delaro Forte	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l) spiroksamina (107 g/g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3) ketoaminy	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	
		Dyllis	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Sokół Forte	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Delaro 325 SC	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	

		Duo Legend 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Divality	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż; środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Elatus Era	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elatus Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Eldorado	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Elanvy	azoksystrobina (100g/l) mefentriflukonazol (66,7g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Finoro	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Wykazuje średni poziom skuteczności w zwalczaniu mączniaka prawdziwego
		Erazer	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Flexity	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Forapro 425 EC	fenpropidyna (250 g/l) protiokonazol (175 g/l)	morfoliny (G2) triazole (G1)	układowe do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		v
		Harviga	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Harvinta Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Hint	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Honsiu 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Ogranicza występowanie następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
		Hutton	protiokonazol (100 g/l), spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (100 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6-0,8 l/ha**	1	35	Środek dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 0,8 l/ha oraz dla rynchosporiozy zbóż i plamistości siatkowej jęczmienia stosować w dawce 0,6 l/ha. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować do otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego.
		Imbrex XE	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Wykazuje średni poziom zwalczania choroby; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Input 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Input Triple	proquinazid (40 g/l), protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,25 l/ha**	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Innox	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65) Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		LS Prothio-Tebuc	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Midgard 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6-0,8 l/ha**	1-2/14		Wykazuje średni poziom skuteczności zwalczania mączniaka; stosować do fazy początkukwitnienia (widoczne pierwsze pyliniki) (BBCH 30-61)
		Jade	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Kanonik Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	

		Kayak Era	cyprodynil (225 g/l) protiokonazol (75 g/l)	anilinopirymidyny (D1) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**2,0 l/ha**	1		
		Kayak Next	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Komilfo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Korazzo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Kroton	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Ksystro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Lenvyor	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Librax	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Maganic	protiokonazol (175 g/l) difenokonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 – 1,0 l/ha**	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		Maxentis	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Maxtima	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia, wykazuje średni poziom zwalczania plamistości siatkowej oraz rynchosporiozy zbóż; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
		Miralon	azoksystrobina (75g) fluksapyroksad (50g)	strobiluryny (C3) karboksyamidy (C2)	układowe i translaminarne, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka
		Moc-Legenda 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Movegra	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Myresa Pro	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż; nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris Revy	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Orius 200 EW	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
		Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Padelli	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Patronius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Pioli	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw;
		Priaxor	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75-1,5 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Procer Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	Wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw;

		Profuso	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Promino Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw;
		Pro-Protio Plus	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protefin	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protenol	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Prosaro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Protendo Extra	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Regalon	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,33–2,0 l/ha**	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Revyflex plus	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l) metrafenon (100 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2), pochodne ketonu difenylowego)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	2/14	56	
		Shield 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6- l/ha**	1-2/14		Stosować od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy początku kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61)
		Sheriff 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6- l/ha**	1-2/14		Stosować od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy początku kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61)
		Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Protiocare	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protio-Spirox-Life	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Protio-Tebu-Life	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Silvestro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Sinbad	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sinstar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Soligor 425 EC	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6-0,8 l/ha**	1	35	
		Strobin 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Strobin 250-I	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Sting 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)
		Strobin 250-II	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	

		Sulky	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Supremum	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8-1,0 l/ha**	1	35	
		Syrius 200 EW	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,25 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować w temperaturze powyżej 12ºC; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; stosować w temperaturze powyżej 12ºC; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tokio 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści.
		Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6 l/ha**	1-2/14		Wykazuje średni poziom skuteczności zwalczania mącznika prawdziwego
		Soratel	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	1		Nie posiada rejetracji do zwalczania mączniaka prawdziwego Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)..
		Spirotech	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Thesorus 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tucana	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny (C3)	lokalnie układowy I translaminarnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,8–1,25 l/ha**	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw; ogranicza występowanie plamistości liści (niepatogeniczne czynniki - oparzenia słoneczne); stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż; tosować w temperaturze powyżej 12ºC; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tokama	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Ultralegend 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Uni Ken 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Ogranicza występowanie: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż
		Unix 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Vangard 75 WG	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny (D1)	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7–1,0 kg/ha**	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Variano Xpro 190 EC	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,25 l/ha**	2/14	35	Środek w zwalczaniu plamistości liści jęczmienia i mączniaka prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 1,25 l/ha. Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Velogy Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		Nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego
		Vitissimo	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Wykazuje średni poziom zwalczania chorób: plamistość siatkowa jęczmienia oraz rynchosporioza zbóż; nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia; stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Wadera Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,4 l/ha**	2/14	44	Wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw;
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (Blumeria	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu	**Afi-Fen 50 EW**	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.

THAW (Blumeria graminis)	orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	**Acrisio Flex**	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Altan 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Andros 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Bomilo	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Betera 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Blumeris 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Britribi	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Britribi	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Celsivo 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Concorde 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Cindo Extra 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Cindo Plus 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Clayton Cyflux	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Clayton Hybrid	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Clufen 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Conclude SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Cyflamid 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek również ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Cyflu4Fungi 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Cyflux 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Diopyr	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/14		
		Eizo 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Feris 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Fenamid 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	
		Globaztar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Inovis Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	

		Juan 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Kendo 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Intervio 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Leander 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Marpica	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Merces 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Ozawa 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	
		Profinity 180 SC	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/14		
		Property 180 SC	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/14		
		Prondo	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Rodeo 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	2/28	48	
		Tern 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tern Turbo 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Tonki 50 EW	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2–0,3 l/ha**	1	48	Środek ogranicza występowanie plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż.
		Umbret 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/14	42	
		Procort Duo	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Tizen	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Wirtuoz Pro	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Verben	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości (BBCH 49).
		Pro-Yoyo	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zaftra SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
RDZA JĘCZMIENIA (*Puccinia hordei*)		**Abran 250**	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Aluma X	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	2/14	35	Stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69);
		Agrizole XL	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Bolt 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)

		Corrib 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Conclude SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Daxur	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Euskatel 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)
		Globaztar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Juwel Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	**1,0/ha**	2/14	35	
		Legado	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	srodek należy zastosować przed końcem fazy kłoszenia - wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos całkowicie widoczny (BBCH 59)
		Panorama	protiokonazol (250 g/l) metkonazol (90 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	35	
		Pro-Yoyo	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Revypro	mefentriflukonazol (50 g/l) protiokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,5 l/ha**	**1**	35	
		Skeldon	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14		
		Silvron Xpro	biksafen (100 g/l) fluopyram (100g/l)	karboksamidy (C2) benzamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	1		
		Telescope	difenokonazol (100 g/l) metkonazol (54 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/21	42	
		Teko 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Tocata Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/21	35	Stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49)
		Zaftra SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (*Rynchosporium secalis*)		**Aderya**	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Amistar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Alonty	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Astrolab	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	
		Azoguard AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Azoksar Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Azuba	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Wykazuje średni poziom zwalczania
		Azo-Mat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	

		Azoxy-Life	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Azoxone 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Balaya	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Basior 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Cactai	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Bolid Plus 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby
		Clayton Augusta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Conclude AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Cortina	protiokonazol (400 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,4-0,5 l/ha**	2/14	35	
		Currando	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Dedal	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	**1,0/ha**	2/14	35	
		Dyllis	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Dobromir 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Felyco	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fungistar	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Globaztar AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Termin zużycia: 30.06.2024; Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Hill-Star	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Inovor Uno	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Judym 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Kanonik 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Legado	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		LS-Azoxy	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Makler Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Mirador 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Mirror 500 SC	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Mizona	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ortofin	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Panorama	protiokonazol (250 g/l) metkonazol (90 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,5 l/ha**	1	35	

		Patel 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61)
		Pecari 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Phoenix 500 SC	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Piastun 250 EC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Podstawa 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Poleposition 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Procer 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Promesa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Promino 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pro-Protio	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
		Shalimar	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego I interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Subigon	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Protendo 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Revycare	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Revypro	mefentriflukonazol (50 g/l) protiokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,5 l/ha**	**1**	35	
		Revysky	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Selytor	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		ERA	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Procort Duo	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Tartaros	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Telescope	difenokonazol (100 g/l) metkonazol (54 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75 l/ha**	2/21	42	
		Tizen	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Wirtuoz Pro	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Verben	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości (BBCH 49).

		Verydor	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vorona 500 SC	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	**1,5 l/ha**	2/14	42	
		Proviso 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Zaftra AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Zakeo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania tej choroby.
		Zingaro Extra 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**0,8 l/ha**	1	35	Termin zużycia 31.12.2025
		Zoxis 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA (*Pyrenophora Teres*)		**Aderya**	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Aluma X	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3), karboksyamidy (C2)	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	2/14	35	Stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69);
		Agrizole XL	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Abran 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Acrisio Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Alonty	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Avtar	protiokonazol (250 g/l), difenokonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6-0,7 l/ha**	2/14		
		Balaya	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Basior 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Bolt 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Cortina	protiokonazol (400 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,4-0,5 l/ha**	2/14	35	
		Currando	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Dedal	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Corrib 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65)
		Cactai	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		

		Chamane 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Daxur	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Empartis	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Emponor	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Entargo	boskalid (500 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,7 l/ha**	1	56	
		Euskatel 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65)
		Felyco	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Inovor Uno	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Inovis Flex	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego (U8)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,5 l/ha**	2/21	35	
		Juwel Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/14	35	
		Judym 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Kanonik 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Legado	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek należy zastosować przed końcem fazy kłoszenia - wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos całkowicie widoczny (BBCH 59)
		Mizona	fluksapyroksad (30 g/l), piraklostrobina (200 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Patel 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61)
		Pabi 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pecari 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Podstawa 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Poleposition 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Procer 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).

		Promino 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Pro-Protio	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
		Skeldon	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14		
		Subigon	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,2 l/ha**	2/21	42	
		Silvron Xpro	biksafen (100 g/l) fluopyram (100g/l)	karboksamidy (C2) benzamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,25 l/ha**	1		
		Shalimar	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego I interwencyjnego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
		Protendo 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14-21	35	Stosować można od fazy, gdy widoczny jest liść flagowy, ale jeszcze zwinięty do początku fazy kwitnienia (BBCH 37-61).
		Revycare	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Revypro	mefentriflukonazol (50 g/l) protiokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,5 l/ha**	**1**	35	
		Revysky	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Selytor	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		ERA	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Trovoris	boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1	56	
		Procort Duo	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Teko 250	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,8 l/ha**	2/14	35	
		Tartaros	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14	35	
		Tizen	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Tocata Extra	mefentriflukonazol (100 g/l), krezoksym metylowy (150 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0/ha**	2/21	35	Stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej widoczne są pierwsze ości (BBCH 30-49)

		Wirtuoz Pro	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzchniowy I układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Verben	proquinazid (50 g/l), protiokonazol (200 g/l)	quinozoliny (E1), triazole (G1)	powierzniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	Środek można stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości (BBCH 49).
		Verydor	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Proviso 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		
		Wadera 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,33-0,65 l/ha**	2/14		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Zoxi	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	Środek wykazuje średni poziom zwalczania choroby.
		Zoxis 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowy, układowy i translaminarny, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14	35	
RAMULARIA LIŚCI (*Ramularia collo-cygni*)		**Aderya**	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Alonty	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ascra Xpro 260 EC	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), proiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,2 l/ha**	1		Środek można stosować do początku fazy kwiatnienia (BBCH 61).
		Atrium-X	biksafen (65 g/l), fluopyram (65 g/l), protiokonazol (130 g/l)	karboksyamidy (C2), pirydynyloetylobenzamidy triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0-1,2 l/ha**	2/14		
		Balaya	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Cayunis	biksafen (75 g/l), spiroksamina (150 g/l), trifloksystrobina (100 g/l)	karboksyamidy (C2), ketoaminy (G2), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	2/21		Środek stosować do pocztku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Amistar Max	azoksystrobina (93,5 g/l) folpet (500 g/l)	strobiluryny (C3) ftalamidy	wgłębne i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**1,5 l/ha**	1		Termin zużycia: 31.12.2025
		Amplitude	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Divality	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Elatus Era	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elatus Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Eldorado	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Elanvy	azoksystrobina (100g/l) mefentriflukonazol (66,7g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	
		Finoro	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Felyco	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego I wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Imbrex XE	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	**0,6-0,8 l/ha**	1-2/14		Wykazuje średni poziom skuteczności; stosować do fazy początkukwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61)
		Kayak Era	cyprodynil (225 g/l) protiokonazol (75 g/l)	anilinopirymidyny (D1) triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**2,0 l/ha**	1		
		Lenvyor	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Pioli	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	
		Maxtima	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
		Miralon	azoksystrobina (75g) fluksapyroksad (50g)	strobiluryny (C3) karboksyamidy (C2)	układowe i translaminarne, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Movegra	fluksapyroksad (62,5 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**2,0 l/ha**	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Myresa Pro	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Protenol	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Revycare	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Revypro	mefentriflukonazol (50 g/l) protiokonazol (100 g/l)	triazole (G1)	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,5 l/ha**	**1**	35	
		Revysky	fluksapyroksad (66,7 g/l), mefentriflukonazol (66,7 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Selytor	mefentriflukonazol (100 g/l), piraklostrobina (100 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowyi translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego l wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14-21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Sulky	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Velogy Plus	benzowindyflupyr (100 g/l)	karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego	**0,75 l/ha**	1		
		Verydor	mefentriflukonazol (100 g/l), fluksapyroksad (50 g/l)	triazole (G1), karboksyamidy (C2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vitissimo	mefentriflukonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,5 l/ha**	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ (Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp., Monographella nivalis)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	**Agristar 250 SC**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		AsPik 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Azoxymoc	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	

		Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoscan 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Broteas 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Capetus Extra 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Clayton Divot 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Capetus Extra 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
		Clayton Navaro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75-1,0 l/ha**	1	35	
		Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Duo Legend 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Elatus Era	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Eldorado	benzowindyflupyr (75 g/l), protiokonazol (150 g/l)	karboksyamidy (C2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**1,0 l/ha**	1		
		Erazer	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		LS Prothio-Tebuc	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Midgard 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Jade	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Kayak Next	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Komilfo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Korazzo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Ksystro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Moc-Legenda 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Profuso	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Pro-Protio Plus	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Prosaro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protefin	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protendo Extra	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	

		Protiocare	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Protio-Tebu-Life	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Silvestro 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Soligor 425 EC	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole (G1), ketoaminy (G2), triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,6–0,8 l/ha**	1	35	
		Strobin 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Strobin 250-I	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Strobin 250-II	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tokama	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Ultralegend 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	**0,75–1,0 l/ha**	1	35	
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
CZERŃ ZBÓŻ (*Davidiella* sp., *Lewia* spp.)	Zapobieganie rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).	**Agristar 250 SC**	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	1	35	
		Azoxymoc	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Azoscan 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Erazer	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Komilfo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Korazzo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Ksystro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	

		Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Strobin 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Strobin 250-I	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Strobin 250-II	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/12-21	35	
		Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	**1,0 l/ha**	2/14-28	35	

SZKODNIKI									
Organizm szkodliwy	**Niechemiczne metody ochrony**	**Środki ochrony roślin**	**Substancja czynna / zawartość**	**Grupa chemiczna (IRAC)**	**Działanie**	**Dawka [kg (l)/ha]**	**Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)**	**Karencja (dni)**	**Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach**
FAZA ROZWOJOWA BBCH 01 - 15 (od wysiania ziarna do fazy wschodów i liści właściwych) oraz BBCH 10 - 29 (do końca fazy krzewienia).									
Ślimaki - Gastropoda ślimaki nagie.	**Usuwanie resztek roślinnych i samosiewów z poprzedniej uprawy, wykaszanie rowów i miedz. Pełny zestaw uprawek, wczesny siew i duży rozstaw roślin. Niszczenie chwastów w uprawach, zmianowanie - zwiększenie rożnorodności upraw. Ochrona pożytecznych zwierząt przez utrzymywanie żywopłotów, oczek wodnych i budek lęgowych dla ptaków. Stosowanie biopreparatu zawierającego pasożytnicze nicienie *Phasmarhabditis hermaphrodita*.**	Allowin 04 RB	metaldehyd - 4 %	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	5 kg/ha	3/5 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
		Axcela GB	metaldehyd - 30 g	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy krzewienia (BBCH 10-29). Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
		Axcela TS GB	metaldehyd - 27 g	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia (BBCH 01-29). W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi.
		Clartex Neo 04 RB	metaldehyd - 4 %	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	5 kg/ha	3/5 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
ślimaki nagie, ślimaki oskorupione		Ironclad	fosforan III żelaza - 29 g	Nieorganiczne związki żelaza	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach.
ślimaki nagie		Ironmax Pro	fosforan III żelaza - 24,2 g	Nieorganiczne związki żelaza	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach.
		Ślimkat Agro 3 GB	metaldehyd - 30 g	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
		Ślimax Agro Plus GB	metaldehyd - 30 g	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

		Xiren GB	metaldehyd - 30 g	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wykładać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 12–83 (rozwój liści – dojrzałość woskowa)									
Łokaś garbatek (*Zabrus tenebrioides* Goeze)	**Właściwy płodozmian, agrotechnika, Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie (szczególnie N)**	Decis Expert 100 EC	deltametryna - 100 g/l (10,5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	3/14 dni	30	UWAGA: Opryskiwać po pojawieniu się larw szkodnika lub zaraz po pojawieniu się pierwszych symptomów uszkodzeń (BBCH 12-83). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 11–30 (1 liść– wzrost źdźbła)									
Mszyce - wektory wirusów	**Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, późny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N)**	Faux 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2/10 dni	30	UWAGA: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy 1 liścia do początku wzrostu źdźbła (BBCH 11-30). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kaliber 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2/10 dni	30	UWAGA: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy 1 liścia do początku wzrostu źdźbła (BBCH 11-30). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Mavrik Vita 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2/10 dni	30	UWAGA: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy 1 liścia do początku wzrostu źdźbła (BBCH 11-30). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Portos 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2/10 dni	30	UWAGA: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy 1 liścia do początku wzrostu źdźbła (BBCH 11-30). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 37–75 (liść flagowy – dojrzałość mleczna)									
Mszyce (Aphididae)	**Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, późny siew ziarna, zrównoważone nawożenie (szczególnie N)**	Cihalotrin 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 - 75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Faux 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	30	UWAGA: środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości, od pełni fazy kłoszenia, gdy odsłania się 50% kwiatostanu do pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 55-75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Globelambda	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy początku grubienia (nabrzmiewania) pochwy liściowej liścia flagowego - wczesna faza rozwoju kłosa do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 41 – 75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kaliber 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	30	UWAGA: środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości, od pełni fazy kłoszenia, gdy odsłania się 50% kwiatostanu do pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 55-75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Jack-S	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37 – 75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kidrate	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37 – 75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Mavrik Vita 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	30	UWAGA: środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości, od pełni fazy kłoszenia, gdy odsłania się 50% kwiatostanu do pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 55-75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Modivo 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 - 75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Nexide 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 - 75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Nonnus 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 - 75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Portos 240 EW IP	tau-fluwalinat - 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	30	UWAGA: środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości, od pełni fazy kłoszenia, gdy odsłania się 50% kwiatostanu do pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 55-75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Rapid 060 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37-75).Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C
		Sankari IP	kwas nonanowy - 650 g/l (71,44%)	nasycone kwasy karboksylowe	Kontaktowy / Na roślinie działa powierzchniowo	1,5-2,0 l/ha	1(2)	nd	UWAGA: Środek stosować jesienią zgodnie z sygnalizacją, po zaobserwowaniu szkodników, ewentualnie ich pierwszych objawów żerowania, od fazy szpilkowania do fazy końca krzewienia (BBCH 10-29). Drugi zabieg wykonać w przypadku wydłużonego okresu pojawu szkodników. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 10°C.
		Sparrow	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sparviero	lambda-cyhalotryna –100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 37–75). Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Vantex 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosowaćod początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Skrzypionka zbożowa (*Oulema melanopa* L.) Skrzypionka błękitek (*Oulema cyanella* Voet.)	**Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, prawidłowy płodozmian, wysiew odmian, które wcześniej się kłoszą i dojrzewają, wczesny siew ziarna, zrównoważone nawożenie.**	Cihalotrin 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosowaćod początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Modivo 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosowaćod początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Nexide 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosowaćod początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Nonnus 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosowaćod początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Rapid 060 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosowaćod początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Vantex 60 CS	gamma-cyhalotryna - 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Stosowaćod początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.