



CONOTRACHELUS NENUPHAR

Herbst, 1797

Ryjkowiec śliwowy



Fot. MAPAQ, eppo.int



Conotrachelus nenuphar (CONHNE) – <https://gd.eppo.int>

Ryzyko fitosanitarne: **wysokie**
Niepewność diagnozy: **średnia**
Wymagania fitosanitarne: **podlega obowiązkowi zwalczania w krajach Unii Europejskiej**


Charakterystyka

Chrzęszcz należący do rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). Dorosłe osobniki osiągają długość 5–7 mm, są barwy brązowoszarej z czarnymi obszarami pokrytymi garbkami na pokrywach. Posiadają dobrze rozwinięty ryjek. Na ciele obecne są czerwono-brązowe oraz czerwonożółte włoski. **Larwa** łukowato zgięta, biała z ciemniejszą głową, beznoga, o długości 6–9 mm. **Poczwarka** jest żółtobiała z ciemniejszą głową, o długości 5–7 mm. **Cykl rozwojowy**: trwa 50–55 dni, w zależności od warunków klimatycznych.

Rośliny żywicielskie

Szkodnik jest oligofagiem żerującym głównie na roślinach rodziny Rosaceae. Preferuje owoce drzew i krzewów rodzajów: *Prunus* spp. (śliwy, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, morele), *Malus* spp. (jabłonie), *Pyrus* spp. (grusze). Może zasiedlać również *Vaccinium* spp. (borówki) oraz *Ribes* spp. (porzeczki). Preferencje dotyczące roślin żywicielskich mogą się różnić w zależności od regionu występowania szkodnika.

Fot. P.J. Chapman, eppo.int



Conotrachelus nenuphar (CONHNE) – <https://gd.eppo.int>

Larwa *C. nenuphar*
w owocach wiśni

Fot. Clemenson University, USDA, Bugwood.org



UGA1234091

C. nenuphar żerujący na śliwce

Fot. Dean Polk, eppo.int



Samica chrząszcza składająca
jaja na owocach borówki


W przypadku zaobserwowania lub podejrzenia obecności szkodnika należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować najbliższą jednostkę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
<http://piorin.gov.pl/>



CONOTRACHELUS NENUPHAR

Herbst, 1797

Ryjkowiec śliwowy



Conotrachelus nenuphar (CONHNE) – <https://gd.eppo.int>

Fot. P.J. Chapman, eppo.int

Miejsca złożenia jaj przez samicę *C. nenuphar*
(w kształcie litery D) na zawiązkach wiśni




Conotrachelus nenuphar (CONHNE) – <https://gd.eppo.int>

Fot. Peter Jentsch, eppo.int

Miejsca złożenia jaj przez samicę *C. nenuphar*
(w kształcie litery D) na owocu jabłoni

Zasięg występowania

Szkodnik występuje na obszarze Ameryki Północnej (Kanady i USA).



Analizy Zagrożenia Agrofagiem (PRA) w Polsce

https://www.plantquarantine.pl/pl/pr_1683.html

e-mail: kwarantanna@iorpib.poznan.pl

Materiały opracowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2023,
na realizację zadania pn. „Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń
fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”.