

GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE PHYTOPLASMA (FDp)

Caudwell A., Giannotti J., Kuszala C., Bachelier J.C., 1971
Fitoplazmatyczna żółtaczką dorée winorośli



Fot. Biologische Bundesanstalt, epppo.int



Żółknięcie wzdłuż nerwów i nekroza blaszki liściowej winorośli porażonej FDp

Fot. Luca Ferretti, CREA – Research Centre for Plant Protection and Certification, epppo.int



Skręcone liście winorośli porażonej FDp

Ryzyko fitosanitarne: **średnie**

Niepewność oceny ryzyka: **średnia**

Wymagania fitosanitarne: **podlega obowiązkowi zwalczania w krajach Unii Europejskiej**

Charakterystyka

Fitoplazma Flavescence dorée (FDp) to plejomorficzna bakteria należąca do klasy Mollicutes, pozbawiona ściany komórkowej, zasiedlająca naczynia floemu. Posiada kolisty chromosom o wielkości około 670 kbp. Należy do grupy żółtaczk wiążu (16 SrV, podgrupy C, D, E oraz Y).

Diagnostykę FDp przeprowadza się przy użyciu metod molekularnych.

Rośliny żywicielskie

Głównymi żywicielami FDp są winorośl właściwa (*Vitis vinifera*) oraz inne gatunki i hybrydy winorośli wykorzystywane jako podkładki. Patogen może również porażać inne rośliny, takie jak: powojnik pnący (*Clematis vitalba*), olsza czarna (*Alnus glutinosa*), leszczyna pospolita (*Corylus avellana*), wierzba (*Salix* sp.), winorośl pachnąca (*Vitis riparia*), złocień trójbarwny (*Glebionis carinata*), koniczyna biała (*Trifolium repens*) i bób (*Vicia faba*).



Fot. Biologische Bundesanstalt, epppo.int

Zasychanie owoców winorośli porażonej FDp



Fot. INRAE Bordeaux, epppo.int

Czerwienienie i skręcanie liści winorośli porażonej FDp

W przypadku zaobserwowania lub podejrzenia obecności patogenu należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować najbliższą jednostkę

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

www.gov.pl/web/piorin



Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE PHYTOPLASMA (FDp)

Caudwell A., Giannotti J., Kuszala C., Bachelier J.C., 1971
Fitoplazmatyczna żółtaczką dorée winorośli



Fot. INRAE Bordeaux, eppo.int

Czerwienienie i skręcenie
liści winorośli porażonej FDp




Fot. INRAE Bordeaux, eppo.int

Zamieranie owoców
winorośli zainfekowanej FDp

Zasięg występowania

Fitoplazma FDp występuje wyłącznie w Europie. Po raz pierwszy wykryto ją w południowo-zachodniej Francji, skąd rozprzestrzeniła się na winnice całej południowej Europy. Jej obecność odnotowano m.in. w Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Czarnogórze i Słowenii.



Analizy Zagrożenia Agrofagiem (PRA) w Polsce
<https://www.plantquarantine.pl/pl/pr/1683.html>
e-mail: kwarantanna@iorpib.poznan.pl

Materiały finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2025,
na realizację zadania pn. „Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń
fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”.