

ANTHONOMUS EUGENII

Cano



Fot. Luciano Nuccitelli, eppto.int



Anthonomus eugenii (ANTHEU) – <https://gd.eppto.int>

Ryzyko fitosanitarne: **niskie**

Niepewność oceny ryzyka: **średnia**

Wymagania fitosanitarne: **podlega obowiązkowi zwalczania w krajach Unii Europejskiej**

Charakterystyka

Chrzęszcz należący do rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae) o długości 2,5–3,5 mm i 1,5–1,8 mm szerokości. Ciało owalne, ciemnobrązowe do szaroczarnego, pokryte białozłotymi włoskami. Przednia część głowy jest wydłużona w ryjek (rostrum), na którym znajdują się czułki oraz na końcu aparat gębowy.

Larwy są beznogie, wygięte łukowato, szarobiałe do szarozółtych, z jasnobrązową głową. Dorastają do 6 mm długości.

Poczwarka i jaja są początkowo białe, a następnie żółtą. Identyfikacja owada pod względem morfologicznym jest trudna i możliwa wyłącznie w przypadku chrząszczy. Optymalną temperaturą dla rozwoju jest 30°C. Owad zamiera już w –5°C. Cykl rozwojowy *A. eugenii* w temperaturze 27°C jest krótki i trwa 2 tygodnie, w 15°C około 6 tygodni.

Rośliny żywicielskie

Owad żeruje na roślinach psiankowatych (Solanaceae), głównie na różnych gatunkach papryki (*Capsicum* spp.), ale można go spotkać także m.in. na bakłażanie (*Solanum melongena*), pomidorze (*S. lycopersicum*), psiance koralowej (*S. pseudocapsicum*), *Datura stramonium*, *Nicotiana glauca*, *Calibrachoa parviflora* i *Physalis ixocarpa*.



Fot. Luciano Nuccitelli, eppto.int

Anthonomus eugenii (ANTHEU) – <https://gd.eppto.int>

Chrzęszcz *A. eugenii* żerujący we wnętrzu papryki



Fot. Julian Rodriguez, eppto.int

Anthonomus eugenii (ANTHEU) – <https://gd.eppto.int>

Poczwarka *A. eugenii*



Fot. Blandine Debourse, Simone Fornery, eppto.int

Anthonomus eugenii (ANTHEU) – <https://gd.eppto.int>

Jaja *A. eugenii*

W przypadku zaobserwowania lub podejrzenia obecności szkodnika należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować najbliższą jednostkę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
www.gov.pl/web/piorin



Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



ANTHONOMUS EUGENII


Cano



Anthonomus eugenii (ANTHEU) – <https://gd.eppo.int>

Fot. Wlasek den Hartog, eppo.int

Otwór wylotowy chrząszcza *A. eugenii* w papryce




Anthonomus eugenii (ANTHEU) – <https://gd.eppo.int>

Fot. Blandine Delbourse, Simone Fornari, eppo.int

Papryka z objawami żerowania *A. eugenii*

Zasięg występowania

Gatunek pochodzi z Meksyku, skąd rozprzestrzenił się do innych krajów Ameryki Północnej i Centralnej, na Karaiby, Hawaje i Polinezję Francuską. Incydentalnie wraz z transportem owoców pojawił się w Europie (we Włoszech, Holandii), gdzie został skutecznie eradykowany.



Analizy Zagrożenia Agrofagiem (PRA) w Polsce

<https://www.plantquarantine.pl/pl/pr/1683.html>

e-mail: kwarrantanna@iorpib.poznan.pl

Materiały opracowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2023, na realizację zadania pn. „Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”. Zaktualizowano w 2025 r.