

AROMIA BUNGII

Faldermann, 1835



Fot. Tim Haye, eppo.int



Aromia bungii (AROMBU) – <https://gd.eppo.int>

Ryzyko fitosanitarne: **wysokie**

Niepewność diagnozy: **średnia**

Wymagania fitosanitarne: **podlega obowiązkowi zwalczania w krajach Unii Europejskiej**

Charakterystyka

Chrzęszcz należący do rodziny kózkowatych (Cerambycidae).

Ciało o długości 22–38 mm, wydłużone, niebieskoczarne, błyszczące, z charakterystycznym jaskrawoczerwonym przedpleczem, na którym po bokach znajduje się para mocnych kolców. Czułki są jednolicie czarne, równie długie lub nieco dłuższe niż ciało. **Jaja** białawe, podłużne, cylindryczne, o długości około 2 mm. Wyrośnięte **larwy** są żółtobiałe, ich długość dochodzi do 42–52 mm, brązowa głowa jest wciągnięta w rozszerzone przedplecze. **Poczwarka** typu wolnego, jasnożółta, ciemnieje wraz z rozwojem, o długości 22–38 mm, nogi i czułki podwinięte.

Cykl rozwojowy: 2–4 lata, w zależności od klimatu.

Aromia bungii przejawia wyższą aktywność i szybsze tempo rozwoju w wyższych temperaturach.

Rośliny żywicielskie


Drzewa i krzewy rodzaju *Prunus* spp., m.in.: śliwy, wiśnie, brzoskwinie, morele i gatunki ozdobne tego rodzaju. Może również zasiedlać orzech (*Juglans* spp.), kasztanowca (*Castanea* spp.), oliwkę (*Olea* spp.) i topolę (*Populus* spp.).



Fot. Matteo Maspero, eppo.int

Aromia bungii (AROMBU) – <https://gd.eppo.int>

Owad dorosły *A. bungii*



Fot. Raffaele Griffo, eppo.int

Aromia bungii (AROMBU) – <https://gd.eppo.int>

Larwa *A. bungii*



Fot. Raffaele Griffo, eppo.int

Aromia bungii (AROMBU) – <https://gd.eppo.int>

Żerowisko larw *A. bungii* w pniu drzewa

W przypadku zaobserwowania lub podejrzenia obecności szkodnika należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować najbliższą jednostkę Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
www.gov.pl/web/piorin



Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AROMIA BUNGII

Faldermann, 1835



Aromia bungii (AROMBU) – <https://gd.eppo.int>

Fot. Matteo Maspéro, eppo.int

Przekrój pnia drzewa z widocznymi chodnikami larwalnymi *A. bungii*




Aromia bungii (AROMBU) – <https://gd.eppo.int>

Fot. Matteo Maspéro, eppo.int

Trociny u podstawy drzewa wyrzucone przez larwy *A. bungii*

Zasięg występowania

Chrzęszcz *A. bungii* pochodzi z północno-wschodniej Azji. Występuje w Chinach, Japonii, Korei, Mongolii i na Tajwanie. Jego pojedyncze ogniska stwierdzono w krajach europejskich, na terenie Włoch i Niemiec.



Analizy Zagrożenia Agrofagiem (PRA) w Polsce

<https://www.plantquarantine.pl/pl/pr/1683.html>

e-mail: kwarantanna@iorpib.poznan.pl

Materiały opracowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2023, na realizację zadania pn. „Monitorowanie i analiza nowych zagrożeń fitosanitarnych ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”. Zaktualizowano w 2025 r.