



Chroń wolno żyjące zapylacze



Bzyg prątkowany



Rusałka pawik



Trzmiel kamiennik



Pszczolinka pospolita

Dlaczego wolno żyjące zapylacze są ważne?

- ➔ Ponad 75% gatunków roślin uprawnych potrzebuje owadów do zapylania
- ➔ Wolno żyjące zapylacze (błonkówki, muchówki, motyle, chrząszcze) uzupełniają pracę pszczoły miodnej
- ➔ Dzięki zapyłaczom plony są wyższe i lepszej jakości
- ➔ Zapylacze przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności, a tym samym rozwoju rolnictwa zrównoważonego

Jak wspomagać i chronić wolno żyjące zapylacze?

- Twórz nowe lub pozostaw już istniejące pasy kwietne, miedze, zakrzaczenia śródpolne – są to miejsca bytowania owadów oraz naturalne źródło pyłku i nektaru
- Stosuj płodozmian i uprawy mieszane – różnorodność gatunkowa roślin wspiera populacje zapylaczy
- Wysiewaj w międzyplonach rośliny miododajne (np. facelię, koniczynę, gorczycę, grykę)
- Nie wypalaj traw i ogranicz ich koszenie – są to miejsca bytowania wielu zapylaczy
- Stosuj w pierwszej kolejności niechemiczne środki ochrony roślin
- Stosuj środki ochrony roślin w czasie, gdy ryzyko ich kontaktu z owadami zapylającymi jest najmniejsze
- Unikaj wykonywania zabiegów insektycydami w czasie kwitnienia uprawy
- Wykonuj zabiegi precyzyjnie, aby zapobiegać znoszeniu cieczy roboczej
- Stosuj wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu w Polsce
- Zapoznaj się z treścią etykiety środka ochrony roślin, zanim go kupisz i zastosujesz

Murarka ogrodowa



Orszół paskowany



Porobnica włochatka



Trzmiel ziemny