

**WYKAZ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH
I ŚLIMAKOBÓJCZYCH REKOMENDOWANYCH
DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI WARZYWNYCH
ROŚLIN GRUNTOWYCH**

Autorzy

mgr inż. Dariusz Rybczyński, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 6.2

**„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony
roślin uprawnych”**

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skierniewice, Luty 2026

Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych, rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach warzyw gruntowych

Stan na 15.02.2026

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r. dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin>. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty zawierające nowe terminy na sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zawierające wycofaną substancję czynną nie ujętą w rejestrze <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow>
- Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować. <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>
- Należy bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami w sezonie. W przypadku podanych dawek „od–do”, wyższą należy stosować przy dużym zagrożeniu przez szkodniki oraz do zwalczania starszych stadiów larwalnych szkodników.
- Stosowanie syntetycznych pyretroidów (oznaczone**) i innych bardzo toksycznych środków dla fauny pożytecznej powinno być ograniczone do minimum. W wyjątkowych sytuacjach jeden z preparatów z grupy pyretroidów może być zastosowany maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie, głównie wtedy, gdy temperatura powietrza nie przekracza 20 °C.
- Należy wykluczyć ze stosowania na rośliny uprawne **w czasie kwitnienia** środki zawierające w etykietach zwrot „niebezpieczny dla pszczoł” – zaznaczone w kolumnie 6.
- Zabronione jest stosowanie środków o długim okresie działania, toksycznych dla fauny pożytecznej w okresie kiedy jest ona obecna na roślinach
- **Środki należy stosować przemiennie – maksymalna liczba zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami jest zapisany w etykiecie. Stosowanie syntetycznych pyretroidów jest uwarunkowane dostępnością preparatów z innych grup chemicznych. W wyjątkowych sytuacjach środki te mogą być zastosowane maksymalnie 1 raz w cyklu uprawowym.**
- Środki są stosowane w formie opryskiwania, bądź w formie aplikacji doglebowej.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina – szkodnik	Uwagi dotyczące stosowania środków w Integrowanej Produkcji
1	2	3	4	5	6
Środki biologiczne (mikrobiologiczne i biotechniczne)					
R-56/2017	Agree 50 WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>aizawai</i> szczep GC-91 - 500 g/kg (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	brukiew – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, przezierka rukwianka, tantniś krzyżowiaczek czarna rzodkiew, rzodkiew – tantniś krzyżowiaczek	
R-9/2019wu R-1377/2024d	BioBit	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście	
				kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście	
R-10/2019wu	BioDorPro	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 - 54 %	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée,	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik,	

1	2	3	4	5	6
		(środek biologiczny)	Parc d'Affaires de Crecy, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście bób, groch, fasola, pomidor, ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brokuł, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (w gruncie), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar, koper włoski, szparag – gąsienice uszkadzające liście	
R-151/2018	Delfin WG	<u>Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 (Btk SA-11)</u> (środek biologiczny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta pekińska, włoska, brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych, tantnisiowatych	
R-5/2019wu	DiPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> szczep ABTS 351 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brokuł, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście	
R-11/2019wu R-1374/2024d	Florbac	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 - 54 %	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik,	

1	2	3	4	5	6
		(środek bakteryjny)	Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, Sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, bób, groch, fasola, por, czosnek, szalotka, dymka, szparag, rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście	
R-48/2017 wu	Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> , szczep EG 2348) - 150 g/kg (środek bakteryjny)	CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy	papryka, sałata, ogórek – światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik cukinia, fasola – słonecznica oręźówka, gąsienice motyli sówkowatych endywia, cykoria – błyszczka jarzynówka cebula, por, czosnek, szczypiorek, bób, groszek zielony cukrowy – gąsienice motyli sówkowatych kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
R-53/2018 *30.04.2026	XenTari WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Republika Francuska	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście pomidor, papryka – gąsienice uszkadzające liście ogórek, cukinia, dynia – gąsienice uszkadzające liście seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur – gąsienice uszkadzające liście burak ćwikłowy – gąsienice uszkadzające liście sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) – gąsienice uszkadzające liście seler naciowy – gąsienice uszkadzające liście fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany	

1	2	3	4	5	6
				na strąki – gąsienice uszkadzające liście bób uprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona – gąsienice uszkadzające liście por, czosnek, szalotka, dymka – gąsienice uszkadzające liście szparag – gąsienice uszkadzające liście rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście	
R-50/2017 wu	Naturalis	Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 – 0,185 g/kg (substancja z grupy biologicznych insektycydów)	CBC (Europe) S.r.l. Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Włochy	pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon, sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszponka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por, jarmuż, kalarepa, szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy, szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar, kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca – mączliki, wciornastki, przedziorek chmielowiec, drutowce sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszponka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny – mszyce	
R-11/2020 wu	NEMguard DE	wyciąg z czosnku 450g (środek pochodzenia naturalnego)	Certis Europe B.V Stadsplateau, 3521 AZ Utrecht, Królestwo Niderlandów	marchew, pasternak – nicienie (ograniczenie szkodliwości)	
R-31/2023	Aza	azadyrachtyna A	Sharda Cropchem	pomidor – mszyca brzoskwiowa i inne gatunki mszyc,	

1	2	3	4	5	6
		(związek z grupy limonoidów	España S.L., Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina n°3, 12th Floor, 30006 Murcia, Hiszpania	mączliki, wciornastki ziemniak – stonka ziemniaczana (średni poziom zwalczania)	
R-16/2020 wu	Neem Azal T/S	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące szparag – owady ssące, owady gryzące ziemniak – stonka ziemniaczana	
R-70/2023	NeemPro	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące szparag – owady ssące, owady gryzące ziemniak – stonka ziemniaczana	
R -4/2019 wu	Fitter	kwasy tłuszczowe C14 do C20 - 479,8 g	Alpha BioPesticides Limited Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, Wielka Brytania	pomidor – mączliki, mszyce, przędziorki, ogórek, cukinia, kabaczek, patison, marchew, pietruszka, melon, dynia olbrzymia, dynia makaronowa, dynia piżmowa, dynia zwyczajna – mszyce kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta pak-choi, kalarepa – mszyce, mączliki	
R-45/2024	Neudosan	sól potasowa kwasów tłuszczowych – 515 g/l (kwasy tłuszczowe i nienasycone sole potasu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska, sałata, cykoria, endywia, roszponka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola – mszyce fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona – mszyca	

1	2	3	4	5	6
				burakowa	
R-12/2019	Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC	pyretryny – 4,59 g/l (substancja z grupy naturalnych pyretryn) olej rzepakowy – 825,3 g/l (produkt pochodzenia naturalnego)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D- 31860 Emmerthal 1, Niemcy	fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce cebula, czosnek, por, szalotka – mszyce sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych) szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) kalarepa – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) ziemniak – stonka ziemniaczana	
R-26/2023 h.r. *15.03.2026	Max Spin	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Biocont Polska sp. z o.o. , ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków	brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielozerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica seler korzeniowy – liściolubka selerowa jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielozerna szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki	Niebezpieczny dla pszczoł. Ne stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Niebezpieczny dla pszczoł. Ne stosować na rośliny uprawne w czasie

1	2	3	4	5	6
				szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	kwitnienia
R-171/2023	Nexuba	Spinosa: Spinozyn A, Spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce cebula, czosnek, por, szalotka – mszyce sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych) szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) kalarepa – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

1	2	3	4	5	6
				ziemniak – stonka ziemniaczana	
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
R-133/2023	Nokaut	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepek, pietnówka kapustnica, brokuł, kalafior – bielinek rzepek, pietnówka kapustnica cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-111/2021 h.r. *15.03.2026	Pikador 240 SC	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	brokuł, kalafior – bielinek rzepek, pietnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepek, pietnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica seler korzeniowy – liściolubka selerowa jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepek, pietnówka kapustnica rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepek. rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepek, śmietka ćwiklanka ziemniak – stonka ziemniaczana	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-90/2023 *15.03.2026.	Spanner 480 SC	spinosad 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych	Galenika-Fitofarmacja d.o.o. Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepek, pietnówka kapustnica brokuł, kalafior – bielinek rzepek, pietnówka kapustnica	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

1	2	3	4	5	6
R – 47/2018 wu *15.03.2026.	SpinTor 480 SC	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Ljubljani, Słowenia Corteva Agriscience UK Limited CPC2 capital Park Fulbourn, CB21 5XE Cambridge, Wielka Brytania	cebula, por – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, pietnówka kapustnica, brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, pietnówka kapustnica cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, pietnówka kapustnica szczypiorek uprawiany w gruncie – wciornastki szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik rośliny warzywne uprawiane na młode liście – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-131/2012, *15.03.2026.	SpinTor 240 SC	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa"	brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, pietnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, pietnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

1	2	3	4	5	6
				sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka	
R-65/2021 h.r. *15.03.2026	Spinosad Max	spinosad 240 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy) sałata głowiasta, długolistna (rzymska), liściowa (kędzierzawa) – błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, wciornastki seler korzeniowy – liściolubka selerowa	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

1	2	3	4	5	6
				szczaw, szpinak – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki roszponka, rukola – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna rośliny warzywne uprawiane na młode liście – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka, wciornastki	
R- 141/2023	Essenciel	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R- 45/2018wu	Limocide	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-20/2020 wu	Pesticol	olejek pomarańczowy – 60g/l (substancja z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-57/2019 h.r.	Prev-Am	olejek pomarańczowy 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

1	2	3	4	5	6
R-44/2020 h.r.	PREV-BIO	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri International Ltd. Bankstraat, 9715CJ Groningen, Holandia	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-28/2025	Prev-Gold	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	por, cebula (w uprawie w polu) – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselka (w uprawie w polu) – mączliki	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-34/2022	Daxxos	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-35/2022	Doux	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-194/2023	Ferrocious	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste – ślimaki nagie	
R-153/2023	Hierro	fosforan żelaza – 10 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste (w uprawie polowej) – ślimaki nagie	
R-31a/2020wu	Ironclad	fosforan żelaza 29 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Doff Portland (Ireland), Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, D02 A339, Irlandia	rzepa, rzodkiew, brukiew, seler korzeniowy, sałata i inne warzywa liściowe, w tym endywia, cykoria, roszonek, portulaka warzywna, rukola, burak liściowy, boćwina, kalafior, brokuł, kalafior zielony (romanesco), jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, marchew, seler naciowy, por, czosnek, koper włoski (uprawiany na liście), karczoch zwyczajny, cebula siedmiolatka (czosnek dęty), groch, fasola, bób, ziemniak – ślimaki nagie i skorupkowe	
R-38/2018 wu	Ironmax Pro	fosforan żelaza(III) 24,2 g/kg	De Sangosse SA, BP 5, F47480 Pont-du-Casse,	burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, rzodkiew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona,	

1	2	3	4	5	6
		(związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Republika Francuska	kapusta brukselska, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, karczoch, por, sałata głowiasta, szpinak, burak liściowy, boćwina, szczypior, seler, koper włoski, koper ogrodowy, pietruszka, groch, fasola – ślimaki nagie	
R-37/2022	Iroxx	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-36/2022	Minixx	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-39/2022	Pixxela	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-159/2024	Sluggo Pro	fosforan III żelaza - 41,6 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	rośliny warzywne m. in. sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne (uprawa w polu) – ślimaki nagie	
R-2/2019wu	Sluxx HP	fosforan żelaza(III) 297,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-159/2021	Vitrol GB	pirofosforan żelaza – 24 g/kg	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny bulwiaste – ślimaki nagie i oskorupione	
R-159/2021	Vitrol GB	pirofosforan żelaza – 24 g/kg	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny bulwiaste – ślimaki nagie i oskorupione	
Środki chemiczne					
R-34/2017 R-1394/2024d	Aceptir 200 SE	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy),	

1	2	3	4	5	6
				groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypioraki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnowka egipska, mszyce chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce	
R-139/2020 h.r.	Acetamip Płynny 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-187/2025	Acetogal	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Galenika-Fitofarmacja a.d. Batajnicki drum bb 11080 Zemun, Belgrade Republika Serbii	kapusta głowiasta – chowacz brukwiacek ziemniak – stonka ziemniaczana	
R-6/2012wu	Affirm 095 SG	benzoesan emamektyny – 9,5 g/kg (związek z grupy makrocyclicznych)	"Syngenta Crop Protection AG CH4002 Bazylea, Szwajcaria"	bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i	Niebezpieczny dla pszczoł. W czasie kwitnienia roślin uprawnych stosować poza okresami aktywności

1	2	3	4	5	6
		laktarów)		czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna – słonecznica oręźówka, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkówekczka, omacnica prosowianka sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica	pszczoł
R-63/2020	Afinto	flonikamid 500 g w 1	ISK Biosciences Europe	kapusta głowiasta biała i czerwona – mszyce (w tym	

1	2	3	4	5	6
		kg (związek z grupy karboksamidów)	N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	mszyca kapuściana), mączliki groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki	
R-140/2020 h.r. *31.10.2026.	AGRIprol 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantnis krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R - 129/2021	Alakazam 500 WG	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	JT Agro Ltd, 126-134 Baker Street, Londyn W1U 6UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki ziemniak – mszyce ziemniaczane groch – mszyca grochowa, oprzędziki Groch – mszyca grochowa, oprzędziki kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki	
R-15/2015wu	Allowin 04 RB	metaldehyd – 4% (związek z grupy aldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie	
R-54/2021 *31.10.2026.	Aphicar Duo 400 EC	cypermetryna – 100 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R - 101/2020 *15.03.2026	Aphox 500 WG	pirymikarb 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana	

1	2	3	4	5	6
R-33/2017 R-1394/2024d	Apis 200 SE	acetamipryd – 200 g (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02- 486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce	
R-141/2025	Atsina	chlorantraniliprol – 200 g/l (antranilowe di amidy)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta biała – zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana	

1	2	3	4	5	6
R-68/2024	Axcela TS GB	metaldehyd – 27g/kg (pochodne aldehydu octowego)	YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D- 30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	burak liściowy (boćwina), endywia, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, ziemniak (w uprawie w polu) – ślimaki nagie	
R-3/2019wu R-1422/2024d *31.10.2026	Belem 0,8 MG	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Cevveloppement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	marchew, pietruszka, seler, pasternak – polysznica marchwianka ziemniak – drutowce	
R-144/2018	Benevia 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polysznica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica	
R-109/2021 h.r.	Bensekt 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86- 131 Laskowice	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polysznica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska	

1	2	3	4	5	6
				kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica	
R-79/2020	Besarion 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polysznica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica	
R - 66/2020 h.r.	Bombardier 100 OD	cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polysznica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica	

1	2	3	4	5	6
R-112/2024	Bunduki	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-164/2025d	Busola	acetamipryd – 120 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	ziemniak – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo-ziemniaczana, mszyca szakłakowoziemniaczana, stonka ziemniaczana	
R-138/2020 h.r.	Camelina 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-157/2018	Carnadine 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-94/2021 h.r. *31.10.2026.	Chloran 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86-131 Laskowice	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tanńś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tanńś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				kalafior, brokuł – tanńś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka	
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-16/2022 h.r. *31.10.2026.	Chloran4Insects 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Private Lab Sp. z o. o. ul. Karola Darwina, 43-603 Jaworzno	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tanńś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tanńś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				kalafior, brokuł – tanńś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	

1	2	3	4	5	6
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-87/2021 h.r. *30.09.2026.	Cihalotrin 60 CS	gamma-cyhalotryna 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	groch zwyczajny siewny – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek	
R-69/2024 h.r.	Cimex 500 EC	cypermetryna 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z o.o ul. Koralowa, 86-031 Osielsko	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa por – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławcy, szarek komośnik brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście koper ogrodowy – mszyce bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki	

1	2	3	4	5	6
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki sałata – mszyce, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – wciornastki	
R-19/2023 h.r. *30.04.2026	Cimex Forte 500 EC	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Koralowa, 86-031 Osielsko	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka groch ogrodowy – mszyca grochowa por – wciornastki	
R-19/2023 h.r.	Cimex Max 500 EC	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Koralowa, 86-031 Osielsko	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka groch ogrodowy – mszyca grochowa por – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławcy, szarek komośnik brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście koper ogrodowy – mszyce bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki sałata – mszyce, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – wciornastki	

1	2	3	4	5	6
R-17/2015 wu	Clartex Neo 04 RB	metaldehyd – 4% (związek z grupy metaldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie	
R - 27/2021wu *31.10.2026.	Columbo 0,8 MG	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement, 60 chemin des Mouilles – 69130 Ecully, Republika Francuska	marchew (w uprawie w polu) – drutowce, połyśnica marchwianka	
				kapusta głowiasta: biała, czerwona, włoska (uprawa w polu z rozsady) – drutowce, śmietka kapuściana	
				pietruszka, seler, pasternak (w uprawie w polu z siewu) – drutowce, połyśnica marchwianka	
				cebula, czosnek (z siewu i z rozsady) – drutowce	
				ziemniak – drutowce	
R-50/2016	Coragen 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa"	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka	
				fasola szparagowa - – błyszczka jarzynówka, słonecznica oreżówka, przezierka prosowianka	
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-54/2020 h.r. *31.10.2026.	Cordero 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka	
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)	

1	2	3	4	5	6
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-55/2020 h.r.	Corleone 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-5/2022	Corprima 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-12/2021 h.r.	Coxima	fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i> ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny	
R-1/2024 h.r.	Crassus	cypermetryna - 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Albertstrasse, 94327 Bogen, Niemcy	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa cebula, czosnek, szalotka, por – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławki, szarek komośnik brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście	

1	2	3	4	5	6
				szparagi – pososkrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście koper ogrodowy – mszyce bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki sałata – mszyce, zmieniki	
R-56/2025 h.r.	Cyberforce 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Kalinowski Sp. z o.o. ul. Czereśniowa, 64-530 Kazmierz	groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki sałata – mszyce, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławcy, szarek komośnik burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście	

1	2	3	4	5	6
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce koper ogrodowy – mszyce	
R-55/2012	Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii"	groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki sałata – mszyce, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławcy, szarek komośnik burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce koper ogrodowy – mszyce	
R-23/2023 h.r. *31.10.2026.	Cypermetryx 100 EW	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselska, kalafior, brokuł – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyce ziemniak – stonka ziemniaczana	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

1	2	3	4	5	6
R-187/2015 *31.10.2026.	CythrIn 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,	groch ogrodowy – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki	
R-181/2023	Decide	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	kalafior – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania), gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika i innych gatunków motyli pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (ograniczenie występowania)	Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-9/2012	Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik , mszyce kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce marchew – mszyce, połyśnica marchwianka groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona) – mszyce, strąkowiec grochowy fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce cebula z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki pomidor – stonka ziemniaczana ziemniak – stonka ziemniaczana	Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-59/2011	Decis Expert 100 EC	deltametryna 100 g/ l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	pomidor – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik marchew – mszyce, połyśnica marchwianka groch zwyczajny – mszyce, strąkowiec grochowy fasola – mszyce cebula uprawiana z siewu, z rozsady i z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki	Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

1	2	3	4	5	6
R-32/2005	Decis Ogród 015 EW	deltametryna – 15 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer CropScience S.A Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana ziemniak – stonka ziemniaczana	
R-27/2015	Deka 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, połyśnica marchwianka kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana	
R-96/2013	DelCaps 050 CS	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica oreżówka, mszyce ogórek, cukinia – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana	
R-69/2018	Delmetros 100 SC	deltametryna 100g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-60/2025	Delta Forte	deltametryna 50g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik marchew – mszyce, połyśnica marchwianka pomidor – stonka ziemniaczana	
R-216/2019	Delta-Glob 25 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	.
R-176/2020	Deltaro	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-15/2014 h.r.	Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Madez- Firma HandlowoUsługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74240	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyce kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

1	2	3	4	5	6
			Lipiany"	pomidor – stonka ziemniaczana marchew – mszyce, polyśnica marchwianka groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona) – mszyce, strąkowiec grochowy fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki	
R-39/2024 h.r.	Deltagard	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	.
R-93/2017	Deltakill	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	burak ćwikłowy – mszyce, gąsienice zjadające liście, śmietki marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka, mszyce, gąsienice zjadające liście rzodkiewka, rzodkiew czarna – pchełki ziemne, mszyce, gąsienice zjadające liście, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, Kapusta brukselska, kapusta pak choi, brukiew, rzepa, kalarepa – mszyce, gąsienice zjadające liście, tantnis krzyżowiaczek czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka – mszyce, wgryzka szczypiora chrzan pospolity, fasola szparagowa por, szczypiorek, sałata, seler naciowy, koper włoski, kukurydza cukrowa, rabarbar, rukola, szczaw zwyczajny, rośliny warzywne z przeznaczeniem na młode liście (babyleaf) – mszyce, gąsienice zjadające liście ogórek krótki uprawiany w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, pchełki ziemne, gąsienice zjadające liście cukinia, patison uprawiane w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, gąsienice zjadające liście	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

1	2	3	4	5	6
				groch zielony cukrowy uprawiany na strąki – mszyce, wciornastki, oprzędzik przegowany szparagi – mszyce, gąsienice zjadające liście, poskrzypka szparagowa koper ogrodowy, seler liściasty, pietruszka zwyczajna uprawiana na liście – mszyce, gąsienice zjadające liście, polyśnica marchwianka, ryjkowcowate, stonkowate ziemniak – stonka ziemniaczana	
R-95/2013	DeTop 050 CS	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica oręźówka, mszyce ogórek, cukinia – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana	
R-97/2013	DeLux 050 CS	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica oręźówka, mszyce ogórek, cukinia – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana	
R-58/2019	Demetrina 25 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	Niebezpieczne dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
R-26/2015	Desha 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana	
R-20/2024	Diastar Maxi	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	ziemniak – drutowce	
R-66/2020	Dyno 2,5 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana	
R-73/2023	Ercole	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – drutowce (średni stopień zwalczania)	
R-113/2024	Fengress	teflutryna 5 g/kg	Diachem S.P.A.	ziemniak – drutowce	

1	2	3	4	5	6
		(związek z grupy pyretroidów)	Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy		
R-22/2025 h.r.	Faux 240 EW	<u>tau-fluwalinat 240 g/l</u> (związek z grupy pyretroidów)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	kalafior, kalarepa, brokuł, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-9/2025	Fielder 5 EC	<u>esfenwalerat 50 g/l</u> (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica	
R-67/2020 h.r.	Filary 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	cebula, cebula dymka, cebula na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki, śmietka cebulanka, miniarka porówka marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny	
R-13/2025 h.r.	Flonik 500 WG	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana) kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska – mączliki groch łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) ziemniak – mszyce	

1	2	3	4	5	6
R-122/2025	Floniki	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – mszyce	
R-51/2008	Force 20 CS	teflutryna 200 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	kukurydza cukrowa – drutowce, stonka kukurydziana	
R-19/2022	Fortenza 600 FS	cyjanotraniliprol 600 g/l (związek z grupy (antranilowych diamidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	kukurydza cukrowa – drutowce, stonka kukurydziana	
R-70/2024	Geri 20 SP	acetamipryd - 200 g/kg, (związek z grupy (neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa fasola , – strąkowiec fasolowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec, wciornastki por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypioraka, wciornastki ogórek , – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki ziemniak – chrząszcze i larwy stonki ziemniaczanej	
R-151/2021	Globelambda	lambda-cyhalotryna 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	Niebezpieczny dla pszczoł. Środek stosować po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły.
R-146/2019	Hinode	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy (karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – mszyce kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska – mszyce, w tym mszyca kapuściana, mączliki groch łuskowy – mszyce, w tym mszyca grochowa	.

1	2	3	4	5	6
R -189/2025	Imprus	acetamipryd - 200 g/kg, (związek z grupy (neonikotynoidów)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21, 2327 Rače Republika Słowenii	kapusta głowiasta – chowacz brukwiacek ziemniak – stonka ziemniaczana	
R-87/2024	Inecor 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska sp. z o.o., ul Złota 59, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-83/2016	Inazuma 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Stosować wyłącznie po wieczornym oblocie pszczoł
R-162/2017	Inpower 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Stosować wyłącznie po wieczornym oblocie pszczoł
R-47/2020 h.r.	Insektus Duo 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200 Pyrzyce	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	

1	2	3	4	5	6
				groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa por, cebula, czosnek, szalotka – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mglawy, szarek komośnik brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście koper ogrodowy – mszyce bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, sałata – mszyce, zmieniki	
R-147/2015	Judo 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce	Niebezpieczny dla pszczoł. Środek stosować poza okresami aktywności pszczoł.
R-203/2016	Kaliber 240 EW	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Adama Polska Sp. z o.o ul. Sienna, 00-121 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kalarepa – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica kalafior, brokuł zwyczajny – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana,	

1	2	3	4	5	6
				bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-16/2024	Karate 0,4 GR	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – drutowce	
R-31/2013	Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce	Niebezpieczny dla pszczoł. Środek stosować poza okresami aktywności pszczoł.
R-106/2018	Kestrel 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-5/2021 h.r.	Kianotraniliprol 100 OD	cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	ziemniak – stonka ziemniaczana cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica	.

1	2	3	4	5	6
R-34/2019 h.r. *31.10.2026.	Klortranil	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	
R-24/2020 h.r. *31.10.2026	Kobalt 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliary	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	
R-190/2016 *30.04.2026.	Kobe 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki groch, – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki	

1	2	3	4	5	6
R-68/2018	Koron 100 SC	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana ziemniak – stonka ziemniaczana	Niebezpieczny dla pszczoł. Środek nie stosować w okresie aktywności pszczoł.
R-145/2015	Kusti 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce	Niebezpieczny dla pszczoł. Środek nie stosować w okresie aktywności pszczoł
R-125/2023	Labamba	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana, mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania) pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania) kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantnis krzyżowiaczek	Niebezpieczny dla pszczoł. Środek nie stosować w okresie aktywności pszczoł
R-159/2013	Lamdex Extra 2,5 WG	lambda-cyhalotryna – 2,5% (związek z grupy pyretroidów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – stonka ziemniaczana czosnek, szalotka – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
R-191/2016 *30.04.2026	Lanmos 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka,	

1	2	3	4	5	6
				wciornastki	
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki	
				groch , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec	
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnataz rzepakowiec, wciornastki	
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki	
R-142/2025	Leaxo 200 SL	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-195/2015	Lima Oro 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokietta siewna (rukola), sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie	
R-194/2015	Lima Oro 5 GB	metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5 % (50 g/kg).	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-23/2016	Limgol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy pochodnych aldehydu)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-28/2017 R - 1394/2024d	Los Ovados 200 SE	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
				groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce	
				bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce	
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec	

1	2	3	4	5	6
				fasolowy, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce brukiew, rzepa – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełki, mszyce	
R-133/2018	Mainman 50 WG	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – mszyce kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mączliki, mszyce (w tym mszyca kapuściana) groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)	
R-80/2019	Matrix 2,5 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska,	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik	

1	2	3	4	5	6
		pyretroidów)	00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka pomidor – stonka ziemniaczana	
R-229/2014	Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)/l	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-106/2016	Medal 3 GB	metaldehyd (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	sałata, rokieta siewna, kapusta głowiasta – ślimaki nagie	
R - 22/2016	Metkol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-36/2022	Minixx	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-24/2016	Molufries 5 GB	metaldehyd - 30 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-37/2008 *30.04.2026	Mospilan 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	"Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40210 Dusseldorf, Niemcy"	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki	

1	2	3	4	5	6
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki	
R-71/2024	Mospilan Classic	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy"	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobica burakowa por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki groch, – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki	
R-18/2021	Mospilan Mizu	<u>acetamipryd 20</u> (neonikotynoidy)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	ziemniak – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo-ziemniaczana, mszyca szklakowo-ziemniaczana, stonka ziemniaczana	
R-18/2025 h.r.	Mozano	<u>cyjanotraniliprol 200 g/l</u> (antranilowe diamidy)	Madez Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki ul. Myśliborska, 74-240 Lipiany	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana	
R-46/2021 h.r. *31.10.2026.	Mulier 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykorja – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka	

1	2	3	4	5	6
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-81/2013	Nemathorin 10 GR	fostiazat – 10% (związek z grupy fosforoorganicznych)	"ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem, Królestwo Belgii"	ziemniak – mątwik ziemniaczany	
R-161/2017	Nepal 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd.Vinter's Place uppe Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	oberżyna, pomidor – wciornastek tytoniowiec, zminiki, mszyce	Niebezpieczny dla pszczoł. Stosować po wieczornym oblocie pszczoł.
R-7/2022 h.r.	Nevbia 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica	
R-198/2019 *30.09.2026.	Nexide 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec	

1	2	3	4	5	6
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	
R-146/2015	Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce	Niebezpieczny dla pszczół. Środek nie stosować w okresie kwitnienia roślin uprawnych, kwitnących chwastów. Stosować poza okresami aktywności pszczół.
R-83/2021 h.r. *30.09.2026.	Nonnus 060 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslach Sträße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantnis krzyżowiaczek groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany	
R-5/2026	Nuyard	deltametryna 100g/l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS 74 rue George de Loup , 69009 Lyon, Republika Francuska	pomidor – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik marchew – mszyce, polyśnica marchwianka groch zwyczajny – mszyce, strąkowiec grochowy fasola – mszyce cebula uprawiana z siewu, z rozsady i z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki	Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-55/2025 h.r.	Ozyrys	<u>chlorantraniliprol 200 g/l</u> (antranilowe diamidy)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantnis krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	

1	2	3	4	5	6
R - 157/2025	Paniri 200 SC	chlorantraniliprol -200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów) -	FMC Agro Polska sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Rzeczpospolita Polska	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana), kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-67/2018	Pilgro 100 SC	deltametryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana ziemniak – stonka ziemniaczana	
R - 112/2020 *15.03.2026	Pirigold 500 WG	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana	
R-30/2013 *15.03.2026	Pirimor 500 WG	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana	
R-80/2024	Pirox 05 SC	fenpiroksymat – 50 g/l (związek z grupy fenoksypirazoli)	Synthos Agro sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim	ogórek – przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec	
R-39/2022	Pixxela	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie	
R-59/2014	Poleci 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, połyśnica marchwianka kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana	

1	2	3	4	5	6
R-57/2024 h.r.	Portos 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200	brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-142/2021	Proclaim	benzoesan – 9,5 g/kg emamektyny (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee, CH-4058 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna – słonecznica orężówka, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

1	2	3	4	5	6
				frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica	
R-175/2020	Prokill	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-4/2023 h.r.	Pro-Piryd SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-126/2022	Prosperace 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-21/2016	Push 5 GB	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokietta siewna, sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-127/2018 *30.09.2026	Rapid 060 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek	
R-17/2023 h.r. *31.10.2026.	Reene 200 SC	chlorantraniliprol - 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	

1	2	3	4	5	6
R-158/2021	Riposta 500 WG	pirymikarb – 500 g w 1 kg (związek z grupy karbaminianów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana	
R-142/2022	Roslix 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R - 156/2025	Sapporo 20 SP	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka	
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa	
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki	
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki	
				groch , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec	
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki	
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki	
R-112/2016	Scatto	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Isagro SpA, Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Republika Włoska	ziemniak – stonka ziemniaczana	Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-189/2016 *30.04.2026	Sekil 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka	
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa	
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka,	

1	2	3	4	5	6
				wciornastki	
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki	
				groch , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec	
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnataz rzepakowiec, wciornastki	
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki	
R-25/2016	Sharmet 5 GB	metaldehyd – 50 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	sałata, rokieta siewna, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-10/2024	Shenzi 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-114/2014 *31.10.2026	Sherpa 100 EC	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica	Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-24/2021wu *31.10.2026	Sherpa 100 EW	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselka – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana ziemniak – stonka ziemniaczana	Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

1	2	3	4	5	6
R-5/2021 *31.10.2026	Sherpa Duo 400 EC	cypermetrynia – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów) 300 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-125/2022	Shooter 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-127/2022	Silencjum 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R-9/2016	Siga 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	kapusta głowiasta, rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie	
R-164/2018	Sivanto Prime	flupyradifuron – 200 g/l (związek z grupy butenolidów)	Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Republika Francuska	brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta , – mszyca brzoskwiowa, mszyca kapuściana	
				groch zwyczajny uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – mszyca grochowa	
				ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana	
R-39/2025 h.r.	Skunk SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-238/2014	SlimKat Agro 3 GB	metaldehyd – 30 g/kg (związek z grupy pochodnych aldehydu)	YOU Solutions Germany GmbH Freundallee, D-30173 Hannover, Niemcy	ziemniak – ślimaki nagie	

1	2	3	4	5	6
R-8/2019 wu	Slug-OFF	metaldehyd – 2,5 % (związek z grupy aldehydów)	De Sangosse SAS Bonnell, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	sałata i podobne warzywa liściaste, szpinak i podobne warzywa liściaste (w tym portulaka, boćwina), karczoch ziemniak, kukurydza cukrowa, burak ćwikłowy, groch, fasola, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, brukiew, rzepa – ślimaki nagie	
R-8/2016	Slugicol 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie	
R-7/2016	Slugix 3 GB	metaldehyd – 30 g/kg. (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie	
R-126/2021	Snacol 3 GB	metaldehyd – 26,5 g/kg (substancja z grupy pochodnych aldehydu octowego)	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	kapusta głowiasta, sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe – ślimaki nagie	
R-6/2016	Sneg 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia"	rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie	
R-74/2020	SoilGuard 0,5 GR	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce	
R-44/2024	SoilProtect 0,5 GR	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce	
R-84/2019	Soltex Niezwodny SNAILMAX 05GB trutka na ślimaki w granulacie	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	sałata, rokietta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-75/2021 h.r.	Sombrero 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-36/2023 h.r.	Sorcerer Max	cypermetryna – 500	"ProEuro Sp. z o.o.	groch - mszyca grochowa	

1	2	3	4	5	6
*30.04.2026.		g/l (związek z grupy pyretroidów)	Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra"	kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki	
R-172/2017	Sparrow	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-15/2014 zr	Sparviero	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-41/2017	Sumicidin 050 EC	esfenwalerat - 50 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta – gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.	
R-177/2012	Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica	.
R-61/2013 *31.10.2026.	Super-Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	groch ogrodowy – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki groch – mszyca grochowa por – wciornastki	.
R-20/2023 h.r	Superkill 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	cebula, czosnek, szalotka – wciornastki groch – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastek tytoniowiec ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	.

1	2	3	4	5	6
R-188/2015 *31.10.2026.	Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	groch – - mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki	
R-61/2023	Suvisio 200 SC	chlorantraniliprol - 200 g/l (antranilowe diamidy)	FMC Agro Polska Sp z o.o ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R - 217/2019	Ślimatox 5 GB	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii,	sałata, rokietta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie	
R-54/2012	Teppeki 50 WG	flonikamid – 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	IKS Bioscences Europe S.A. De Kleetham, B-1831 Diegem, Belgia	ziemniak – mszyce ziemniaczane kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki	
R-41/2025 h.r. *30.04.2026.	Timber 20 SP	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni	

1	2	3	4	5	6
				owiec, zmieniki groch , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki	
R-3/2021	Topgun 50 CS	lambda-cyhalotryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProAgri Sp. z o.o. ul. Kolejowa, 56-420 Bierutów	cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, wciornastek tytoniowiec ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka	Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
R-32/2024 h.r.	Uni Insect 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Univate Sp. z o.o. ul. Łopuszańska, 02-457 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)	
R - 91/2021 *30.09.2026	Vantex 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harbøre, Królestwo Danii	kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany	.
R-16/2025 h.r. *09.12.2026.	Vanto Duo	flupyradifuron 75 g/l + deltametryna 10g/l (związki z grupy butenolidów i pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	kukurydza cukrowa – mszyce, omacnica prosowianka, słonecznica orężówka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa	.
R-68/2021 h.r.	Vegra 200 SC	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała – śmietka kapuściana	
R-135/2022	Velmeri 500 WG	flonikamid - 500 g/kg (związek z grupy	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mączliki	

1	2	3	4	5	6
		karboksamidów)	Londyn, Wielka Brytania	kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana) ziemniak – mszyce ziemniaczane	
R-22/2020.	Velum Prime	Fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i> ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny	
R-105/2018	Verimark 200 SC	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana	
R - 73/2021	Voliam	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)	
R-3/2024 h.r.	Vortex	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Madez- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana	
R-28/2019	Xapiro	<u>fenpiroksymat 50 g/l</u> (związek z grupy fenoksypirazoli)	Synthos Agro Sp z o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	ogórek – przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec	
R-239/2014	Xiren GB	metaldehyd – 3 % (związek z grupy aldehydów)	Lonza Cologne GmbH Nattermannallee, 50829 Kolonia, Republika Federalna Niemiec	ziemniak – ślimaki	
R-149/2025	Xiren TS GB	metaldehyd – 2,7 % (związek z grupy aldehydów)	YOU Solutions Germany GmbH, Seligmannallee 1, D-30173 Hannover,	kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, endywia, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, burak liściowy (boćwina), ziemniak – ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki	

1	2	3	4	5	6
			Republika Federalna Niemiec		

* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.