

PROGRAM OCHRONY RZEPAKU OZIMEGO



Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej
ochrony roślin uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz
bezpieczeństwa żywności”

Poznań 2026

Program opracowany pod redakcją:

prof. dr hab. Marka Korbasa

Autorzy:


Chwasty - dr hab. Roman Kierzek, mgr Krystyna Miklaszewska,

Choroby - prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz, dr inż. Jakub Danielewicz

Szkodniki - prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr hab. Przemysław Strażyński, dr inż. Monika Jaskulska

FAZY ROZWOJOWE

(szczegółowy opis faz rozwojowych BBCH w metodyce integrowanej ochrony)



Program integrowanej ochrony rzepaku ozimego przed chwastami, patogenami i szkodnikami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego w marcu 2026 roku.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej ochronie roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

CHWASTY									
Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna	Mechanizm działania substancji aktywnej (wg HRAC)	Działanie	Dawka kg(l). (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów /	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
FAZA ROZWOJOWA									
Przed siewem rzepaku									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Baristo 500 SC	napropamid (amidy) - 500 g/l (47,22%)	K3	Doglebowe	2,4 l.	1	ND	
		Inventor 500 SC	napropamid (amidy) - 500 g/l (47,22%)	K3	Doglebowe	2,4 l.	1	ND	
		Napramid 450	napropamid (związek z grupy amidów) - 450 g/l (42,25%)	K3	Doglebowe	2,8 l.	1	ND	Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm, a następnie wysiać rzepak.
		Wicher 500 SC	napropamid (amidy) - 500 g/l (47,22%)	K3	Doglebowe	2,4 l.	1	ND	Mozna również stosować najpóźniej do 3 dni po siewie w mieszaninie zbiornikowej Wicher 500 SC - 2,0 l/ha + Efektor 360 CS lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS - 0,16 l/ha + Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Meztotop 500 SC - 1,0 l/ha
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Devrinol 450 SC	napropamid (amidy) - 450g/l (40,87%)	K3	Doglebowe	3 l.	1	ND	Mozna również stosować po siewie, ale przed wschodami roślin rzepaku (BBCH 00 do BBCH 08)
FAZA ROZWOJOWA									
Przed siewem, po wschodach chwastów									
Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Colzamid	napropamid (amidy) - 450g/l (40,87%)	K3	Doglebowe	3,0 l	1	ND	
		Glejt 360	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropylaminowej - 360 g/l (30,9%)	G	Nalistne	3,0 l.	1	ND	Zabieg wykonywać 5-7 dni przed siewem rośliny uprawnej.
		Singlif	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropylaminowej - 360 g/l (30,9%)	G	Nalistne	3,0 l.	1	ND	Zabieg wykonywać 5-7 dni przed siewem rośliny uprawnej.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00 (bezpośrednio po siewie do 3 dni)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bantux	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	
		Baristo 500 SC	napropamid (amidy) - 500 g/l (47,22%)	K3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	Stosować w mieszaninie zbiornikowej: Baristo 500 SC - 2,0 l/ha + Efektor 360 CS lub Koncept 360 CS lub Boa 360 CS - 0,16 l/ha + Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Meztotop 500 SC - 1,0 l/ha.
		Boa 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolidonów) - 360g/l (31,63%)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	Preparat powoduje bielenie roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku.
		Boa Pro 480 EC	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (46,63%)	F4	Doglebowe	0,2 - 0,25 l.	1	ND	
		Brasilerb 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,06%)	F3	Doglebowe	0,2 - 0,25 l.	1	ND	
		Butisan 400 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	Mozna również stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają, co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy pierwszej pary liści
		Butisan Duo 400 EC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 200 g/l (18,23%) dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (18,23%)	K3, K3	Doglebowe	2,0-2,5 l.	1	ND	
		Butisan Mono	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	Mozna również stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają, co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy pierwszej pary liści
		Butisan Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 333 g/l (29,5%), chinomerek (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe	2,5 - 3,0 l.	1	ND	Środek ochrony Butisan Star 416 SC oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
		Butisan Star Max 500 SE	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 200 g/l (17,5%), dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (17,5%), chinomerek (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 100 g/l (8,8%)	K3, K3, O	Doglebowe	2,0-2,5 l.	1	ND	
		Castellar	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	Mozna również stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają, co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy pierwszej pary liści
		Castille	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	Mozna również stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają, co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy pierwszej pary liści
		Chlomaz-Life	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidonów) - 360 g/l (31,39%)	F4	Doglebowe	0,25 - 0,33 l.	1	ND	
		Chlomazon 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolidonów) - 360 g/l (31,7%)	F3	Doglebowe	0,25 - 0,33 l.	1	ND	
		Chlomazon 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	Preparat powoduje bielenie roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku. Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Climb	chlomazon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,06%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	

Colzor Trio 405 EC	dimetachlor (chloroacetoanilidy) – 187,5 g/l (17,6%) napropamid (amidy) – 187,5 g/l (17,6%) chlomazon (izoksazolidiony) – 30 g/l (2,8%)	K3, K3, F3	Doglebowe	2,5-4,0 l.	1	ND	
Command 480 EC	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (46,66%)	F3	Doglebowe	0,25 l.	1	ND	W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.
Command Top 375 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 30 g/l (2,73%) napropamid (związek z grupy alkanamidów) - 345 g/l (31,36%)	F3, K3	Doglebowe	2,75-3,0 l.	1	ND	Preparat powoduje bieleń roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku.
Dual Next	petoksamid - związek z grupy chloroacetamidów - 600 g/l (56,6%)	K3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
Efector 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360g/l (31,63%)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	
Efector Pro 480 EC	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) - 480 g/l (46,63%)	F4	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
Elna	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 480 g/l (47,06%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
Helm-Clomi 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 480 g/l (47,06%)	F3	Doglebowe	0,25 l.	1	ND	Preparat powoduje bieleń roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku.
Hero 424 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 24 g/l (2,32%), petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 400 g/l (38,65%)	F3, K3	Doglebowe	2,5-3,0 l.	1	ND	
Inar	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 480 g/l (47,06%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
Inventor 500 SC	napropamid (amidy) - 500 g/l (47,22 %)	K3	Doglebowe	2,4 l.	1	ND	W celu zwiększenia spektrum chwastobójczego środek stosować w mieszaninie zbiornikowej: Inventor 500 SC - 2,0 l/ha + Efector 360 CS lub Konzept 360 CS lub Boa 360 CS - 0,16 l/ha + Metax 500 SC lub Mezzo 500 SC lub Mezzotop 500 SC - 1,0 l/ha.
Julius 424 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 24 g/l (2,32%) petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 400 g/l (38,65%)	F3, K3	Doglebowe	2,5-3,0 l.	1	ND	
Kalif 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (30,30%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC w następujących dawkach: Kalif 360 CS 0,2 – 0,25 l/ha + Metazanex 500 SC 1,5 l/ha
Kalif 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,06%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC w następujących dawkach: Kalif 360 CS 0,2 – 0,25 l/ha + Metazanex 500 SC 1,5 l/ha
Koban 600 EC	petoksamid - związek z grupy chloroacetamidów - 600 g/l (56,59%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
Koncept 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360g/l (31,63%)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	Preparat powoduje bieleń roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku.
Kumak 283 SE	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 33 g/l (3,1%) metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 250 g/l (23,2 %)	F4, K3	Doglebowe	2,5 – 3,0 l.	1	ND	
LS-Clomaz	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (31,39%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
Meteor Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 – 3,0 l.	1	ND	
Merton Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe	2,5 – 3,0 l.	1	ND	
Mojang 600 EC	petoksamid - związek z grupy chloroacetamidów - 600 g/l (56,6%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
Myvero 424 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 24 g/l (2,32%), petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 400 g/l (38,65%)	F3, K3	Doglebowe	2,5-3,0 l.	1	ND	
Nero 424 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 24 g/l (2,32%), petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 400 g/l (38,65%)	F3, K3	Doglebowe	2,5-3,0 l.	1	ND	
Permuson 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 – 3,0 l.	1	ND	
Prize	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (30,98%)	F3	Doglebowe	0,25 - 0,33 l.	1	ND	
Rapsan Plus	metazachlor (związek z grupy chloroacetamidów) - 333 g/l (29,5%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 83 g/l (7,4 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 - 3,0 l.	1	ND	
Reactor 360 CS	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (33,33%)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
Reactor 480 EC	chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (45,71%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	Preparat powoduje bieleń roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku.

		Reactor 480 Plus EC	chlomazon (substancja z grupy izoksazolionów) – 480 g/l (46,66%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC. Zalecana dawka: Reactor Plus 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.
		Springbok Duo	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 200 g/l (18,2 %) dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (18,2 %)	K3, K3	Doglebowe	2,0 – 2,5 l.	1	ND	
		Springbok	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 200 g/l (18,2 %) dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (18,2 %)	K3, K3	Doglebowe	2,0 – 2,5 l.	1	ND	
		Successor 600 EC	petoksamid - związek z grupy chloroacetamidów - 600 g/l (56,6%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Szabla 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolionów) - 480 g/l (47,06%)	F3	Doglebowe	0,25 l.	1	ND	Preparat powoduje bielenie roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku.
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Ciomate 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolionów) - 360 g/l (30,25%)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	
		Comandor 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolionów) – 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Comodo 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolionów) – 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	Stosować maksymalnie do 5 dni po wysianiu. Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Dakota 500 SC	metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	
		Hadar 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolionów) – 360 g/l (31,7%)	F3	Doglebowe	0,25 - 0,33 l.	1	ND	
		Kalif Mega 283 ZC	chlomazon (związek z grupy izoksazolionów) – 33 g/l (3,01%) metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 250 g/l (22,77%)	F3, K3	Doglebowe	2,5-3,0 l.	1	ND	
		Marqis 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolionów) – 360 g/l (31,7%)	F3	Doglebowe	0,25 - 0,33 l.	1	ND	
		Mota	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g w 1 litrze środka (37,21%)	K3	Doglebowe/ Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Naspar 500 SC	metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	
		Parisan 500 SC	metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	
		Raper 500 SC	metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	
		Rapsan 500 SC	metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	
		Rexxan SC	metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00-05 (po siewie do 4-7 dni)									
Chwasty dwuliścienne i chwastnica jednostronna	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Angelus 360 CS	chlomazon (substancja z grupy izoksazolionów) – 360 g/l (31,2 %)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	Środek stosować bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 4 dni
		Clozone	chlomazon (substancja z grupy izoksazolionów) – 360 g/l (31,2 %)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	Środek stosować bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 4 dni
		Evea 360 CS	chlomazon (substancja z grupy izoksazolionów) – 360 g/l (31,2 %)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	Środek stosować bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 4 dni
		Upstage	chlomazon (substancja z grupy izoksazolionów) – 360 g/l (31,2 %)	F3	Doglebowe	0,33 l.	1	ND	Środek stosować bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 4 dni
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Butisan Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	Środek ochrony Butisan Star 416 SC oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancje czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
		Butisan Star Max 500 SE	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 200 g/l (17,5%), dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (17,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,8%)	K3, K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,0-2,5 l.	1	ND	
		Meteor Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Merton Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	
		Permuson 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 – 3,0 l.	1	ND	
		Rapsan Plus	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 83 g/l (7,4 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 l.	1	ND	

		Sultan Top 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 375 g/l (32,92%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,97%)	K3, O	Doglebowe/ Nalístne	2 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Effendi 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,3%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek stosować w dawce 1,5 l łącznie ze środkiem Chlomezon 360 CS lub Marqis 360 CS lub Hadar 360 CS (w dawce 0,25l).
		Hiperkan 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,3%)	K3	Doglebowe	1,5 l.	1	ND	W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek stosować w dawce 1,5 l łącznie ze środkiem Chlomezon 360 CS lub Marqis 360 CS lub Hadar 360 CS (w dawce 0,25l).
		Metkan 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,3%)	K3	Doglebowe	1,5 l.	1	ND	W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek stosować w dawce 1,5 l łącznie ze środkiem Chlomezon 360 CS lub Marqis 360 CS lub Hadar 360 CS (w dawce 0,25l).
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00-07 (po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), ale przed wschodami rzepaku)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Colzor Sync Tec	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 150 g/l (13,8 %) napropamid (związek z grupy alkanamidów) - 150 g/l (13,8 %) chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 24 g/l (2,2 %)	K3, K3, F3	Doglebowe	5 l.	1	ND	
		Circuit GS Sync Tec	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 300 g/l (27,21%) chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 40 g/l (3,65%)	K3, F3	Doglebowe	2,5 l.	1	ND	
		Lisere 600 EC	petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 600 g/l (56,6%)	K3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	
		Surtence 600 EC	petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) - 600 g/l (56,6%)	K3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	W celu zwiększenia skuteczności działania środka i rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów można stosować w mieszaninie z herbicydem Reactor 360 CS
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00-08 (po siewie rzepaku - maksymalnie 5 dni po wysianiu)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Altiplano DAM	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 35 g/kg (3,5%) napropamid (związek z grupy alkanamidów) - 400 g/kg (40 %)	F3, K3	Doglebowe	3,0 kg.	1	ND	
		Boa 480 EC	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
		Clematis 480 EC	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
		Clomate 480 EC	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
		Zedix 480 EC	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Bismark	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 55 g/l (4,8 %) pendimetalina (substancja z grupy dinitroanilin) - 275 g/l (24,34 %)	F3, K1	Doglebowe	1,5 l.	1	ND	
		Camelot	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 55 g/l (4,8 %) pendimetalina (substancja z grupy dinitroanilin) - 275 g/l (24,34 %)	F3, K1	Doglebowe	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 00-09 (suchy ziarniak do fazy przedostania się liści na powierzchnię gleby)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Comodo 480 EC	chlomezon (związek z grupy izoksazolidonów) - 480 g/l (47,3%)	F3	Doglebowe	0,2-0,25 l.	1	ND	
		Butisan Avant	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 300 g/l (26%), dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 100 g/l (8,7%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 100 g/l (8,7%)	K3, K3, O	Doglebowe/ Nalístne	2,5 l.	1	ND	
		Butisan Mix	dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 333 g/l (29,5 %), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 168 g/l (14,8 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalístne	1,5 l.	1	ND	
		Butisan Pro	dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 333 g/l (29,5 %), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 167 g/l (14,8 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalístne	1,5 l.	1	ND	
		Rapsan Gold	metazachlor - 333 g/l (29,38%), chinomerak - 83 g/l (7,32%)	K3, O	Doglebowe/ Nalístne	2,25 l.	1	ND	
		Runway	aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 30 g/l (2,95%)	O	Doglebowe/ Nalístne	0,2 l.	1	ND	
		Solanis	dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 333 g/l (29,5 %), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 167 g/l (14,8 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalístne	1,5 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsięwziętych	Brando	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 100 g/l (9,03 %) napropamid (związek z grupy amidów) - 500 g/l (45,16 %)	O, K3	Doglebowe	1,5 - 2,25 l.	1	ND	Stosować do fazy 4 liścia BBCH 14.

		Brasan 540 EC	dimetachlor - związek z grupy chloroacetanilidów - 500 g /l (47,17%) chlomazon - związek z grupy izoksazolidonów - 40 g /l (3,77%)	K3, F3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	
		Bantux 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Butisan 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Butisan S	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Butisan Top	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l (32,60%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,87 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Colzor Uno	dimetachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (47,48%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	Stosować do fazy 4 liścia BBCH 14. W porównaniu do zabiegu przed wschodami rzepaku zastosowanie środka powschodowo może być mniej skuteczne w zwalczaniu chabra białatka, komosy białej i tasznika pospolitego.
		Impesco 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 83 g/l (7,4%).	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 - 3,0l.	1	ND	
		Merton Top 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g /l (32,92%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,97%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2 l.	1	ND	
		Meteor Top 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g /l (32,92%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,97%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2 l.	1	ND	
		Metropolitan	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,49 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Naspar Solo 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Raper Solo 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Rapsan Solo 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Rapsan Turbo	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l (32,60%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,87 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Rapuzi 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,78 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Teridox 500 EC	dimetachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (47,48%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	Stosować do fazy 4 liścia BBCH 14. W porównaniu do zabiegu przed wschodami rzepaku zastosowanie środka powschodowo może być mniej skuteczne w zwalczaniu chabra białatka, komosy białej i tasznika pospolitego.
		Torso SC	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 71 g/l (6,28%) metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 214 g/l (18,94%) napropamid (związek z grupy amidów) - 206 g/l (18,23%)	O, K3, K3	Doglebowe	3,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 01-08 (bezpośrednio po siewie przed wschodami)									
Chwasty jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Tazachmer 500 SC	metazachlor (chloroacetanilidy) - 375 g/l (32,92 %) chinomerak (kwas chinolinokarboksylowe) - 125 g/l (10,97 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i chwastnica jednostronna	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Libeccio 360 CS	chlomazon - (związek z grupy izoksazolidonów) - 360g/l (30,9%)	F3	Doglebowe	0,33l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Merton 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (44,36%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Metazanex 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (44,36%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Meteor 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%)	K3	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Mezzo Plus 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%)	K3	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Mezzo Super 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%)	K3	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Mota	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g w 1 litrze środka (37,21%)	K3	Doglebowe/ Nalistne	2,5 l.	1	ND	

FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-14 (rzepak w fazie liści do fazy 4 liści)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Astor 360 SL	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 240 g/l (20,31%) pikloram (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 80 g/l (6,77%) aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 40 g/l (3,38%)	O, O, O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	
		Blast	chloryralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 240 g/l (20,31%) pikloram (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 80 g/l (6,77%) aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 40 g/l (3,38%)	O, O, O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	
		Iguana	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 240 g/l (20,31%) pikloram (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 80 g/l (6,77%) aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 40 g/l (3,38%)	O, O, O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	
		Merton Top 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l (32,92%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,97%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Meteor Top 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l (32,92%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,97%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Navigator 360 SL	chloryralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 240 g/l (20,24%) pikloram (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 80 g/l (6,75%) aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 40 g/l (3,37%)	O, O, O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	
		Rapsan Gold	metazachlor - 333 g/l (29,38%), chinomerak - 83 g/l (7,32%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,25 l.	1	ND	
		Uni Nav 360 SL	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 240 g/l (20,31%) pikloram (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 80 g/l (6,77%) aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 40 g/l (3,38%)	O, O, O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Metax 500 SC	metazachlor (substancja z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,98%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Mezotop 500 SC	metazachlor (substancja z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,98%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Mezzo 500 SC	metazachlor (substancja z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,98%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Sultan Top 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l (32,92%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,97%)	K3, O	Nalistne	2,0 l.	1	ND	Stosować do końca fazy 4 liścia właściwego rzepaku ozimego.
		Torso SC	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 71 g/l (6,28%) metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 214 g/l (18,94%) napropamid (związek z grupy amidów) - 206 g/l (18,23%)	O, K3, K3	Doglebowe	2,3 - 3,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-16 (rzepak w fazie liści do fazy 6 liści)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cieravo 285 SC + Dash HC	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego) - 250 g/l (22,6%) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 35 g/l (3,16%) + adiuwant	O, B,	Nalistne	1,0 + 1,0 l.	1	ND	Nie stosować środków zawierających substancję czynną chinomerak częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
		Cleversa 285 SC + Dash HC	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego) - 250 g/l (22,6%) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 35 g/l (3,16%) + adiuwant	O, B,	Nalistne	1,0 + 1,0 l.	1	ND	Nie stosować środków zawierających substancję czynną chinomerak częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
		Pentagon	pendimetalina (substancja z grupy dinitroanilin) - 455 g/l (38,87%)	K1	Doglebowe/ Nalistne	2,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Rapuzi 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,78%)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-18 (rzepak od fazy liści do 8 liści właściwych)									
Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bantux 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48%)	K3	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Butisan 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48%)	K3	Nalistne	1,5 l.	1	ND	

		Butisan S	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Butisan Top	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l (32,60%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,87 %)	K3, O	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Naspar Solo 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Raper Solo 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Rapsan Solo 500	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,48 %)	K3	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Rapsan Turbo	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l (32,60%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 125 g/l (10,87 %)	K3, O	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Butisan Avant	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 300 g/l (26%), dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 100 g/l (8,7%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 100 g/l (8,7%)	K3, K3, O	Nalistne	2,5 l.	1	ND	Środek stosować do fazy siedmiu liści właściwych rzepaku (BBCH 17).
		Butisan Mix	dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 333 g/l (29,5 %), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 168 g/l (14,8 %)	K3, O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Butisan Pro	dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 333 g/l (29,5 %), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 167 g/l (14,8 %)	K3, O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	
		Clentiga	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 250 g/l (22,62%) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 12,5 g/l (1,13 %)	O, B	Nalistne	1,0 l. + Dash HC 1,0 l.	1	ND	Środek stosować z adiuwantem Dash HC w dawce 1,0 l/ha. Stosować tylko w odmianach rzepaku niewrażliwych na imazamoks
		Ei Camino 30 SL	aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 30 g/l (2,94%)	O	Doglebowe/ Nalistne	0,2-0,267 l.	1	ND	
		Orson 30 SL	aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 30 g/l (2,94%)	O	Doglebowe/ Nalistne	0,2-0,267 l.	1	ND	
		Runway	aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 30 g/l (2,95%)	O	Doglebowe/ Nalistne	0,267 l.	1	ND	
		Solaris	dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 333 g/l (29,5 %), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 167 g/l (14,8 %)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cleravo Flex	aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pikolinowego) - 4,0 g/l (0,37 %) chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 125 g/l (11,44 %) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 12,5 g/l (1,14 %)	O, O, B	Doglebowe/ Nalistne	1,4-2,0 l.	1	ND	Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornego na imazamoks (technologia Clearfield, odmiany z oznaczeniem CL w nazwie odmiany).
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-19 (rzepak od fazy liści do 9 liści właściwych)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Metropolitan	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,49 %)	K3	Doglebowe/ Nalistne	1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-30 (od fazy gdy liście ułożone horyzontalnie: widoczny jest pierwszy liść właściwy (wielkości łebka od szpilki) do początku zakrywania międzyrzędzi: liście pokrywają 10% powierzchni gleby)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	EtaDim	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 240 g/l (25,15%)	A	Nalistne	0,5 l.	1	ND	
		Juniper Max 240 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 240 g/l (25,15%)	A	Nalistne	0,5 l.	1	ND	
		V-Dim 240 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 240 g/l (25,15%)	A	Nalistne	0,5 l.	1	ND	
		VextaDim 240 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 240 g/l (25,15%)	A	Nalistne	0,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 10-39 (od fazy całkowicie rozwiniętych liści do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęził rzepaku)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Achiba 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,22%)	A	Nalistne	2,5 l.	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu
		Buster Twist 050 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,22 %)	A	Nalistne	2,5 l.	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.
		Fitofop	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,22%)	A	Nalistne	2,5 l.	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu
		Jenot Twist 050 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,22 %)	A	Nalistne	2,5 l.	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.
		Kulisa	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,22%)	A	Nalistne	2,5 l.	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu

		Maceta 50	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g/l (5,22%)	A	Nalistne	0,35 - 2,5 l.	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu
		Pilot 10 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) 100 g/l (9,8%)	A	Nalistne	0,5-1,25 l.	1	90	
		Targa Flo	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) 100 g/l (9,8%)	A	Nalistne	0,5-1,25 l.	1	90	
		Targa Max 10 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) (9,8%)	A	Nalistne	0,5 - 1,25 l.	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu
		Targa Super 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g/l (5,22%)	A	Nalistne	2,5 l.	1	90	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-12 (rzepak w fazie do 2 liści właściwych)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Effendi 500 SC	metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,3%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Hiperkan 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,3%)	K3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	
		Metkan 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,3%)	K3	Doglebowe	2,0 l.	1	ND	
		Naspar 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Parzan 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Raper 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Rapsan 500 SC	metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Doglebowe	2 l.	1	ND	
		Rexxan SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cleravis 492,5 SC + Dash HC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 375 g/l (32,5%) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,7%) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 17,5 g/l (1,5%) + adiuwant	K3, O, B	Nalistne	1,5 + 1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-13 (rzepak w fazie od 1 do 3 liści)									
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Kliper	metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,36%), aminopyralid (substancja z grupy pochodnych pirydyny) – 5,3 g/l (0,46%), pikloram (substancja z grupy pochodnych pirydyny) – 13,3 g/l (1,15%)	K3, O, O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	Rośliny rzepaku poddane zabiegowi muszą mieć przynajmniej w pełni rozwinięte dwa liście.
		Patos	metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,36%), aminopyralid (substancja z grupy pochodnych pirydyny) – 5,3 g/l (0,46%), pikloram (substancja z grupy pochodnych pirydyny) – 13,3 g/l (1,15%)	K3, O, O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	Rośliny rzepaku poddane zabiegowi muszą mieć przynajmniej w pełni rozwinięte dwa liście.
		Spark	metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l (43,36%), aminopyralid (substancja z grupy pochodnych pirydyny) – 5,3 g/l (0,46%), pikloram (substancja z grupy pochodnych pirydyny) – 13,3 g/l (1,15%)	K3, O, O	Nalistne	1,5 l.	1	ND	Rośliny rzepaku poddane zabiegowi muszą mieć przynajmniej w pełni rozwinięte dwa liście.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 11-14 (od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia)									
Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Macho 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	Łącznie z Comandor 480 EC, Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha Rapex 500 SC + 0,2 l/ha Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC.
		Metaz 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		MET-NEX 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	Łącznie z Comandor 480 EC, Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha Rapex 500 SC + 0,2 l/ha Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC.
		Rapex 500 SC	metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	Łącznie z Comandor 480 EC, Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha Rapex 500 SC + 0,2 l/ha Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC.
		Znachor 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	Łącznie z Comandor 480 EC, Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha Znachor 500 SC + 0,2 l/ha Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC.

FAZA ROZWOJOWA										
BBCH 12-14 (rzepak w fazie 2 do 4 liści właściwych)										
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bakchus	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Bakchus Plus	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Basetto	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Belkar	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Eliminator	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Helix	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Mozzar	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Optivor	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
		Pifaxen	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopirolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	Ze względu na możliwe objawy fitotoksyczności, należy upewnić się, że 100% roślin rzepaku znajduje się w fazie co najmniej 2 liści właściwych.	
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Esorio 150 EC	fluazyfop-P-butyloowy (związek z grupy kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,75 - 2,0l.	1	90	Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC	
		Balatella Forte 150 EC	fluazyfop-P-butyloowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,63-1,7 l.	1	90		
		Flutax 150 EC	fluazyfop-P-butyloowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,75 - 2,0l.	1	90	Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC	
		Grastop 150 EC	fluazyfop-P-butyloowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,75-2,0 l.	1	90		
		Rento 150 EC	fluazyfop-P-butyloowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,75 - 2,0l.	1	90	Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC	
		Tapani 150 EC	fluazyfop-P-butyloowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,75 - 2,0l.	1	90	Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC	
		Cleravis 492,5 SC + Dash HC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 375 g/l (32,5 %) chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,7 %) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 17,5 g/l (1,5 %) + adiuwant	K3, O, B	Nalistne	1,5-2,0 + 1,0 l.	1	ND	W przypadku występowania maruny bezwonnej, prztyli czepnej, chabra bławatka oraz fiołka polnego stosować wyższą z zalecanych dawek	
FAZA ROZWOJOWA										
Jesień: BBCH 12 - 18 (gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liścico fazy 8 rozwinęły liści)										
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Butisan Duo 400 EC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 200 g/l (18,23 %) dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (18,23 %)	K3, K3	Nalistne	2,0-2,5 l.	1	ND		
		Butisan Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	Środek ochrony Butisan Star 416 SC oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.	
		Meteor Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	3,0 l.	1	ND		
		Merton Star 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Nalistne	3,0 l.	1	ND		
		Onyx Extra	pyrydat (związek z grupy fenylpopyrydazy) – 300 g/l (27,5%) mezotriol (związek z grupy trójketonów) – 90 g/l (8,26%)	C3, F2	Nalistne	1,0 l.	1 lub 2 co 7 dni	ND		

		Permuson 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetonilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	2,5 – 3,0 l.	1	ND	
		Rapsan Plus	metazachlor (związek z grupy chloroacetonilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%)	K3, O	Nalistne	3,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Impesco 416 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetonilidów) – 333 g/l (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g/l (7,4%).	K3, O	Doglebowe/ Nalistne	3,0 l.	1	ND	
		Springbok	metazachlor (związek z grupy chloroacetonilidów) – 200 g/l (18,2 %) dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (18,2 %)	K3, K3	Nalistne	2,0 – 2,5 l.	1	ND	
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Akapit 125 EC	fluazifop-P-butylu (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 125 g/l (13,1%)	A	Nalistne	3,0 l.	1	95	
		Wish Top	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 120 g/l (11,7 %)	A	Nalistne	0,9 – 1,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 12 - 19 (gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liścio fazy 9 liści właściwych)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cardinal	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 10 g/l (1,06%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 48 g/l (5,07%) aminopyralid (substancja z grupy pochodnych kwas pirydynokarboksylowego) – 32 g/l (3,38%)	O, O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	
		Concertus	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 10 g/l (1,06%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 48 g/l (5,07%) aminopyralid (substancja z grupy pochodnych kwas pirydynokarboksylowego) – 32 g/l (3,38%)	O, O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	
		LaDiva	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 10 g/l (1,06%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 48 g/l (5,07%) aminopyralid (substancja z grupy pochodnych kwas pirydynokarboksylowego) – 32 g/l (3,38%)	O, O, O	Nalistne	0,25 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 12 (rzepak w fazie minimum 2 liści)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Agard 100 EC	chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 100 g/l (9,84 %).	A	Nalistne	0,45 - 1,0 l.	1	ND	
		Agaton 100 EC	propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasow arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1	42	Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek AGATON 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Mieszanina środka AGATON 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.
		Alive	propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasow arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,7%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1 lub 2	42	Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha.
		Asfolot 100 EC	propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasow arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1	42	Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Asfolot 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Asfolot 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha.
		Bagira 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 40 g/l (4,38 %)	A	Nalistne	0,6- 2,0l.	1	60	Środek można również stosować wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędu (BBCH 30)
		Camwin 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksenodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Evecafor 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksenodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż

		Frequent	fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) -125 g/l (12,29 %)	A	Nalistne	3,0 l.	1	90	
		Kleto4herbi 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Kletozar 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Klex 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Labrador Pro	chizalofof-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)- 50 g/l (5,42 %).	A	Nalistne	0,75 - 2,0 l.	1	ND	
		Obtemil 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Pantera 040 EC	chizalofof-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 40 g/l (4,38 %)	A	Nalistne	0,6- 2,0l.	1	60	Środek można również stosować wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30)
		Ready	propachizalofof (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,7%)	A	Nalistne	0,5 - 1,5 l.	1	42	Stosować nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) BBCH 30. W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Ready w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Ready 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha. Ready do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
		Sedim 120	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Select Super 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Superic 100 EC	chizalofof-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)- 100 g/l (9,84 %).	A	Nalistne	0,45 - 1,0 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Bantux	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Butisan 400 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Doglebowy	2,5 l.	1	ND	
		Butisan Mono	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 400 g/l (35,4%)	K3	Nalistne	2,5 l.	1	ND	
		Butisan Star Max 500 SE	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 200 g/l (17,5%), dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (17,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 100 g/l (8,8%)	K3, K3, O	Nalistne	2,0-2,5 l.	1	ND	
		Fuego 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (44,36%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Rego 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (44,36%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
		Springbok Duo	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 200 g/l (18,2 %) dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (18,2 %)	K3, K3	Doglebowe/ Nalistne	2,0 - 2,5 l.	1	ND	Stosować do fazy BBCH 18.
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Dakota 500 SC	metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,86%)	K3	Nalistne	2,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-26 (od fazy widocznego drugiego liścia do końca fazy formowania pędów bocznych, widocznych jest 6 pędów bocznych)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Brixton	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 180 g/l (19,27 %)	A	Nalistne	0,5-1,0 l.	1	ND	
		Grasidim	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 180 g/l (19,27 %)	A	Nalistne	0,5-1,0 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-32 (od fazy 2-go liścia właściwego rzepaku do fazy, gdy podczaswzrostu łodygi widoczne są dwa międzywęźla)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Biloxa	chizalofof-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)- 70 g/l (7,4%), kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów)- 140 g/l (14,7%)	A, A	Nalistne	0,25 - 1,0 l.	1	ND	Środek należy stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem olejowym zastosowanym w dawce 1,0 l/ha.
		Focus Ultra 100 EC	cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 100 g/l (10,8%)	A	Nalistne	1,0-5,0 l.	1	35	
		Fotyn 100 EC	cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 100 g/l (10,8%)	A	Nalistne	1,0-5,0 l.	1	35	Zalecany jest do stosowania w terminie jesiennym lub wiosennym zależnie od fazy rozwojowej.
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 13-14 (rzepak w fazie 3-4 liści)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cyklop 334 SL	chlorypyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 267 g/l (22,80%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 67 g/l (5,72 %)	O, O	Nalistne	0,2l.	1 co 3 lata	ND	Można stosować do fazy BBCH 15
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 13-15 (rzepak w fazie 3-5 liści)									

Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Gala 334 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 267 g/l (22,80%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 67 g/l (5,72%)	O, O	Naliczne	0,2 l.	1 co 3 lata	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 13-21 (od fazy 3 liści do rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Pikas 300 SL	pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/1 (25,86%)	O	Naliczne	0,078 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Raldico 300 SL	pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/1 (25,86%)	O	Naliczne	0,078 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Zorro 300 SL	pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/1 (25,86%)	O	Naliczne	0,078 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 13-39 (od fazy 2 liści do fazy krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Darium	chizalofof-p-etylu – (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l (5,5%)	A	Naliczne	0,4-2,5 l.	1	ND	
		Trepach	chizalofof-p-etylu – (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l (5,5%)	A	Naliczne	0,4-2,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 14-15 (gdy rzepak wykształcił co najmniej cztery liście)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Lampart 05 EC	chizalofof-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l (5,4%)	A	Naliczne	0,75-3,0 l.	1	100	W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC.
		Leopard Extra 05 EC	chizalofof-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l (5,4%)	A	Naliczne	0,75-3,0 l.	1	100	W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC.
Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Kasader 400 SC	propyzamid (substancja z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,4%)	K1	Doglebowe/ Naliczne	1,875 l.	1	ND	
		Kaskader Plus	propyzamid (substancja z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,4%)	K1	Doglebowe/ Naliczne	1,875 l.	1	ND	
		Kerb 400 SC	propyzamid (substancja z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,4%)	K1	Doglebowe/ Naliczne	1,875 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 14-16 (rzepak w fazie 4-6 liści)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Cliophar Super	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l	O	Naliczne	0,3-0,4 l.	1	ND	
		Fox 480 SC	bifenoks (substancja z grupy pochodnych eteru binitrofenylowego) - 480 g/l (40,6%)	E	Naliczne	0,6-1,0 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Vivendi 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l	O	Naliczne	0,3-0,4 l.	1	ND	
Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Barclay Propyz SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Naliczne	1,25-2,1 l.	1	ND	
		Ortis 400 SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Naliczne	1,25 – 2,1 l.	1	ND	
		PPZ-400 SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Naliczne	1,25-2,1 l.	1	ND	
		Prince Duo 400 SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Doglebowe/ Naliczne	1,25-2,1 l.	1	ND	
		Barclay Propyz SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Naliczne	1,25-2,1 l.	1	ND	
		Propyzafash SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Naliczne	1,25-2,1 l.	1	ND	
		Turbopropyz SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Naliczne	1,25-2,1 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 14-39 (od fazy 4 liścia do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku , zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Maceta 100	chizalofof-P-etylowy (substancja z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 100 g/l (9,7%)	A	Naliczne	0,35-1,25 l.	90	ND	Nie stosować innego herbicydu w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 15-16 (jesienią w fazie 5-6 liści)									
Chwasty dwuliścienne i samosiewy zbóż,	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Kerb 50 WP	propyzamid (związek z grupy benzonitryli) – 500 g/kg (50%)	K1	Naliczne	1,0-1,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 16-18 (rzepak w fazie 6-8 liści)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedświewnych	Bakchus	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 10 g/l (1,06%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1%)	O, O	Naliczne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną
		Bakchus Plus	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 10 g/l (1,06%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1%)	O, O	Naliczne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną

		Basetto	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopykolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną
		Belkar	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopykolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną
		Eliminator	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopykolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną
		Helix	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopykolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną
		Mozzar	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopykolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną
		Pixafen	halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopykolinowych) - 10 g/l (1,06 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) - 48 g/l (5,1 %)	O, O	Nalistne	0,5 l.	1	ND	Podczas zabiegu należy upewnić się, że chwasty nie są całkowicie zakryte przez roślinę uprawną
FAZA ROZWOJOWA									
Jesień: BBCH 20-21 (od początku rozwoju pędów bocznych do rozwoju pierwszego pędu bocznego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cloe 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l	O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwasty bławatka zaleca się zastosowanie środka Cloe 300 SL łącznie z adiuwantem Asystent +. W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka Cloe 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raidico 300 SL/ Pikas 300 SL.
		Major 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (26,13%)	O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka Major 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raidico 300 SL/ Pikas 300 SL. W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwasty bławatka zaleca się zastosowanie łącznie z adiuwantem Asystent+.
		ProSto 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (26,13%)	O	Nalistne	0,2 l.	1	ND	W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwasty bławatka zaleca się zastosowanie środka Cloe 300 SL łącznie z adiuwantem Asystent +. W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka Cloe 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raidico 300 SL/ Pikas 300 SL.
FAZA ROZWOJOWA									
Zima: (okres spoczynku wegetacyjnego)									
Chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Barclay Propyz SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND	Podczas stosowania środka w dawce 1,25 l/ha chwasty takie jak: samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy są średnio wrażliwe na działanie środka.
		Ortis 400 SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND	
		PPZ-400 SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND	
		Prince Duo 400 SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Doglebowe/ Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND	
		Prince 400 SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND	
		Propystar 400 sc	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND	Podczas stosowania środka w dawce 1,25 l/ha chwasty takie jak: samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy są średnio wrażliwe na działanie środka.
		Propyzafash SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND	
Turbopropyz SC	propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)	K1	Nalistne	1,25-1,875 l.	1	ND			
FAZA ROZWOJOWA									
Wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Clap Forte	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 720 g/kg (72%)	O	Nalistne	0,167 kg.	1	ND	Stosować nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia pąków kwiatowych, tj. do momentu, gdy zamknięte pąki kwiatowe na pedzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści (do BBCH 50).
		Faworyt 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (25,82%)	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	Stosować nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
		GramiGuard	kletodym (związek z grupy cykloheksenodionów) - 120 g/l (13,0%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Stosować nie później niż do początku wybierania w pędy kwiatowe (BBCH 30). Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych i samosiewów zbóż
		Lontrol 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	Stosować nie później niż do rozpoczęcia tworzenia pąków kwiatowych.
		Major 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (26,13%)	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	Stosować nie później niż do rozpoczęcia tworzenia pąków kwiatowych. W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie ze środkiem Zorro 300 SL/Raidico 300 SL/ Pikas 300 SL.
		Pikas 300 SL	pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/l (25,86%)	O	Nalistne	0,078 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.

		ProSto 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (26,13%)	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	W celu podniesienia skuteczności zaleca się zastosowanie środka Prosto 300 SL łącznie ze środkiem Zorro 300 SL/Raldico 300 SL/ Pikas 300 SL.
		Raldico 300 SL	pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/l (25,86%)	O	Nalistne	0,078 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Vivendi 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	Stosować nie później niż do rozpoczęcia tworzenia pąków kwiatowych.
		Zorro 300 SL	pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/l (25,86%)	O	Nalistne	0,078 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
FAZA ROZWOJOWA									
Wiosna: BBCH Rw-21 (nie później niż do początku rozwoju pędów bocznych)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Lampart 05 EC	chizalofof-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l (5,4%)	A	Nalistne	0,75-3,0 l.	1	100	W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środków można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC.
		Leopard Extra 05 EC	chizalofof-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l (5,4%)	A	Nalistne	0,75-3,0 l.	1	100	W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środków można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC.
FAZA ROZWOJOWA									
Wiosna: BBCH Rw-51 (po ruszeniu vegetacji do wytworzenia pędu z zaczątkami kwiatów)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Clap	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 300 g/l (26,27%)	O	Nalistne	0,4 l.	1	ND	
		Cloe 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	Możliwość łącznego stosowania z innymi herbicydami - szczegółowe zalecenia w etykiecie.
		Cliphar Super	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300 g/l	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	Stosować nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
		Curlew 334 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 267 g/l (22,86 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 67 g/l (5,74 %)	O, O	Nalistne	0,35 l.	1	ND	
		Galera 334 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 267 g/l (22,86 %) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 67 g/l (5,74 %)	O, O	Nalistne	0,35 l.	1	ND	Opryskiwać do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach (BBCH 50)
		Helion 300 SL	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300 g/l (25,8%)	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	Opryskiwać do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach (BBCH 50)
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 12-31 (od fazy drugiego liścia do momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Kleo 240 EC	kietodym (związek z grupy cykloheksenodionów) - 240 g/L (24,11%)	A	Nalistne	0,5 l.	1	ND	W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek stosować w dawce 0,5 l łącznie z adiuwantem Partner+
		Logik 240 EC	kietodym (związek z grupy cykloheksenodionów) - 240 g/L (24,11%)	A	Nalistne	0,5 l.	1	ND	W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek stosować w dawce 0,5 l łącznie z adiuwantem Partner+
FAZA ROZWOJOWA									
Wiosna: BBCH 12-35 (od fazy 2-go liścia do fazy 5-go międzywęźla)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Akapit 125 EC	fluazyfop-P-butylu (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 125 g/l (13,1%)	A	Nalistne	3,0 l.	1	95	
FAZA ROZWOJOWA									
Wiosna: BBCH 12-50 (nie później niż na początku strzelania rzepaku w pędy)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Balatella Forte 150 EC	fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,63-1,7 l.	1	90	
		Frequent	fluazyfop-p-butylowy(związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) -125 g/l (12,29 %)	A	Nalistne	2,0 - 3,0 l.	1	90	
		Privium 125 EC	fluazyfop-p-butylowy(związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) -125 g/l (13,3 %)	A	Nalistne	0,75 - 2,0 l.	1	90	
FAZA ROZWOJOWA									
Wiosna: BBCH 13-39 (od fazy 2 liści do fazy krzewienia)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Zamzar	chizalofof-p-etylu - (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g/l (5,5%)	A	Nalistne	0,4 - 2,5 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 19-31 (wiosną od fazy 9 liści do fazy widocznego pierwszego międzywęźla)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Barka 334 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 267 g/l (22,80%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 67 g/l (5,72 %)	O, O	Nalistne	0,25-0,35 l.	1	ND	
		Cyklop 334 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 267 g/l (22,80%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 67 g/l (5,72 %)	O, O	Nalistne	0,25-0,35 l.	1	ND	
		Gala 334 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 267 g/l (22,80%) pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 67 g/l (5,72 %)	O, O	Nalistne	0,25-0,35 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									

BBCH 20-50 (wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Chaco	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 267 g/l (22,86%) pikloram (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 67 g/l (5,74%)	O, O	Nalistne	0,35 l.	1	60	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 33 (wiosną, od początku wydłużania pędu, brak międzywęźli („rozeta”) do widocznych 3 międzywęźli)									
Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Superic 100 EC	chizalofo-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)- 100 g/l (9,84 %).	A	Nalistne	0,45 - 1,0 l.	1	ND	
		Agard 100 EC	chizalofo-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)- 100 g/l (9,84 %).	A	Nalistne	0,45 - 1,0 l.	1	75	
Chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cleravo Flex	aminopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu pikolinowego) – 4,0 g/l (0,37 %) chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 125 g/l (11,44 %) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 12,5 g/l (1,14 %)	O, O, B	Dogłębowe/ Nalistne	1,4-2,0 l.	1	ND	Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornego na imazamoks (technologia Clearfield, odmiany z oznaczeniem CL w nazwie odmiany).
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 30-39 (wiosną od fazy rozety do końca fazy wydłużania pędu głównego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Cleravo 285 SC + Dash HC	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego) - 250 g/l (22,6%) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 35 g/l (3,16%) + adiuwant	O, B	Nalistne	1,0 + 1,0 l.	1	ND	Nie stosować środków zawierających substancję czynną chinomerak częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
		Cleversia 285 SC + Dash HC	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego) - 250 g/l (22,6%) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 35 g/l (3,16%) + adiuwant	O, B	Nalistne	1,0 + 1,0 l.	1	ND	Nie stosować środków zawierających substancję czynną chinomerak częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 30-50 (od fazy rozety do końca fazy wydłużania pędu głównego)									
Chwasty dwuliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Auksendy 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (25,82%)	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	
		Concerto	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%) halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylofikolinowych) – 5 g/l (0,51%)	O, O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Clientiga	chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 250 g/l (22,62%) imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 12,5 g/l (1,13 %)	O, B	Nalistne	1,0 l. + Dash HC 1,0 l.	1	ND	Środek stosować z adiuwantem Dash HC w dawce 1,0 l/ha. Stosować tylko w odmianach rzepaku niewrażliwych na imazamoks
		Cliphar Super	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (26,09%)	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	
		Concerto	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%) halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylofikolinowych) – 5 g/l (0,51%)	O, O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Filed 1	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%) halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylofikolinowych) – 5 g/l (0,51%)	O, O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Korvetto	chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%) halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylofikolinowych) – 5 g/l (0,51%)	O, O	Nalistne	1,0 l.	1	ND	
		Vivendi 300 SL	chloryralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l (26,09%)	O	Nalistne	0,3-0,4 l.	1	ND	
FAZA ROZWOJOWA									
BBCH 85-87 (50-70% luszczyn dojrzeła, a nasiona są brązowe i twarde)									
Desykacja i jednoczesne niszczenie chwastów	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedsiewnych	Ardee Super 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Asmara	pyraflufen etylowy 10,6 g/l (1,11%)	E	Nalistne	2,0 l.	1	14	Desykacja
		Avans Premium 360 SL	glifosat (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 360 g/l (27,9%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	ND	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Barclay Barbarian Super 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Barclay Barbarian Xtra 450 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistne	2,4-3,2 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Barclay Gallup Super 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Barclay Gallup Xtra 450 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistne	2,4-3,2 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Boom Efekt 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.

		Cayenne HL 480 SL	glifosat w postaci soli dimetyloamoniowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 480 g/l (39,28%)	G	Nalistne	3,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Dominator Clean 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Dominator Green 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,4%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Dominator HL 480 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 480 g/l (39,28%)	G	Nalistne	2,25-3,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Gallup Premium 360	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Gallup Special 360	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Gallup TF 360	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Glytflash Super 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	ND	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Glyphoflash Xtra 450 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistne	2,4-3,2 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Glyphomax Clean 360 SL	glifosat w formie soli izopropylaminowej - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Highland HL 480 SL	glifosat - (związek z grupy aminofosfonianów, w postaci solizopropylaminowej) – 480g/l (39,28%)	G	Nalistne	2,25 - 3,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Klinik Free 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,56%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Klinik Up 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	
		Klinik Up Trans 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	
		Koyote 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Landmaster Clean 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Monosate G	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Rosate Clean 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (47,22%)	G	Nalistne	3-4 l.	1	ND	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Roundup 360 Plus	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 360 g/l (28,77%)	G	Nalistne	1,875-4,0 l.	1	ND	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Roundup Active 360	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (28,5%)	G	Nalistne	2,7-4,0 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Roundup Trans Energy 450 SL	glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 450 g/l (34,5%)	G	Nalistne	1,5-3,2 l.	1	7	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Sner SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Tartan Super 360 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,77%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Touchdown Premium 360 SL	glifosat (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 360 g/l (27,9%)	G	Nalistne	3,0-4,0 l.	1	ND	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Trustee Hi-Aktiv SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 490 g/l (40,0%)	G	Nalistne	2,2-2,9 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.
		Trustee Xtra 450 SL	glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 450 g/l (37,00%)	G	Nalistne	2,4-3,2 l.	1	14	Nie stosować na plantacjach nasiennych.

FAZA ROZWOJOWA

GRAMINICYDY

Jesienią od fazy 2 liści lub wiosną do momentu siedzącego pąka kwiatowego

Chwasty jednoliścienne	Prawidłowe wykonanie zabiegów przedwiosennych	Achiba 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) 50 g/l (5,22 %)	A	Nalistne	0,75 -2,5 l.	1	90	Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liści do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39),
		Agil S 100 EC	propachizalof (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1 lub 2 (dawki dzielone)	90	Można stosować w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
		Aria 100 EC	propachizalof (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5 - 0,7 l.	1 lub 2 (dawki dzielone)	42	W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Aria 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
		Axton 100 EC	cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 100 g/l (10,8%)	A	Nalistne	1,0-5,0 l.	1	35	W rzepaku ozimym środek zalecany jest do stosowania w terminie jesiennym lub wiosennym zależnie od fazy rozwojowej.
		Bocaro	cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 100 g/l (10,8%)	A	Nalistne	1,0-5,0 l.	1	35	W rzepaku ozimym środek zalecany jest do stosowania w terminie jesiennym lub wiosennym zależnie od fazy rozwojowej.
		Buster 100 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 100 g/l (10,1%)	A	Nalistne	0,3-0,5 l.	1	90	Aby zwiększyć skuteczność środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+ w dawkach: Buster 100 EC 0,3 l/ha + Partner+ 0,7 l/ha.
		Cabramata 100 EC	propachizalof (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1	42	Można stosować w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych
		Centurion Plus 120 EC	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów jednorocznych.
		Demetris 100 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 100 g/l (9,84%)	A	Nalistne	0,45 – 1,0 l.	1	75	Wiosną stosować do widocznych 3 międzywęźli (BBCH 33)

Digator 100 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 100 g/l (9,84%)	A	Nalistne	0,45 – 1,0 l.	1	75	Wiosną stosować do widocznych 3 międzywęźli (BBCH 33)
Elegant 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)	A	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	77	Wiosną zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
Fortune	fluazyfop-P-butyłowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,63-1,7 l.	1	90	
Foster Forte 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,63-1,7 l.	1	90	
Fusilade Forte 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)	A	Nalistne	0,63-1,7 l.	1	90	
Graminis 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)	A	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	77	Wiosną zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
Grasser 100 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 100 g/l (9,84%)	A	Nalistne	0,45 – 1,0 l.	1	75	Wiosną zabieg od początku wydłużania pędu, brak międzywęźli („rozeta”) do widocznych 3 międzywęźli (BBCH 33).
Hitro 100 EC	propachizalof (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1 lub 2 (dawki dzielone)	90	Można stosować w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
Investo 100 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 100 g/l (10,1%)	A	Nalistne	0,3-0,5 l.	1	90	Wiosną środek stosować po ruszeniu wegetacji od początku wydłużania pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30-32). Aby zwiększyć skuteczność środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+.
Jenot 100 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 100 g/l (10,1%)	A	Nalistne	0,3-0,5 l.	1	90	Wiosną środek stosować po ruszeniu wegetacji od początku wydłużania pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla (BBCH 30-32). Aby zwiększyć skuteczność środka zaleca się stosowanie łącznie z adiuwantem Partner+.
Kalamos 100 EC	propachizalof (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1	42	Można stosować w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych
Labrador 05 CE	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)	A	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	77	
Labrador Extra 50 EC	chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) (5,42 %)	A	Nalistne	0,75 - 2,0 l.	1	60	
Labrador Pro	chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)- 50 g/l (5,42 %)	A	Nalistne	0,75 - 2,0 l.	1	60	
Lampart 05 EC	chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,4%)	A	Nalistne	0,75-3,0 l.	1	100	
Panarex 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 40 g/l (4,38 %)	A	Nalistne	0,6- 2,0l.	1	60	Środek stosować nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30)
Pantera 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 40 g/l (4,38 %)	A	Nalistne	0,6- 2,0l.	1	60	Środek stosować nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30)
Pilot Max 10 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 100 g/l (9,79 %)	A	Nalistne	0,35-1,5 l.	1	90	Wiosną stosować nie później niż do fazy gdy na pędzie głównym widocznych jest 5 międzywęźli (BBCH 11-35).
Rango 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 40 g/l (4,38 %)	A	Nalistne	0,6- 2,0l.	1	60	Środek stosować nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30)
Profop 100 EC	propachizalof (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1	42	W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC
Quick 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)	A	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	77	Wiosną zabieg wykonać po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
Sasmi	kietodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	
Sedim 120	kietodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13%)	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	
Superb 100 EC	chizalofop-P-etylowy (chizalofop-P w formie estru etylowego) (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) –108 g/l (10,6%)	A	Nalistne	0,45 – 1,0 l.	1	75	Wiosną stosować do widocznych 3 międzywęźli (BBCH 33)
Superic 100 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 100 g/l (9,84%)	A	Nalistne	0,45 – 1,0 l.	1	75	
Supero 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)	A	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	77	Wiosną zabieg wykonać nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
Szogun 10 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 100 g/l (9,79 %)	A	Nalistne	0,35-1,5 l.	1	90	Wiosną stosować nie później niż do fazy gdy na pędzie głównym widocznych jest 5 międzywęźli (BBCH 11-35).
Targa 10 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 100 g/l (9,79 %)	A	Nalistne	0,35-1,5 l.	2, odstępow między zabiegami: co najmniej 15-21 dni	90	

	Taurus 05 EC	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)	A	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	77	Wiosną zabieg wykonać po ruszeniu roślinności ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
	Trawers	chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)	A	Nalistne	1,0-1,5 l.	1	77	Wiosną zabieg wykonać po ruszeniu roślinności ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).
	Triviko	fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 125 g/l (13,3%)	A	Nalistne	0,5-3,0 l.	1	90	
	Vannes	kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 120 g/l (13%).	A	Nalistne	0,8 l.	1	120	
	Vima-Propachizafop	propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5 - 1,5 l.	1	42	Można stosować w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
	Wizjer 50 EC	chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu (5,42 %)	A	Nalistne	0,75 - 2,0 l.	1	60	Można również stosować wiosną, po ruszeniu roślinności, ale nie później niż do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (do BBCH 50).
	Vergil 100 EC	propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,5-1,5 l.	1	42	Można stosować w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC. Do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych
	Zetrola 100 EC	propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) -100 g/l (9,61%)	A	Nalistne	0,6 l.	1	42	Wiosną stosować nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). Można stosować w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna / klasyfikacja (FRAC)	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni) j - jesień w - wiosna	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
PRZED SIEWEM									
Zgnilizna twardzikowa (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.	Xilon	Trichoderma asperellum szczep T34	metoda biologiczna	zapobiegawczo, chroni rośliny uprawne przed patogenami glebowym	10 kg/ha	1	ND	Stosować zapobiegawczo w trakcie siewu (BBCH 00)
		Lalstop Contans WG	grzyb - <i>Coniothyrium minitans</i>	metoda biologiczna	zapobiegawczo, powoduje wyniszczenie sklerocjów	2,0 kg/ha	1	ND	Stosować przed siewem rzepaku ozimego. Po opryskaniu chronionej powierzchni, glebę wymieszać na głębokość 5-10 cm.
Sucha zgnilizna kapustnych (<i>Leptosphaeria</i> spp., anamorfia: <i>Phoma lingam</i>)	Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.	Integral Pro	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600	metoda biologiczna	wglebny i układowy, do zaprawiania nasion	160 ml/100 kg	1	ND	Środek ogranicza szkodliwość pchełki rzepakowej i pchełki ziemnej.
		Scenic Gold	fluopikolid (200 g/l) + fluoksastrobina (150 g/l)	benzamidy (B5) + strobiluryny (C3)	wglebny i układowy, do zaprawiania nasion	1 l/100 kg	1		Termin zużycia 15.06.2026
Zgorzel siewek rzepaku (<i>Giberella</i> sp., - <i>Fusarium</i> spp.; <i>Thanatephorus cucumeris</i> - <i>Rhizoctonia solani</i> ; <i>Lewia</i> spp. - <i>Alternaria</i> spp.; <i>Pythium</i> spp.)		Scenic Gold	fluopikolid (200 g/l) + fluoksastrobina (150 g/l)	benzamidy (B5) + strobiluryny (C3)	wglebny i układowy, do zaprawiania nasion	1 l/100 kg	1		Termin zużycia 15.06.2026
FAZA 4-8 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 14-18)									
Zgnilizna twardzikowa (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.	Polygreen Fungicyde WP	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawczo, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12).
		Green Doctor OD	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawczo, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12).
		Polyversum OD	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawczo, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Stosować w fazie BBCH 30-40 oraz w fazie BBCH 40-65.

<p>Sucha zgnilizna kapustnych (<i>Leptosphaeria</i> spp., anamorfia: <i>Phoma lingam</i>)</p> <p>Orientacyjny próg szkodliwości: 10–20% roślin z pierwszymi objawami porażenia</p>	<p>Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.</p>	Polygreen Fungicide WP	oospory <i>Pythium oigandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów.	0,1 kg/ha	3/14		Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12).
		Acador	piraklostrobina (100g/l) chloromekwatu chlorek (150g/l) proheksadion wapnia (25g/l)	strobiluryny (C3) piperydyny cykloheksanodiony	działanie systemiczne i translaminarne przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 - 2,0 l/ha / 1,0 l/ha	1 lub 2/14		Stosować od fazy 3 liści rzepaku do końca fazy formowania rozety (BBCH 13-20). Dla zwiększenia skuteczności stosować z kondycjonerem w dawce: 1,0 - 2,0 l/ha środka Architect + 0,375 - 0,75 kg/ha produktu Turbo
		Albion 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Anistro 400 SC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Amistar Gold Max	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
		Angle	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
		Aserino	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Aspire	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		AsPik R 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
		Artemid	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Azoscan 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azoxymoc 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21			
Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21			

Basior 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy sześciu liści do fazy złotego pąka (BBCH 16-59).
Bicanta	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
Bismetic	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
Bontoc	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	2/14		
Bogota 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Cactai	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Cantus	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	2/14		
Capartis	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamid (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		
Capetus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capsolis	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Caramba 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Carcamo 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mentor	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/jw.		
Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sirocco	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2		

Caryx 240 SL	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny- penlametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	1,0 l/ha	2		
Clayton Proteb 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Clayton Tote 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Clayton Tebucon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Clornson	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować (jesienią)–w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)
Colverado 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Congo 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować od fazy trzeciego liścia właściwego do fazy dziewięciu lub więcej liści rzepaku (BBCH 13-19)
Corinth 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dąb 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Denver 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Domnic 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Duram 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu
Durango 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu
Ecolia	difekonazol (125 g/l) protiokonazol (175 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,8 – 1,0 l/ha	1		
Eduction	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
ERA	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Judym 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1- 2/90	56	
General 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/21		
Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	

Fidavio	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2 – 0,5 kg/ha	2/14		
Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Fordeh 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		
Erasmus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	35	
Floryda 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/21		
FusaStar	difekonazol (125 g/l) protiokonazol (175 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 – 1,0 l/ha	1		
Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5–0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Hades 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Helicur 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5–0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Horizon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kallarat 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kanonik 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Kosa 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Legend 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Maganic	difekonazol (125 g/l) protiokonazol (175 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 – 1,0 l/ha	1		
Magnello 350 EC	difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8 l/ha	2/90		
Martiste 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Maxior	difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8 l/ha	2/90		
Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metkon 100 SL	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; wykazuje średni poziom zwalczania; stosować w mieszaninie ze środkami Porter 250 EC lub Dafne 250 EC

Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mezzuri 100 SL	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; wykazuje średni poziom zwalczania; można stosować w mieszaninie ze środkami Porter 250 EC lub Dafne 250 EC
Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Missisipi 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1		
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Orius 200 EW	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,875 l/ha	1	56	Stosowanie może przyczynić się do polepszenia przetrzymywania plantacji oraz zmniejszenia zagrożenia wylegnięciem.
Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Pabi 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/jw	56	
Patel 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	Stosować od fazy 6 liści do fazy 9 liści rzepaku (BBCH 16-19),
Pecari 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2	56	
Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Podstawa 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Polsimo	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,5 kg/ha	1		
Poleposition 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/jw	56	
Procer 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Promino 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Protarion 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	56	
Protaris 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	1	56	
Protebul 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Pro-Protio	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	

Phabia	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Powerdrive	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Protendo 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Podstawa 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3–0,6 l/ha	2/jw	56	Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
Quadris Gold	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
Revyvit	mefentriflukonazol (75 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1		
Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Passivo	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		Zwalcza białą plamistość liści.
Rocky	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		Zwalcza białą plamistość liści.
Suprax	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		Wpływa na regulację wzrostu, przeciwdziała wyleganiu, zwalcza białą plamistość liści.
Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Łan 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tartaros	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/86	56	
Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tauron 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tazer Pro 300 SC	protriokonazol (200 g/l), azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (C1)	o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0-1,2 l/ha	1	56	Stosować od fazy 4 liścia do fazy 8 liścia (BBCH 14-18). Środek wykazuje średni poziom skuteczności.
Tebaro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebkin 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebucur	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	
Tebu-Pro	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	

		Tebu 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebuprotrin 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebusha 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	
		Teodor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Tilmor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tobias-Pro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Jesienią stosować w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18)
		Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toper	difekonazol (125 g/l) protiokonazol (175 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,8 – 1,0 l/ha	1		
		Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	
		Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	
		Toprex 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		
		Topoxar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Trion 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Trident 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		
		Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Wadera 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować w fazie 6-9 liści (BBCH 16-19).
		X-Met 100 SL	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,4 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; wykazuje średni poziom zwalczania; można stosować w mieszaninie ze środkami Porter 250 EC lub Dafne 250 EC
		X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Czerń krzyżowych (<i>Lewia</i> spp., anamorfa: <i>Alternaria</i> spp.)	Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej	Albion 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

<p>Orientacyjny próg szkodliwości: 20–30% roślin z pierwszymi objawami porażenia</p>	<p>sąsiednim polu nie częściej, niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.</p>	<p>Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC</p>	<p>tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,4 l/ha + 0,3 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>68</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC</p>	<p>tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,4 l/ha + 0,3 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>68</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Aserino</p>	<p>metkonazol (60 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego</p>	<p>0,7–1,0 l/ha</p>	<p>2/21</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Aspire</p>	<p>metkonazol (60 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego</p>	<p>0,7–1,0 l/ha</p>	<p>2/21</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Artemid</p>	<p>protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,75 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Bogota 240 EC</p>	<p>protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,75 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Bounty 430 SC</p>	<p>tebukonazol (430 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,45 l/ha</p>	<p>2/14</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Bukat 500 SC + Porter 250 EC</p>	<p>tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,4 l/ha + 0,3 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>68</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Bukat 500 SC + Dafne 250 EC</p>	<p>tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,4 l/ha + 0,3 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>68</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Brelyco</p>	<p>mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)</p>	<p>triazole (G1), karboksamid (C2),</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>1,0 l/ha</p>	<p>1</p>	<p>Sredni poziom zwalczania; stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).</p>	
		<p>Revydas</p>	<p>mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)</p>	<p>triazole (G1), karboksamid (C2),</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>1,0 l/ha</p>	<p>1</p>	<p>Sredni poziom zwalczania; stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).</p>	
		<p>Cambio</p>	<p>metkonazol (60 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego</p>	<p>0,7–1,0 l/ha</p>	<p>2/21</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Capetus 250 EW</p>	<p>tebukonazol (250 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,5 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>35</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Capsolis</p>	<p>metkonazol (60 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego</p>	<p>0,7–1,0 l/ha</p>	<p>2/21</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
		<p>Caramba 60</p>	<p>metkonazol (60 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego</p>	<p>0,7–1,0 l/ha</p>	<p>2/21</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>
<p>Carcamo 240 EC</p>	<p>protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)</p>	<p>triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego</p>	<p>0,75 l/ha</p>	<p>2/jw</p>	<p>56</p>	<p>Stosować w temperaturze powyżej 12°C.</p>		
<p>Caryx 240 SL</p>	<p>chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)</p>	<p>piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)</p>	<p>układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego</p>	<p>1,0 l/ha</p>	<p>2</p>				

Clornson	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować (jesienią)–w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)
Clayton Tebucon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Colverado 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Corinth 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dąb 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Denver 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Domnic 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Eduction	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Fidavio	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2 – 0,5 kg/ha	1		
Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Fordeh 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		
Erasmus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	35	
Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Hades 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Hajduk 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Helicur 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Horizon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Joust 250 EC	protriokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1-2/90	56	
Kallarar 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kosa 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Legend 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mentor	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/jw		Stosować na początku wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).
Martiste 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/w co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Polsimo	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	1		
Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Protebul 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sirocco	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2		
Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Łan 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Łan Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Plus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tauron 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tazer Pro 300 SC	proliokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (C1)	o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0-1,2 l/ha	1	56	Stosować od fazy początku wydłużania się pędu do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69).
Tebaro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebkin 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebucur	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	
Tebu-Pro	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	
Tebu 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebuprotrin 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebusha 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Teodor 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tilmor 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tobias-Pro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Jesienią stosować w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18)
Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	
Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	
Toprex 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		
Topoxar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Trion 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Trident 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha	2/jw		

		Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/w co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Victosar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,75 l/ha	1	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
<p>Szara pleśń (<i>Botryotinia fuckeliana</i>, anamorta: <i>Botrytis cinerea</i>)</p> <p>Orientacyjny próg szkodliwości: 20–30% roślin z pierwszymi objawami porażenia.</p>	<p>Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata.</p> <p>Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych.</p> <p>Staranna uprawa gleby.</p> <p>Zrównoważone nawożenie.</p> <p>Unikanie uszkodzeń.</p> <p>Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych.</p> <p>Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego.</p> <p>Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.</p>	Aserino	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Aspire	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Capsolis	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Caramba 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Clornson	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować (jesienią) – w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)
		Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
		Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
		Edution	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
		Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.		
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.		
Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.		

		Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,45 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
		Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
		Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Cylindrosporioza (<i>Pyrenopeziza brassicae</i> , anamorf: <i>Cylindrosporium concentricum</i>) Orientacyjny próg szkodliwości: 10–20% roślin z pierwszymi objawami porażenia	j.w.	Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Aserino	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Aspire	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Dafne 250	tebukonazol (500 g/l) +	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capsolis	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Caramba 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Clornson	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować (jesienią)–w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)
Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Eduction	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C;
Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mączniak prawdziwy (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Joust 250 EC	proliokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1-2/90	56	
		Zizan 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Zizan 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mączniak rzekomy (<i>Hyaloperonospora parasitica</i>)		Anistro 400 SC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Capartis	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		
		Corinth 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Shepherd	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		

		Prescot Active	dimoksystrobina (200 g/l), boskalid (200 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych
		Pictor Active	dimoksystrobina (200 g/l), boskalid (200 g/l)	strobiluryny (C3), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1		
		Protebul 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Revyvit	mefentriflukonazol (75 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/14		średni poziom zwalczania choroby
		Tauron 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebuprotrin 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Teodor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tilmor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

FAZA WYDŁUŻANIA PĘDU GŁÓWNEGO (BBCH 31–39)

<p>Sucha zgnilizna kapustnych (<i>Leptosphaeria</i> spp., anamorfa: <i>Phoma lingam</i>)</p> <p>Orientacyjny próg szkodliwości: 10–15% roślin z pierwszymi objawami porażenia</p>	<p>Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.</p>	Polygreen Fungicide WP	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogennych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Stosować w fazie BBCH 30-40 oraz w fazie BBCH 40-65.
		Albion 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Agristar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Amistar Gold Max	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55).
		Angle	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55).
		Architect	piraklostrobina (100g/l) chloromekwatu chlorek (150g/l) proheksadion wapnia (25g/l)	strobiluryny (C3) piperdydy cykloheksanodiony	układowe, do stosowania translaminarne przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 - 2,0 l/ha / 1,0 l/ha	1 lub 2/14		Dla zwiększenia skuteczności stosować z kondycjonerem w dawce: 1,0 - 2,0 l/ha środka Architect + 0,375 - 0,75 kg/ha produktu Turbo
		Aserino	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Aspire	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Avenger 240 SL	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
Artemid	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
AsPik 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
AsPik R 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Azoscian 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azoxymoc 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Stosować od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69)
Basior 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bicanta	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
Bismetic	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57).
Bontoc	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	2/14		Stosować gdy widoczne są pojedyncze (nadal zamknięte) pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do fazy końca kwitnienia (BBCH 55-69).
Bogota 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Boscalix 500 SC	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4-0,5 kg/ha	2/14		
Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Boomerang	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
Bukat 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Buzz Ultra UF	tebukonazol (750 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,33 kg/ha	1		Stosować od fazy tworzenia pędów bocznych (BBCH 20).
Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Cactai	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować od fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capartis	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowe i translaminary, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		
Capetus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Cantus	boskalid (500 g/kg)	karboksyamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57).
Capsolis	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Caramba 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Carcamo 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Duram 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu
Durango 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu
Polsimo	boskalid (500 g/kg)	karboksyamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	1		
Pro-Ceres	boskalid (500 g/kg)	karboksyamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
Rasput	boskalid (500 g/kg)	karboksyamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
Sirocco	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
Caryx 240 SL	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		Stosować na początku wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).
Clayton Tebucon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Colverado 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Corinth 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Środek można stosować do fazy pąkowania (BBCH 55-57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	68	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dafne 250 EC + Bukat 500 SC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 0,25-0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Dafne 250 EC + Ambrossio 500 SC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 0,25-0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Dąb 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Denver 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Środek można stosować do fazy pąkowania (BBCH 57) ; stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Domnic 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dovvo 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1		Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C; zapobiega wyleganiu roślin.
ERA	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować od fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Judym 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować od fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Fidavio	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2 – 0,5 kg/ha	1		
Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Fordeh 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Wykazuje średni poziom zwalczania; stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Erasmus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Grenova	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Hades 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Hajduk 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Helicur 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Horizon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55-57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1-2/90	56	
Kallarar 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kanonik 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kosa 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Legend 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Lipostar 090EC	difenokonazol (90 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,0 l/ha	1		
Locumba	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	2/14		

Magnello 350 EC	difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8 l/ha	2/90		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Marmot	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	2/14		
Martiste 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Maxior	difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8 l/ha	2/90		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mentor	chlerek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2/jw		Stosować na początku wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).
Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metkon 100 SL	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; wykazuje średni poziom zwalczania; można stosować w mieszaninie ze środkami Porter 250 EC lub Dafne 250 EC; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mezzuri 100 SL	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; wykazuje średni poziom zwalczania; można stosować w mieszaninie ze środkami Porter 250 EC lub Dafne 250 EC; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Pabi 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3-0,6 l/ha	2/jw	56	
Pecari 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3-0,6 l/ha	2/jw	56	
Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Podstawa 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Poleposition 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/jw	56	
Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	68	Środek stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Procer 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Promino 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Protebul 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55-57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Protikon 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 l/ha	1	56	
Pro-Protio	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Proviso 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/jw	56	
Quadris Gold	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Revyvit	mefentriflukonazol (75 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1		
Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sheriff 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
Shield 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
Shepherd	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamid (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		
Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Passivo	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Zwalcza białą plamistość liści.
Rocky	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Zwalcza białą plamistość liści.
Suprax	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw		Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51), zwalcza białą plamistość liści.

Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Łan 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Łan Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Plus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tartaros	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/86	56	
Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tauron 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tebaro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	
Tebkin 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	
Tebucur	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
Tebu-Pro	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
Tebu 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebuprotrin 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebusha 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Teodor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tilmor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tobias-Pro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Wiosną stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-55)
Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
Toprex 375 SC	difenokonazol (250 g/l), pakiobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Traper 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	

		Topoxar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
		Trion 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Trident 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw		Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Victosar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		Wiosną stosować od fazy początku wydłużania łodygi do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69)
		Virid 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 l/ha	1	56	
		Wadera 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/jw/86 lub 2/21 w		Stosować do fazy żółtego pąka (BBCH 59). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		X-Met 100 SL	metkonazol (100 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; wykazuje średni poziom zwalczania; można stosować w mieszaniu ze środkami Porter 250 EC lub Dafne 250 EC; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum)		Polygreen Fungicide WP	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Stosować w fazie BBCH 30-40 oraz w fazie BBCH 40-65.
		Green Doctor OD	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12).
		Polyversum OD	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Stosować w fazie BBCH 30-40 oraz w fazie BBCH 40-65.
Czerń krzyżowych (Lewia spp., anamorfa: Alternaria spp.) Orientacyjny próg szkodliwości: 10-20% roślin z pierwszymi objawami porażenia.	Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanych	Albion 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	Środek stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Środek stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Architect	piraklostrobina (100g/l) chloromekwatu chlorek (150g/l) proheksadion wapnia (25g/l)	strobiluryny (C3) piperidydy cykloheksanodiony	działanie systemiczne i translaminarne przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i	1,0 - 2,0 l/ha / 1,0 l/ha	1 lub 2/14		Dla zwiększenia skuteczności stosować z kondycjonerem w dawce: 1,0 - 2,0 l/ha środka Architect + 0,375 - 0,75 kg/ha produktu Turbo

zwanianego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.

Aserino	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Aspire	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Artemid	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Avenger 240 SL	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
Bogota 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	Środek stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw		Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw		Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Boomerang	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capetus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capsolis	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Caramba 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Carcamo 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Mentor	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2/jw		Stosować na początku wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).
Sirocco	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
Caryx 240 SL	chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny-pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		Stosować na początku wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).
Clayton Tebucon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Colverado 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Contra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Corinth 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Środek stosować do fazy pąkowania (BBCH 57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	93	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Dąb 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Denver 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Domnic 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Fidavio	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2 – 0,5 kg/ha	1		
Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Erasmus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Hades 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Hajduk 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Helicur 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Horizon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Joust 250 EC	protriokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1- 2/90	56	
Kier Pro 375	protriokonazol (175 g/l), azoksystrobina (200 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	1,0 l/ha	1	56	Termin zużycia: 31.12.2025; Ogranicza występowanie wertycilozy
Kallarat 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kosa 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Legend 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Martiste 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).

Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Polsimo	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	93	Środek stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Protebul 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy widocznych, nadal zamkniętych, pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sheriff 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
Shield 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Łan 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Tarcza Łan Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tarcza Plus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tauron 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tazer Pro 300 SC	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (C1)	o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0-1,2 l/ha	1	56	Stosować od fazy początku wydłużania się pędu do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69).
Tebaro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	
Tebkin 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	
Tebucur	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
Tebu-Pro	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
Tebu 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebuprotrin 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tebusha 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Teodor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tilmor 240 EC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tobias-Pro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Wiosną stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-55)
Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
Trident 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw		Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Topoxar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	
Trion 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Victosar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.

<p>Szara pleśń (<i>Botrytis fuckeliana</i>, anamorta: <i>Botrytis cinerea</i>)</p> <p>Orientacyjny próg szkodliwości: 10–20% roślin z pierwszymi objawami porażenia.</p>	<p>Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Unikanie uszkodzeń. Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.</p>	Albion 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Aserino	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Aspire	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artemid	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Avenger 240 SL	chlerek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny- pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
		Bogota 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Boomerang	chlerek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny- pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
		Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Capetus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Carcamo 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Capsolis	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Caramba 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mentor	chlerek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny- pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2/jw		Stosować na początku wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).
		Sirocco	chlerek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny- pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		
		Caryx 240 SL	chlerek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l)	piperydyny- pentametylenoiminy, triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0-1,4 l/ha	2		Stosować na początku wydłużania się pędu głównego (BBCH 32-35).
		Clayton Tebucon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	35	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Colverado 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.		
Corinth 240 EC	protriokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Środek stosować do fazy pąkowania (BBCH 57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.		

Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Denver 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Hades 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Horizon 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Kallarad 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Legend 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Martiste 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Protebul 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy widocznych, nadal zamkniętych, pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.

	Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Tauron 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Tebuprotrin 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Tebaro 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	60	
	Teodor 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania (BBCH 57); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Tilmor 240 EC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw	56	Stosować do fazy pąkowania. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
	Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	56	
	Trident 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/jw		Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
	Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.	
Cylindrosporioza (<i>Pyrenopeziza brassicae</i> , anamorfia: <i>Cylindrosporium concentricum</i>) Orientacyjny próg szkodliwości: 10–15% roślin z pierwszymi objawami porażenia.	Ambrossio 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	Środek stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Środek stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
	Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
	Architect	piraklostrobina (100g/l) chloromekwatu chlorek (150g/l) proheksadion wapnia (25g/l)	strobiluryny (C3) piperdydny cykloheksanodiony	działanie systemiczne i translaminarne przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i	1,0 - 2,0 l/ha / 1,0 l/ha	1 lub 2/14		Dla zwiększenia skuteczności stosować z kondycjonerem w dawce: 1,0 - 2,0 l/ha środka Architect + 0,375 - 0,75 kg/ha produktu Turbo
	Aserino	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Aspire	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Bukat 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
	Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).

Cambio	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Capsolis	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Caramba 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Conatra 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Duram 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu
Durango 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu
Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	93	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Driver	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Dovvo 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	1		Wykazuje średni poziom zwalczania choroby; stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C; zapobiega wyleganiu roślin.
Globmet 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	
Farmeno	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Fordeh 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Wykazuje średni poziom zwalczania; stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Mentor 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metcona 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metfin	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Metkon Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).

		Met-Pro	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Metko-Mat 060 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Misha	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Micosar 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C; stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Pamir 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Plexeo 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	68	Środek stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Remocco 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7-1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Passivo	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Wykazuje średni poziom zwalczania choroby, zwalcza białą plamistość liści.
		Rocky	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Wykazuje średni poziom zwalczania choroby, zwalcza białą plamistość liści.
		Suprax	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Wykazuje średni poziom zwalczania choroby, zwalcza białą plamistość liści.
		Sirena 60 EC	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Simveris	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toprex 375 SC	difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35 l/ha	2/jw		Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55).
		Turret 60	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		X-Met Twist 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	56	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Mączniak prawdziwy (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)		Architect	piraklostrobina (100g/l) chloromekwatu chlorek (150g/l) proheksadion wapnia (25g/l)	strobiluryny (C3) piperidyny cykloheksanodiony	translaminarne przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 - 2,0 l/ha / 1,0 l/ha	1 lub 2/14		Dla zwiększenia skuteczności stosować z kondycjonerem w dawce: 1,0 - 2,0 l/ha środka Architect + 0,375 - 0,75 kg/ha produktu Turbo

		Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	68	Stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55); stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dafne 250 EC + Bukat 500 SC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Brelyco	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Średni poziom zwalczania; stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).
		Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1-2/90	56	
		Shield 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
		Sheriff 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
		Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		
		Pictor Revy	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Średni poziom zwalczania; stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).
		Revydas	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Średni poziom zwalczania; stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).
		Dafne 250 EC + Ambrossio 500 SC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	68	Środek stosować do widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 55). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Porter 250 EC + Bukat 500 SC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
		Porter 250 EC + Ambrossio 500 SC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/jw	68	Środek stosować do pojawienia się pąków kwiatowych - fazy zielonego pąka (BBCH 51).
OD FAZY POCZĄTKU KWITNIENIA DO KOŃCA KWITNIENIA (BBCH 61–69)									
Zgnilizna twardzikowa (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Orientacyjny próg szkodliwości: 1% roślin z pierwszymi objawami porażenia	Uprawa rzepaku i innych gatunków z rodziny kapustowatych na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata. Niszczenie i głębokie przyoranie ścierni rzepakowych. Staranna uprawa gleby. Zrównoważone nawożenie. Wybór mniej podatnych odmian i kwalifikowanego materiału siewnego. Siew w optymalnym terminie w zalecanej normie.	Polygreen Fungicyde WP	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Stosować w fazie BBCH 30-40 oraz w fazie BBCH 40-65.
		Green Doctor OD	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Zarejestrowany do stosowania od fazy 2 liści (BBCH 12).
		Polyversum OD	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów	0,1 kg/ha	3/14		Stosować w fazie BBCH 30-40 oraz w fazie BBCH 40-65.
		Rhapsody	<i>Bacillus subtilis</i> szczep QST 713	metoda biologiczna	Zakłócenie rozwoju grzybni	2,0 l/ha	2/5		
		Serenade ASO	<i>Bacillus subtilis</i> szczep QST 713	metoda biologiczna	Zakłócenie rozwoju grzybni	2,0 l/ha	2/5		
		Agristar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	stosować od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69)

Afrodyta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do zwalczania wertycyliozy rzepaku
Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	stosować od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69)
Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Amistar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Amistar Gold Max	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
Angle	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
Anistro 400 SC	proliokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
Astrolab	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
AsPik 250 EC	proliokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
AsPik R 250 EC	proliokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Azaka 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		
Azarius-Pro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azoguard AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoksar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Azoksar QS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoksar Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoxin 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do stosowania od fazy zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 58).
Azoxone 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoxy-Life	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	

Azoxymoc 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Azo-Mat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azuba	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azox 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azonix Pro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Baltazar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Basior Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Bicanta	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
Bismetic	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować od fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57); termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Bodega	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyriszczającego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Stosować od fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69).
Bontoc	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować gdy widoczne są pojedyncze (nadal zamknięte) pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do fazy końca kwitnienia (BBCH 55-69).
Bluna 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Bolid 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do stosowania od fazy zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 58).
Bolid Plus	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Boscalix 500 SC	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4-0,5 kg/ha	2/14		
Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Brelyco	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% łuszczyń osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).
Buzz Ultra UF	tebukonazol (750 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,33 kg/ha	1		Wykazuje średni poziom skuteczności.
Patel 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyriszczającego	0,3-0,6 l/ha	2/86	56	
Polsimo	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
Pro-Ceres	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować gdy widoczne są pojedyncze (nadal zamknięte) pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do fazy końca kwitnienia (BBCH 55-69).

Rasput	boskalid (500 g/kg)	karboksyamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować gdy widoczne są pojedyncze (nadal zamknięte) pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do fazy końca kwitnienia (BBCH 55-69).
Cantus	boskalid (500 g/kg)	karboksyamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować od fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57); termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Capartis	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksyamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51)
Chamane 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Congo 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		Stosować od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 61-69)
Cortina	protiokonazol (400 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,35-0,45 l/ha	1	50	
Gavial 375 SC	protiokonazol (175 g/l), azoksystrobina (200 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Ogranicza występowanie werciliozy
Claro 375 SC	protiokonazol (175 g/l), azoksystrobina (200 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Stosować do fazy- opadania starszych kwiatów (BBCH 59-65); zwalcza werciliozę.
Clayton Augusta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Clayton Proteb 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Środek zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych.
Clayton Tote 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Środek zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych.
Coulomb 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1 l/ha	1	35	
Conclude AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Agrizole XL	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	Stosować od początku fazy kwitnienia do pełni fazy kwitnienia 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych (BBCH 60-65)
Currando	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	Stosować od początku fazy kwitnienia do pełni fazy kwitnienia 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych (BBCH 60-65)
General 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		
Globaltar AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Globdif	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	
Subigon	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	
Custodia 320 SC	azoksystrobina (120 g/l), tebukonazol (200 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
Dakar 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7 l/ha	1		Stosować od fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach do fazy, gdy 30% łuszczyń osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 50-73)
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14	56	

Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Difcor 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	56	
Difo 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	56	
Difosis	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1		Ogranicza występowanie zgnilizny twardzikowej w rzepaku ozimym
Dobromir 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Dobromir Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8l/ha	1	21	
Dobromir Top 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8l/ha	1	21	
Dyllis	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7 l/ha	1	56	
Efilor 193 SC	metkonazol (62 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,67–1,0 l/ha	2/21	42	
Elstrobin 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Elvistar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Emot	metkonazol (62 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,67–1,0 l/ha	2/21	42	
Eraser	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych.
Florian Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1		
Floryda 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		Stosować od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 61-69)
Fungistar	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Evito T	tebukonazol (250 g/l), fluoksastrobina (180 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy I translaminarny, do stosowania interwencyjnego	0,8 l/ha	1	56	
Fidavio	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2 – 0,5 kg/ha	1		
Ferten 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	
Fundand 450 SC	azoksystrobina (200 g/l), tebukonazol (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9-1,0 l/ha	1	68	Środek stosować od fazy pąkowania (BBCH 55).
Erasmus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Gabor 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).

Hill-Star	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	35	
Innox	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7 l/ha	1		Stosować od fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach do fazy, gdy 30% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 50-73)
Philon 250 SC.	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 50-73)
Greenlook 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Grenova	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Graphite	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Hajduk 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Stosować od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
ILA 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Hajmon 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Helicur 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Intuity 250 SC	mandestrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowe i translaminarne, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1		
Ivy	mandestrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowe i translaminarne, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1		
Nabana 250 SC	mandestrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowe i translaminarne, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1		
Nabana Plus	mandestrobina (400 g/l)	strobiluryny (C3)	powierzchniowe i translaminarne, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,5 l/ha	1		Stosować od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69)
Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1-2/90	56	
Kanonik Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Kenja 400 SC	izofetamid (400 g/l)	fenylo-oksoetylotiofenoamid	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego	0,8 l/ha	1		Stosować od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do fazy pełnego kwitnienia (50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają) (BBCH 60-65).
Kryor	izofetamid (400 g/l)	fenylo-oksoetylotiofenoamid	powierzchniowe i układowe, do stosowania zapobiegawczego	0,8 l/ha	1		Stosować od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do fazy pełnego kwitnienia (50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają) (BBCH 60-65).
Kier 450 SC	azoksystrobina (200 g/l), tebukonazol (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9-1,0 l/ha	1	68	Środek stosować od fazy pąkowania (BBCH 55).
Kier Pro 375	protiokonazol (175 g/l), azoksystrobina (200 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Ogranicza występowanie werticilozy
Karpathos 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	

Komiflo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Korazzo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Ksystro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Laiba 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Lerak 200 EC	azoksystrobina (75 g/l) tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,5-2,0 l/ha	1		stosować od fazy żółtego pąka kwiatowego (BBCH 59) do fazy końca kwitnienia rzepaku (BBCH 69)
Lipostar 090EC	difenokonazol (90 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,15 l/ha	1		
Locumba	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
LS-Azoxy	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Latifa 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Makler 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do stosowania od fazy zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 58).
Makler Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Marmot	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
Maxentis	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8-1,0 l/ha	1	42	Stosować od fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają) do fazy, gdy 30% łuszczyń osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 65-73)
Midgard 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75-1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69)
Netrin 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Neodif	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1		Ogranicza występowanie zgnilizny twardzikowej w rzepaku ozimym
Missisipi 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		
Mirador 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Mollis 450 SC	azoksystrobina (200 g/l), tebukonazol (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9-1,0 l/ha	1	68	Środek stosować od fazy pąkowania (BBCH 55).
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	
Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Ortofin	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	

Pabi 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Pabizon 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Panorama	protriokonazol (250 g/l)/metkonazol (90 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	56	Wykazuje średni poziom skuteczności.
Pecari 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Pablo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Piastun 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Pictor Revy	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75)
Prescot Strong	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego kapustnych
Prescot Active	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych
Pictor Active	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Środek stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Prolate	protriokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7 l/ha	1	56	
Poleposition 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Praktis	protriokonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7 l/ha	2/14	56	
Procer Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protriokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Promino Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protriokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Primasol	metkonazol (60 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,67–1,0 l/ha	2/21	42	
Promesa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Tavares 250 SE	fluopyram (125 g/l), protriokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Propulse 250 SE	fluopyram (125 g/l), protriokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Puskas	fluopyram (125 g/l), protriokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Pro-Protio	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	

Phabia	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Powerdrive	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Protendo 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Protikon 250 EC	protriokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 l/ha	1	56	
Protarion 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5–0,6 l/ha	2/21	56	
Protaris 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5–0,6 l/ha	2/21	56	
Proteb 250 EC	protriokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych
Proviso 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Quadris Gold	azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/jw		
Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Revydas	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2),	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
Revyvit	mefentriflukonazol (75 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/14		Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do fazy, gdy 50% łuszczyń osiągnęło typową wielkość (BBCH 57-75).
Rotab 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	35	
Robin 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Olivier	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	1		Stosować od fazy zwanego kwiatostanu (BBCH 55).
Rio 500 SC.	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	1		Stosować od fazy zwanego kwiatostanu (BBCH 55).
Royalty	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	1		Stosować od fazy zwanego kwiatostanu (BBCH 55).
Shepherd	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Środek stosować od fazy zielonego pąka (BBCH 51).
Sinstar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Sinbad	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).

Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Strobe 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71); zwalcza wertyciozę;
Starjet 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Starjet Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Strobin 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Strobin 250-I	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Strobin 250-II	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Supremum	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wniekształcania	0,8-1,0 l/ha	1	42	Stosować od fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty do fazy końca kwitnienia (BBCH 60-69)
Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Tarcza Łan Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Tarcza Plus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tazer Pro 300 SC	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (C1)	o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0-1,2 l/ha	1	56	Stosować od fazy początku wydłużania się pędu do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69).
Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tebu 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Telescope	difenokonazol (100 g/l) metkonazol (54 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/21	56	
Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tobruk EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	56	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14	56	
Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Tores 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).

		Traper 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
		Treso	fludioksonil (500 g/kg)	fenylopirole (E2)	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 g/kg	1		
		Topoxar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
		Trion 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
		Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
		Valor 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	
		Victosar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
		Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyriszczającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		Wiosna stosować od początku fazy kwitnienia – otwarte pierwsze kwiaty (BBCH 60)
		Soratel	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyriszczającego	0,7 l/ha	1		Stosować od fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach do fazy, gdy 30% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 50-73)
		Sting 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyriszczającego	0,7 l/ha	1		Stosować od fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach do fazy, gdy 30% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 50-73)
		Virid 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyriszczającego	0,8 l/ha	1	56	
		Wadera Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
		Wezen 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	
		Zafra AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Zakeo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Zarolis	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
		Zingaro Extra 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Zoxi	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1		
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Czerń krzyżowych (Lewia spp., anamorfia: Alternaria spp.) Orientacyjny próg szkodliwości: 10–15% roślin z pierwszymi objawami porażenia		Agristar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	stosować od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 66-69)
		Afrodyta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do zwalczania werciliozy rzepaku
		Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Stosować od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 66-69)

Astrolab	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Ambrosio 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	Środek zarejestrowany jest również do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych i cylindrosporiozy.
Amistar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Anistro 400 SC	protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/jw	56	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
AsPik 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
AsPik R 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Azaka 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/10		
Azarius-Pro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azoguard AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoksar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Azoksar QS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoksar Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoscán 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
Azoxin 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Azoxone 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoxy-Life	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azoxymoc 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azox 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azonix Pro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azo-Mat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azuba	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	

Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH66-69)
Baltazar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Basior Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (złoty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Bismetic	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować od fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57); termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Bluna 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Bodega	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Stosować od fazy pełni kwitnienia do fazy, gdy 30% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 65-73)
Bolid 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Bolid Plus	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Bukat 500 SC	tebukonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	68	
Cantus	boskalid (500 g/kg)	karboksamid (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		Stosować od fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 57); termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Capartis	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamid (C2), strobiluryny (C3)	układowy i transaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Zarejestrowany jest do zwalczania od fazy zielonego pąka (BBCH 51); termin zabiegu można wydłużyć do momentu, gdy 50% luszczyn osiągnęło dostateczną wielkość (BBCH 75).
Gavial 375 SC	protiokonazol (175 g/l), azoksystrobina (200 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Ogranicza występowanie wertycilozy
Claro 375 SC	protiokonazol (175 g/l), azoksystrobina (200 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69); zwalcza wertycilozę.
Clayton Augusta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Clayton Proteb 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Clayton Tote 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Congo 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		Stosować od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 61-69)
Coulomb 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1 l/ha	1	35	
Conclude AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65); termin zabiegu należy wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Agrizole XL	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	Stosować od początku fazy kwitnienia do pełni fazy kwitnienia 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych (BBCH 60-65)
Currando	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	Stosować od początku fazy kwitnienia do pełni fazy kwitnienia 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych (BBCH 60-65)
General 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		
Globaztar AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	

Globdif	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	
Subigon	difenokonazol (500 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha	1	56	
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14	56	
Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Difcor 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	56	
Difo 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	56	
Dobromir 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Dobromir Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8l/ha	1	21	
Dobromir Top 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8l/ha	1	21	
Eflor 193 SC	metkonazol (62 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,67–1,0 l/ha	2/21	42	
Emot	metkonazol (62 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,67–1,0 l/ha	2/21	42	
Erazer	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych.
Fidavio	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2 – 0,5 kg/ha	1		
Florian Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1		
Floryda 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		Stosować od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 61-69)
Fungistar	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Ferten 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	
Erasmus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	Termin zabiegu można wydużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Gabor 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Graphite	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Grenova	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Hajduk 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Stosować od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Hill-Star	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	35	
ILA 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Hajmon 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).

		Helicur 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
		Joust 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6-0,7 l/ha	(w)1-2/14 (j)1-2/90	56	
		Kanonik Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (zółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
		Kier Pro 375	protiokonazol (175 g/l), azoksystrobina (200 g/l)	triazole (G1), strobiluryny (C3)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Ogranicza występowanie werciliozy
		Karpathos 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1 l/ha	1	21	
		Komiflo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
		Korazzo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
		Ksystro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
		Laiba 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
		LS-Azoxy	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
		Latifa 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
		Makler 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
		Makler Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Maxentis	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8-1,0 l/ha	1	42	Stosować od fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają) do fazy, gdy 30% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 65-73)
		Missisipi 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5-0,6 l/ha	2/21		
		Mirador 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Midgard 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75-1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69)
		Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
		Orius 200 EW	tebukonazol (200 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	1	56	
		Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
		Ortofin	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Pabi 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3-0,6 l/ha	2/86	56	
		Pabizon 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
		Patel 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3-0,6 l/ha	2/86	56	

Pecari 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Pablo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Piastun 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Pictor Revy	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Średni poziom zwalczania; stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).
Philon 250 SC.	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Poleposition 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Polsimo	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2-0,5 kg/ha	2/14		
Procer Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protriokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych platków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Promino Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protriokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych platków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Promesa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Prescot Active	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Srodek zarejestrowany jest do zwalczania od fazy zielonego pąka (BBCH 51); termin zabiegu można wydłużyć do momentu, gdy 50% luszczyn osiągnęło dostateczną wielkość (BBCH 75).
Prescot Strong	mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Wykazuje średni poziom zwalczania; stosować gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do końca fazy, gdy 50% luszczyn osiąga typową wielkość (BBCH 57-75).
Pictor Active	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Srodek zarejestrowany jest do zwalczania od fazy zielonego pąka (BBCH 51); termin zabiegu można wydłużyć do momentu, gdy 50% luszczyn osiągnęło dostateczną wielkość (BBCH 75).
Primasol	metkonazol (60 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,67–1,0 l/ha	2/21	42	
Tavares 250 SE	fluopyram (125 g/l), protriokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Propulse 250 SE	fluopyram (125 g/l), protriokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Puskas	fluopyram (125 g/l), protriokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Pro-Protio	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Phabia	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Powerdrive	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Protendo 300 EC	protriokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Protikon 250 EC	protriokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8 l/ha	1	56	

Protarion 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5–0,6 l/ha	2/21	56	
Protaris 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5–0,6 l/ha	2/21	56	
Proteb 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych
Proviso 300 EC	protiokonazol (300 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,3–0,6 l/ha	2/86	56	
Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Revyvit	mefentriflukonazol (75 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/14		Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe kwiatostanów bocznych do fazy, gdy 50% luszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 57-75).
Rotab 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	35	
Robin 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Olivier	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	1		Stosować od fazy zwanego kwiatostanu (BBCH 55).
Rio 500 SC.	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	1		Stosować od fazy zwanego kwiatostanu (BBCH 55).
Royalty	boskalid (500 g/kg)	karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 kg/ha	1		Stosować od fazy zwanego kwiatostanu (BBCH 55).
Shepherd	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		Środek zarejestrowany jest do zwalczania od fazy zielonego pąka (BBCH 51); termin zabiegu można wydłużyć do momentu, gdy 50% luszczyn osiągnęło dostateczną wielkość (BBCH 75).
Sinstar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Sinbad	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Strobe 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71); zwalcza werciliozę;
Starjet Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Starjet 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych luszczyn (BBCH 71).
Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Strobin 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustnych (BBCH 61-69)
Strobin 250-I	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustnych (BBCH 61-69)
Strobin 250-II	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Środek zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych.
Supremum	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8-1,0 l/ha	1	42	Stosować od fazy pełni kwitnienia do fazy, gdy 30% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 65-73)
Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/w co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Tarcza Łan Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).

Tarcza Plus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66-69)
Tazer Pro 300 SC	protiokonazol (200 g/l) azoksystrobina (150 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0-1,2 l/ha	1	56	Stosować od fazy początku wydłużania się pędu do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69).
Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tebucur	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Tebu-Pro	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Tebu 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	Termin zabiegu można wydużyć do fazy wykształcenia pierwszych kuszczyn (BBCH 71).
TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tobruk EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	56	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14	56	
Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Tores 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	Stosować od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Traper 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Topoxar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Trion 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Valor 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	
Victosar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0-1,25 l/ha	1		Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Soleret 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,6-0,7 l/ha	1-2/14		Wiosną stosować od fazy początku wydłużania lodygi do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69)
Virid 250 EC	protiokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczalającego	0,8 l/ha	1	56	
Wadera Extra 240 EC	azoksystrobina (140 g/l) protiokonazol (100 g/l)	strobiluryny (C3) triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	56	Stosować od pierwszych płatków, pąki kwiatowe są nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy końca kwitnienia (BBCH 59-69)
Wezen 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	74	

		Zafra AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65); termin zabiegu należy wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
		Zakeo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Zarolis	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69)
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Zingaro Extra 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Szara pleśń (Botryotinia fuckelliana, anamorfia: Botrytis cinerea) Orientacyjny próg szkodliwości: 10–15% roślin z pierwszymi objawami porażenia		Agristar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Afrodyta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do zwalczania werciliozy rzepaku
		Agristar BIS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Alissa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Amistar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
		Astrolab	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		AsPik 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
		AsPik R 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
		Azarius-Pro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
		Azbany 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		AzoGuard	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Azoguard AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Azoksar QS 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Azoksar Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Azoscan 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Azoksystrobi 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Azoxone 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Azoxin 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Azoxy-Life	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21			
Azoxymoc 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21			

Azox 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Azonix Pro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Aztek 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Azo-Mat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azuba	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Azyl 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Baltazar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Bolid 250 SE	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Bolid Plus	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Bounty 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Capartis	boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l)	karboksamidy (C2), strobiluryny (C3)	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6-1,0 l/ha	1		
Clayton Augusta 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Clayton Proteb 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Clayton Tote 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
Coulomb 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8-1 l/ha	1	35	
Conclude AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65); termin zabiegu należy wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Darcos 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14	56	
Demeter 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Dobromir 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Dobromir Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8l/ha	1	21	
Dobromir Top 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Efilor 193 SC	metkonazol (62 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,67-1,0 l/ha	2/21	42	
Emot	metkonazol (62 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,67-1,0 l/ha	2/21	42	
Eraser	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany jest do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych.
Florian Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1		

Fungistar	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Fundand 450 SC	azoksystrobina (200 g/l), tebukonazol (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9-1,0 l/ha	1	68	Środek stosować od fazy pąkowania (BBCH 55).
Erasmus 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Furtado 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Gabor 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Globaztar AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Graphite	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Grenova	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).
Helicur 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Kier 450 SC	azoksystrobina (200 g/l), tebukonazol (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9-1,0 l/ha	1	68	Środek stosować od fazy pąkowania (BBCH 55).
Karpathos 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1 l/ha	1	21	
Komiflo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Korazzo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Ksystro 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustych (BBCH 61-69)
Laiba 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
LS-Azoxy	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Latifa 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Makler 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
Makler Plus 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Midgard 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75-1,0 l/ha	1	35	Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69)
Mirador 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Mollis 450 SC	azoksystrobina (200 g/l), tebukonazol (125 g/l), difenokonazol (125 g/l)	strobiluryny (C3), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,9-1,0 l/ha	1	68	Środek stosować od fazy pąkowania (BBCH 55).
Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	
Orius Extra 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Ortofin	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Pabizon 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wglębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).

Pablo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	Termin zabiegu można wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych liuszczyń (BBCH 71).
Philon 250 SC.	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Piastun 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Primasol	metkonazol (60 g/l), boskalid (133 g/l)	triazole (G1), karboksamidy (C2)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,67-1,0 l/ha	2/21	42	
Promesa	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
Proteb 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych
Tavares 250 SE	fluopyram (125 g/l), protiokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Propulse 250 SE	fluopyram (125 g/l), protiokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Puskas	fluopyram (125 g/l), protiokonazol (125 g/l)	karboksamidy (C2), triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 57).
Rezat 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Rotab 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	35	
Robin 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8-1,0 l/ha	1	35	
Spekfree 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Starjet Super 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Starpro 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
Strobin 250	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustnych (BBCH 61-69)
Strobin 250-I	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustnych (BBCH 61-69)
Strobin 250-II	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Zwalcza suchą zgniliznę kapustnych (BBCH 61-69)
Syrius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Tascom 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tazer 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
Tebucur	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Tebu-Pro	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
Tebu 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
TebuGuard Plus	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	

		Tiger 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	
		Toledo 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14	56	
		Toledo Extra 430 SC	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
		Ulysses 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
		Ventoux 430 SC.	tebukonazol (430 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	56	
		Traper 250 EC	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	
		Topoxar 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
		Trion 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,25 l/ha	2/jw	35	
		Tyberius 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1 co 2 lata lub 2/jw co 3 lata	56	Zarejestrowany do stosowania od fazy żółtego pąka (BBCH 59).
		Zafra AZT 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	Stosować od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65); termin zabiegu należy wydłużyć do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń (BBCH 71).
		Zakeo 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	
		Zarolis	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole (G1)	układowe, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	56	Stosować po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69)
		Zetar 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	21	Stosować od początku kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69).
		Zingaro Extra 250 SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny (C3)	wgłębne i układowe, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8 l/ha	1	21	

SZKODNIKI

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna (IRAC/FRAC)	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
FAZA ROZWOJOWA BBCH –00 (Przed siewem lub w trakcie siewu)									
<p>Pchełka rzepakowa <i>Psyllodes chrysocephala</i> L.</p> <p>Pchełki ziemne <i>Phyllotreta</i> spp.</p>	<p>Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion, zwiększone normy wysiewu nasion.</p>	Integral Pro	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600 - 6,8%	biologiczne	Kontaktowy i żołądkowy	160 ml na 100 kg nasion (12,8 ml / ha)	1	nie dotyczy	UWAGA: Zaprawa fungicydowa ograniczająca również szkodliwości pchełek. Środek działa również jako stymulator naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dzięki czemu zmniejsza szkody powodowane przez pchełki w rzepaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu preparatów przystosowanych do zapraw ciekłych i zawieszynowych.
		Lumosa 625 FS	cyjanotranilrol – 625 g/l (50,23%)	diamidy antranilowe (2B)	W roślinie działa układowo	40 ml/500 tys. nasion	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania nasion. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum. Nasiona powinny być barwione przed ich rozproszaniem z zakładu zaprawiania nasion. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Środek Lumosa 625 FS stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania. Dotyczy to również doboru środka w przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu w okresie wegetacji.
		Lumosa Xtra OSR	cyjanotranilrol – 625 g/l (50,23%)	diamidy antranilowe (2B)	W roślinie działa układowo	40 ml/500 tys. nasion	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania nasion. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum. Nasiona powinny być barwione przed ich rozproszaniem z zakładu zaprawiania nasion. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Środek Lumosa 625 FS stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania. Dotyczy to również doboru środka w przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu w okresie wegetacji.
		Belem 0,8 MG	cypermetryna - 8 g/kg (0,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy	12 kg/ha	1	45	UWAGA: Środek stosować podczas siewu rzepaku doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin, zapewniając przykrycie glebą granulatu wraz z nasionami.
		Buteo Start	flupyradifuron - 480 g/l (40,37%)	butenolidy (4D)	W roślinie działa układowo	10,42 ml/1 kg nasion (przy normie wysiewu maksymalnie 5 kg nasion/ha)	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania materiału siewnego. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki i posiadać certyfikat ESTA, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania materiału siewnego, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum.
		Columbo 0,8 MG	cypermetryna - 8 g/kg (0,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy	12 kg/ha	1	45	UWAGA: Środek stosować podczas siewu rzepaku doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin, zapewniając przykrycie glebą granulatu wraz z nasionami.
<p>Śmietka kapuściana <i>Delia radicum</i> L.</p>	<p>Agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, właściwy plodozmiar, wczesny wysiew nasion, zwiększone normy wysiewu nasion, zrównoważone nawożenie.</p>	Lumosa 625 FS	cyjanotranilrol – 625 g/l (50,23%)	diamidy antranilowe (2B)	W roślinie działa układowo	40 ml/500 tys. nasion	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania nasion. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum. Nasiona powinny być barwione przed ich rozproszaniem z zakładu zaprawiania nasion. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Środek Lumosa 625 FS stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania. Dotyczy to również doboru środka w przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu w okresie wegetacji.

		Lumosa Xtra OSR	cyjanotranilrol – 625 g/l (50,23%)	diamidy antranilowe (28)	W roślinie działa układowo	40 ml/500 tys. nasion	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania nasion. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum. Nasiona powinny być barwione przed ich rozproszaniem z zakładu zaprawiania nasion. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkami. Środek Lumosa 625 FS stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania. Dotyczy to również doboru środka w przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu w okresie wegetacji.
		Belem 0,8 MG	cypermetryna - 8 g/kg (0,8%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy	12 kg/ha	1	45	UWAGA: Środek stosować podczas siewu rzepaku doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin, zapewniając przykrycie glebą granulatu wraz z nasionami.
		Buteo Start	flupyradifuron - 480 g/l (40,37%)	butenolidy (4D)	W roślinie działa układowo	10,42 ml/1 kg nasion (przy normie wysiewu maksymalnie 5 kg nasion/ha)	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania materiału siewnego. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki i posiadać certyfikat ESTA, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania materiału siewnego, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum.
		Columbo	flupyradifuron - 480 g/l (40,37%)	butenolidy (4D)	W roślinie działa układowo	10,42 ml/1 kg nasion (przy normie wysiewu maksymalnie 5 kg nasion/ha)	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania materiału siewnego. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki i posiadać certyfikat ESTA, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania materiału siewnego, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum.
Gnatarz rzepakowiec <i>Athalia rosae</i> L.	Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion, zwiększone normy wysiewu nasion.	Lumosa 625 FS	cyjanotranilrol – 625 g/l (50,23%)	diamidy antranilowe (28)	W roślinie działa układowo	40 ml/500 tys. nasion	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania nasion. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum. Nasiona powinny być barwione przed ich rozproszaniem z zakładu zaprawiania nasion. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkami. Środek Lumosa 625 FS stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania. Dotyczy to również doboru środka w przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu w okresie wegetacji.
		Lumosa Xtra OSR	cyjanotranilrol – 625 g/l (50,23%)	diamidy antranilowe (28)	W roślinie działa układowo	40 ml/500 tys. nasion	1	nie dotyczy	UWAGA: Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania nasion. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum. Nasiona powinny być barwione przed ich rozproszaniem z zakładu zaprawiania nasion. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkami. Środek Lumosa 625 FS stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania. Dotyczy to również doboru środka w przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu w okresie wegetacji.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 00-17 (od 7 dni przed siewem oraz w trakcie fazy kielkowania do fazy wschodów i liści właściwych)									
Ślimaki - Gastropoda ślimaki nagie i oskorupione.	Usuwanie resztek roślinnych i samosiewów z poprzedniej uprawy, wykaszanie rowów i miedz. Pełny zestaw uprawek, wczesny siew i duży rozstaw roślin. Niszczanie chwastów w uprawach, zmianowanie - zwiększenie różnorodności upraw. Ochrona pożytecznych zwierząt przez utrzymywanie żywopłotów, oczek wodnych i budek lęgowych dla ptaków. Stosowanie biopreparatu zawierającego pasywny nieniszczytelny Phasmarhabdittis hermachrodita.	Allowin 04 RB	metaldehyd - 4 %	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	5 kg/ha	3/5 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
		Axcela GB	metaldehyd - 30 g	Aldehydy	Żołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkod wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10-29). Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

		Axcela TS GB	metaldehyd - 27 g	Aldehydy	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, do fazy kielkowania, do fazy 9 lub więcej liści w rozecie, ewentualnie do fazy widocznych 9 lub więcej pędów (bocznych) (BBCH 01-29).
		Clartex Neo 04 RB	metaldehyd - 4 %	Aldehydy	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	5 kg/ha	3/5 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
		Daxxos	fosforan III żelaza - 29,7 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
		Douxx	fosforan III żelaza - 29,7 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
		Ferrocious	fosforan III żelaza - 29,7 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek stosować po siewie i w późniejszym okresie wegetacji do fazy pełnej dojrzałości nasion (BBCH 89). W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków.
		Hierro	fosforan III żelaza - 10 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	50 kg/ha	4/14 dni	nie dotyczy	Środek stosować po siewie i w późniejszym okresie wegetacji do fazy pełnej dojrzałości nasion (BBCH 89). Środek jest przeznaczony do stosowania poprzez rozrzućenie ręczne lub za pomocą mechanicznego aplikatora do środków w postaci granulatu. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków.
Ślimaki nagie, ślimaki oskorpione		Ironclad	fosforan III żelaza - 29 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
Ślimaki nagie		Ironmax Pro	fosforan III żelaza - 24,2 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
		Iroxx	fosforan III żelaza - 29,7 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	4/7 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
		Lima Oro 3 GB	metaldehyd - 30 g	Aldehydy	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	2/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtarzalne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10-29). Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkod wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10-29). Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkod wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10-29). Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkod wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10-29). Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha w ciągu roku. Stosować po siewie i w późniejszym okresie wegetacji do fazy pełnej dojrzałości nasion (BBCH 89). W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
									Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH29). W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

		Soltex Niezawodny SNAIL	metaldehyd - 5 %	Aldehydy	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	4 kg/ha	2/7-10 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Środek stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH29). W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
		Vitrol GB	pirofosforan żelaza - 24 g	Nieorganiczne związki żelaza	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	6/14 dni	nie dotyczy	Środek stosować przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez szkodniki. Przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich i oskorupionych w uprawie roślin i w ogrodach przydomowych i działkowych. Dzięki specjalnie dobranej przynęcie skutecznie wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany.
		Xiren GB	metaldehyd - 30 g	Aldehydy	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10 - 29). W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.
		Xiren TS GB	metaldehyd - 27 g	Aldehydy	Zołądkowy i kontaktowy w formie przynęty gotowej do stosowania.	7 kg/ha	3/14 dni	nie dotyczy	Środek jest odporny na działanie czynników pogodowych. Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10 - 29). W celu przeciwdziałania powstaniu zjawiska odporności, środek stosować przemienne ze środkami należącymi do innych grup chemicznych. W warunkach silnej inwazji ślimaków zaleca się powtórne zabiegi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin i ręcznie na mniejszych powierzchniach. Nie wyklądać w stosach/kupkach. Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych.

FAZA ROZWOJOWA BBCH 10–19 (Rozwój liści)

Pchelka rzepakowa <i>Psyllodes chrysocephala</i> L. Pchelki ziemne <i>Phyllotreta</i> spp.	Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion, zwiększone normy wysiewu nasion.	Aceptir 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liście całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Apis 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liście całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Bunduki	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Carnadine 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,20 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Środek stosować jesienią po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Zabieg wykonać od fazy pierwszego liścia do fazy dziewiątego liścia (BBCH 11-19). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Decis Expert 100 EC	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek klasyfikuje się jako bardzo toksyczny dla pszczoł jeżeli stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej i powyżej 0,0625 l/ha. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C
		Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Delmetros 100 SC	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym. Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12–15). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delta-Glob 25 EC	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deltagard	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Judo 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających, w przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rosety liściowej (BBCH 10–14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających, w przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rosety liściowej (BBCH 10–14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kestrel 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,20 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Środek zastosować jesienią po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Zabieg wykonać od fazy pierwszego liścia do fazy dziewiątego liścia (BBCH 11-19). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Koron 100 SC	deltametryna 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym. Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kusti 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających, w przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rosety liściowej (BBCH 10–14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Leaxo 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,24 l/ha	1	28	UWAGA: środek stosować jesienią, po wystąpieniu szkodnika od fazy 1 liścia, do fazy 9 lub więcej liści (BBCH 11-19). Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie rzepaku przed pchełką rzepakową. Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
Los Ovados 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liścienie całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.

		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg/ha	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, w przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10–14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Nuyard	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po przekroczeniu progu szkodliwości, w następujących terminach - jesienią, w fazie rozwoju liści (formowania rozety) (BBCH 10-19); - Liczba zabiegów: 1; wiosną, od początku fazy wydłużania łodygi do fazy, gdy prawie wszystkie luszczyny osiągnęły ostateczną wielkość (BBCH 30-79) - Liczba zabiegów: 2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C
		Pilgro 100 SC	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pro-Piryd SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,20 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół. Środek stosować jesienią po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Zabieg wykonać od fazy pierwszego liścia do fazy dziewiątego liścia (BBCH 11-19). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Sombrero 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,20 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół. Środek stosować jesienią po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Zabieg wykonać od fazy pierwszego liścia do fazy dziewiątego liścia (BBCH 11-19). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Tantniś krzyżowiczek <i>Plutella xylostella</i> L.	Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych.	Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Mączliki Aleyrodidae	Unikanie upraw rzepaku w pobliżu upraw warzywnych i pod osłonami.	Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Miniarka kapuścianka <i>Phytomyza rufes</i> Mg		Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.

		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Chowacz gąsówówek <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> Marsh		Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Rolnice - Agrotinae		Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Gnatarz rzepakowiec <i>Athalia rosae</i> L.	Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wczesny wysiew nasion, zwiększone normy wysiewu nasion.	Acceptir 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liczenie całkowite rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Apis 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liczenie całkowite rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Judo 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10–14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w szerokim zakresie temperatur.
		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w szerokim zakresie temperatur.
		Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10–14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Kusti 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10–14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Los Ovados 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liście całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w szerokim zakresie temperatur.
		Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10–14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Mszyce Aphidoidea	Izolacja przestrzenna od innych kapustowatych, zrównoważone nawożenie, w tym niższy poziom azotu, wczesny siew nasion.	Aceptir 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liście całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Apis 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liście całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Bunduki	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,35 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta-Glob 25 EC	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,35 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Deltagard	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,35 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Los Ovados 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liścienie całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Siilitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Shoori	flonikamid - 100 g/l (10,45%)	karboksamidy (29)	Kontaktowy i zołądkowy / W roślinie działa systemicznie i translaminarnie	0,5 l/ha	1	183	UWAGA: środek stosować po wystąpieniu szkodników. Stosować jesienią zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika od fazy 2. liścia do fazy 6-8. liści rzepaku (BBCH 12-16/18).
Śmietka kapuściana <i>Della radicum</i> L.	Agritechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, właściwy plodozmiat, wczesny wysiew nasion, zwiększone normy wysiewu nasion, zrównoważone nawożenie.	Aceptir 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liścienie całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Siilitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Apis 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liścienie całkowicie rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Siilitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Delmetros 100 SC	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym. Środek stosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12–15). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Koron 100 SC	deltametryna 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym. Środek stosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Los Ovados 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować jesienią, zabieg wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację lub z chwilą pojawienia się szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy rozwoju liści (liczenie całkowite rozwinięte) do fazy siódmego liścia (BBCH 10-17). Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ lub Silitop. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,25–0,30 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19). Wyższą z zaleczanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
		Pilgro 100 SC	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować po wystąpieniu szkodników lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 20–59 (Rozwój pędów bocznych – pąkowanie)									
Chowacz brukwiacek <i>Ceutorhynchus napi</i> Gyll.	Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wysiew odmian późno wznawiających vegetację wiosną.	Aceiro 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,2-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy ruszenia vegetacji wiosennej (początek wydłużania łodygi, brak międzywęźli) do końca fazy pąkowania (zółty pąk) (BBCH 30-59) Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Acetam Płynny 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Camelina 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Carnadine 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Cihalotrin 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: rodek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy dziewięciu międzywęźli (BBCH 32–39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Decis Expert 100 EC	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek klasyfikuje się jako bardzo toksyczny dla pszczoł jeżeli stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej i powyżej 0,0625 l/ha. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Deltakill	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać wcześniej wiosną od fazy gdy pędy boczne nie są jeszcze widoczne do fazy widocznego 3. międzywęźla (BBCH 20-33). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Deltaro	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać wcześniej wiosną od fazy gdy pędy boczne nie są jeszcze widoczne do fazy widocznego 3. międzywęźla (BBCH 20-33). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Kusti 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,125 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Lanmos 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglębnie i systemicznie	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Leaxo 200 SL	acetamryd – 200 g/kg (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglębnie i systemicznie	0,3 l/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować w momencie pojawu szkodników, od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „złotego pąka” gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31–59). Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
Leptosar 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglębnie i układowo	0,2–0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy ruszenia vegetacji wiosennej (początek wydłużania lodygi, brak międzywęźli) do końca fazy pąkowania (zółty pąk) (BBCH 30-59) Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2	60	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39). Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Modivo 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: rodek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy dziewięciu międzywęźli (BBCH 32–39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Mospilan 20 SP	acetamryd – 20%	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglębnie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł –zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Mospilan Classic	acetamryd - 20%	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglębnie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł –zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglębnie i systemicznie	0,16–0,20 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją,wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Nexide 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,125 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Nonnus 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy dziewięciu międzywęźli (BBCH 32–39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Nuyard	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po przekroczeniu progu szkodliwości, od początku fazy wydłużania lodygi do fazy, gdy prawie wszystkie luszczyny osiągnęły ostateczną wielkość (BBCH 30-79) - Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C

		Piorun 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,48%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,25 l/ha	1	50	UWAGA: Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku wydłużania pędu (brak międzywęźli) do fazy , gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50), Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
		Prokill	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać wczesną wiosną od fazy gdy pędy boczne nie są jeszcze widoczne do fazy widocznego 3. międzywęźla (BBCH 20-33). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pro-Piryd SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15–0,25 kg/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Prosperace 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15–0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Rapid 060 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: rodek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy dziewięciu międzywęźli (BBCH 32–39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Roslix 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Sapporo 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: W przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia upraw w celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.
		Scatto	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać wczesną wiosną od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy widocznego 3 międzywęźla (BBCH 20–33). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów niż zalecane, stosować zalecane środki owadobójcze zawierające substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Sekil 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: W przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia upraw w celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.
		Shooter 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Silencium 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Sivanto Energy	flupyradifuron - 75 g/l (6,48) + deltametryna - 10 g/l (0,86%)	butenolidy (4D) + pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa systemicznie	0,75 l/ha	1	45	UWAGA:Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-49).Środek działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur.
		Sombbrero 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.

		Tazonit 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,2-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy ruszenia vegetacji wiosennej (początek wydłużania łodygi, brak międzywęźli) do końca fazy pąkowania (zółty pąk) (BBCH 30-59) Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Topgun 05 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,125 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Trebon 30 EC	etofenoproks – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31–50). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Uni Insect 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Uppercut 30 EC	etofenoproks – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31–50). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Vantex 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: rodek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy dziewięciu międzywęźli (BBCH 32–39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Vanto Duo	flupyradifuron - 75 g/l (6,48) + deltametryna - 10 g/l (0,86%)	butenolidy (4D) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa systemicznie	0,75 l/ha	1	45	UWAGA:Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu pędu głównego do początku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 30-49).Środek działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur.
Chowacz czterozębny <i>Ceutorhynchus quadridens</i> Panz.	Izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wysiew odmian późno wznawiających vegetację wiosną.	Aceiro 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,2-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy ruszenia vegetacji wiosennej (początek wydłużania łodygi, brak międzywęźli) do końca fazy pąkowania (zółty pąk) (BBCH 30-59) Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Acceptir 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,2-0,25 l/ha	1	39	UWAGA:środek zastosować od fazy zwanego kwiatostanu (widoczne pojedyncze, zamknięte pąki kwiatowe na głównym kwiatostanie) do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 55-67). Wyższą zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Acetam Płynny 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „złotego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Apis 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,2-0,25 l/ha	1	39	UWAGA:środek zastosować od fazy zwanego kwiatostanu (widoczne pojedyncze, zamknięte pąki kwiatowe na głównym kwiatostanie) do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 55-67). Wyższą zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
		Camelina 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „złotego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Carnadine 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / W roślinie działa układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „złotego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Cimex 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

Cimex Forte 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cimex Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Crassus	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cyperfor II 100 EC	cypermetryna – 100 g/kg (10,76%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25-0,3 l/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cyperforce 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,5 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. W celu ograniczenia występowania zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,5 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. W celu ograniczenia występowania zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cytrin 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. W celu ograniczenia występowania zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). W celu zapobiegania możliwości powstawania odporności na substancję z grupy pyreteroidów środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Decis Expert 100 EC	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	50 ml/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek klasyfikuje się jako bardzo toksyczny dla pszczoł jeżeli stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej i powyżej 0,0625 l/ha. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwanego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deka 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
DelCaps 050 CS	deltametryna – 50 g/l (4,9%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,08–0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk”) (BBCH 51–59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwanego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delta Forte	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deltakill	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania się pędu (BBCH 30-39). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deltaro	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania się pędu (BBCH 30-39). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

DelTop 050 CS	deltametryna – 50g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,08–0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („złoty pąk”) (BBCH 51–59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
DeLux 050 CS	deltametryna – 50g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,08–0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („złoty pąk”) (BBCH 51–59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Demetrina 25 EC	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania się pędu (BBCH 30-39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Desha 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Na uprawach z kwitnącymi roślinami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin opryskiwanie wykonać po zakończeniu dziennego lotu pszczołowatych. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Dyno 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Na uprawach z kwitnącymi roślinami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin opryskiwanie wykonać po zakończeniu dziennego lotu pszczołowatych. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Evure 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Preparat stosować od fazy złotego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59–63). Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne i insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Faux 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Preparat stosować od fazy złotego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59–63). Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemienne ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Geri 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,16–0,2 kg/ha	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pakowania) (BBCH 30–50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 10–25°C.
Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,16–0,2 kg/ha	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pakowania) (BBCH 30–50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Insektus Duo 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemienne ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Judo 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kaiso 050 EG	lambda-cyhalotryna – 50 g/kg (5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 kg/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kaliber 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Preparat stosować od fazy złotego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59–63). Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemienne ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kedu 30 EC	etofenoproks – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 31–50). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kestrel 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15–0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „złotego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31–59). W celu zminimalizowania ryzyka uodpornienia się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Kobe 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.

Kusti 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Lanmos 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy paki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Leaxo 200 SL	acetamryd – 200 g/kg (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,3 l/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować w momencie pojawu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy paki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a paki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50–59). Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
Leptosar 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,2-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy ruszenia vegetacji wiosennej (początek wydłużania łodygi, brak międzywęźli) do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 30-59) Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Los Ovados 200 SE	acetamryd - 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,2-0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek zastosować od fazy zwiartego kwiatostanu (widoczne pojedyncze, zamknięte paki kwiatowe na głównym kwiatostanie) do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 55-67). Wyższą zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa w szerokim zakresie temperatur.
Matrix 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte paki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57) Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59–63). Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemienne ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Mospilan 20 SP	acetamryd – 20%	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy paki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Mospilan Classic	acetamryd – 20%	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy paki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Nuyard	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po przekroczeniu progu szkodliwości od początku fazy wydłużania łodygi do fazy, gdy prawie wszystkie luszczyny osiągnęły ostateczną wielkość (BBCH 30-79) - Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C
Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,16–0,20 kg	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 10-25°C.
Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Piorun 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,48%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,25 l/ha	1	50	UWAGA: Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku wydłużania pędu (brak międzywęźli) do fazy , gdy paki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50), Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
Poleci 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte paki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Prokill	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania się pędu (BBCH 30-39). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Pro-Piryd SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15–0,25 kg/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39). Środek stosować przemienne ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Prosperace 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a paki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.

Roslix 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglśnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze plątki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). W celu zminimalizowania ryzyka uodporniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Scatto	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania się pędu (BBCH 30-39). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów niż zalecane, stosować zalecane środki owadobójcze zawierające substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Sapporo 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglśnie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: W przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia upraw w celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W celu zminimalizowania ryzyka uodporniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Sekil 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglśnie i układowo	0,20–0,25 kg/ha	1	14	UWAGA: W przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia upraw w celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). W celu zminimalizowania ryzyka uodporniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Sherpa 100 EC	cypermetryna – 100 g/l (10,76%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25–0,3 l/ha	1	14	UWAGA: Niebezpieczne dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia lub kiedy występują kwitnące chwasty. Usuwać lub przykrywać ulate podczas zabiegu i przez 2 dni po zabiegu. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55–57). Aby zapobiec zjawisku oporności środek stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować insektycyd należący do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
Shooter 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglśnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze plątki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). W celu zminimalizowania ryzyka uodporniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Silencium 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglśnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze plątki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). W celu zminimalizowania ryzyka uodporniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Sivanto Energy	flupyradifuron - 75 g/l (6,49) + deltametryna - 10 g/l (0,86%)	butenolidy (4D) + pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa systemicznie	0,75 l/ha	1	45	UWAGA: Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-49). Środek działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur.
Sombbrero 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglśnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze plątki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). W celu zminimalizowania ryzyka uodporniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Sorcerer Maks	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. W celu ograniczenia występowania zabiegów stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia oporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Spider 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabiegów stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia oporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Super Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabiegów stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia oporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Superkill 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabiegów stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia oporności szkodników na substancje pyreteroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Ograniczenie występowania – zabiegów stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Tazonit 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, węglśnie i układowo	0,2-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy ruszenia wegetacji wiosennej (początek wydłużania łodygi, brak międzywęźli) do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 30-59) Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.

		Topgun 05 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Trebon 30 EC	etofenoproks – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 31–50). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Uni Insect 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15-0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Uppercut 30 EC	etofenoproks – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 31–50). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Vanto Duo	flupyradifuron - 75 g/l (6,48) + deltametryna - 10 g/l (0,86%)	butenolidy (4D) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa systemicznie	0,75 l/ha	1	45	UWAGA: Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-49). Środek działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur.
FAZA ROZWOJOWA BBCH 50–65 (Początek pąkowania – pełnia kwitnienia)									
Ślodyzek rzepakowy <i>Meilgethes aeneus</i> F.	izolacja przestrzenna od innych roślin kapustowatych, wysiew odmian wcześniej wznawiających wegetację wiosną, wysiew odmian wcześniej zakwitających.	Aceiro 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 50-59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Acceptir 200 SE	acetamryd – 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,12-0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwanego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Acetam Płynny 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,18-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Aphicar Duo 400 EC	cypermetryna - 100 g/l (10,09%) + butoksylan perynolu - 300 g/l (20,27%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy zielonego pąka do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 51-59). Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C.
		Apis 200 SP	acetamryd – 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,12-0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwanego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55-65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Asset	acetamryd – 200 g/l (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,2 kg/ha	1	28	UWAGA: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację, zgodnie z sygnalizacją, do fazy żółtego pąka rzepaku (BBCH 59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Bunduki	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwanego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Zabieg ograniczać również występowanie chowacza czterozębego. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Busola	acetamryd – 120 g/l (10,91%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,35 l/ha	1	28	UWAGA: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zielonego pąka (pąki kwiatowe widoczne z góry) do fazy żółtego pąka (BBCH 51-59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Camelina 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.

Carnadine 200 SL	acetamryd – 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,15–0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy paki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Cihalotrin 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy paki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cimex 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemienne z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cimex Forte 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale paki są nadal zamknięte (BBCH 39-59). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cimex Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale paki są nadal zamknięte (BBCH 39-59). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Crassus	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale paki są nadal zamknięte (BBCH 39-59). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cyperfor II 100 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25–0,3 l/ha	1	14	UWAGA: Niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze paki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze paki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cyperforce 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale paki są nadal zamknięte (BBCH 39-59). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemienne z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cypermetryx 100 EW	cypermetryna – 100 g/l (9,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	1	28	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze paki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze paki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57). Środek stosować przemienne z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Cythrín 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Środek stosować przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Decis Expert 100 EC	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	50 ml/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek klasyfikuje się jako bardzo toksyczny dla pszczoł jeżeli stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej i powyżej 0,0625 l/ha. Środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Zabieg przeciwko słodzikowi zwalcza również chowacza czterozębny. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Zabieg przeciwko słodzikowi zwalcza również chowacza czterozębny. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deka 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju paków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte paki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Zabieg przeciwko słodzikowi zwalcza również chowacza czterozębny. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
DelCaps 050 CS	deltametryna – 50 g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,08–0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy paki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pak”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a paki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pak”) (BBCH 51–59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delmetros 100 SC	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym. Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych paków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych platków, paki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pak) (BBCH 55-59). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

DelTop 050 CS	deltametryna – 50g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,08–0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk”) (BBCH 51–59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
DeLux 050 CS	deltametryna – 50g/l (4,9%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,08–0,1 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk”) (BBCH 51–59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,1 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. Środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwanego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu, zabieg przeciwko słodyszce zwalcza również chowacza czterozębny. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delta Forte	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Na uprawach z kwitnącymi roślinami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin opryskiwanie wykonać po zakończeniu dziennego lotu pszczołowatych. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Zabieg przeciwko słodyszce zwalcza również chowacza czterozębny. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Delta-Glob 25 EC	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwanego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Zabieg ogranicza również występowanie chowacza czterozębny. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deltagard	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwanego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu. Zabieg ogranicza również występowanie chowacza czterozębny. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deltakill	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać wiosną po wystąpieniu szkodnika, na początku fazy pakowania (BBCH 50-52). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Deltaro	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Zabieg wykonać wiosną po wystąpieniu szkodnika, na początku fazy pakowania (BBCH 50-52). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Demetrina 25 EC	deltametryna – 25 g/l (2,77%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,3 l/ha	1	56	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać wiosną po wystąpieniu szkodnika, na początku fazy pakowania (BBCH 50-52). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Desha 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Na uprawach z kwitnącymi roślinami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin opryskiwanie wykonać po zakończeniu dziennego lotu pszczołowatych. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Zabieg przeciwko słodyszce zwalcza również chowacza czterozębny. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Dyno 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (2,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Na uprawach z kwitnącymi roślinami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin opryskiwanie wykonać po zakończeniu dziennego lotu pszczołowatych. Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Zabieg przeciwko słodyszce zwalcza również chowacza czterozębny. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Evure 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63). Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemienne z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Faux 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63). Zabieg przeciwko słodyszce zwalcza również chowacza czterozębny. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemienne ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Fielder 5 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	42	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie pąka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Gerl 20 SP	acetamryd – 200 g/l (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,08-0,12 l/ha	1	14	UWAGA: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwanego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku. Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
Inazuma 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,16–0,2 kg/ha	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pakowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w szerokim zakresie temperatur.
Inpower 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,16–0,2 kg/ha	1	28	UWAGA: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obrotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pakowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najskuteczniej w szerokim zakresie temperatur.

Insektus Duo 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrzążczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Judo 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10-14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg przeciwko słodyszce zwalcząca również chowacza czterozębego. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kaiso 050 EG	lambda-cyhalotryna – 50 g/kg (5%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 kg/ha	1	28	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg przeciwko słodyszce zwalcząca również chowacza czterozębego. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kaliber 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy, gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63). Zabieg przeciwko słodyszce zwalcząca również chowacza czterozębego. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10-14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg przeciwko słodyszce zwalcząca również chowacza czterozębego. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kedu 30 EC	etofenopros – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2-0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych (żółty pąk) (BBCH 50-59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kestrel 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,18-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się złączanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Kobe 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,08-0,12 kg/ha	1	14	UWAGA: środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwanego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Koron 100 SC	deltametryna 100 g/l (9,53%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodników w rzepaku ozimym. Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrzążczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych platków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Kustil 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10-14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg przeciwko słodyszce zwalcząca również chowacza czterozębego. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Labamba	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (9,41%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	1	35	UWAGA: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Lanmos 20 SP	acetamryd – 200 g/kg (20%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,08-0,12 kg/ha	1	14	UWAGA: środek niebezpieczny dla pszczoł. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczoł. Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwanego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Leaxo 200 SL	acetamryd – 200 g/kg (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,3 l/ha	1	28	UWAGA: środek zastosować w momencie pojawu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50-59). Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
Leptosar 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pąkowania (żółty pąk) (BBCH 50-59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Los Ovados 200 SE	acetamryd – 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,12-0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwanego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55-65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
Matrix 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (2,81%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	90	UWAGA: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrzążczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	2 / 7 dni	60	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy, gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63). Zabieg przeciwko słodyszce zwalcząca również chowacza czterozębego. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
Modivo 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06-0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy, gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.

		Sorcerer Maks	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Spider 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 miedzynieżli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39–59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	42	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie pąka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Sumicidin 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (5,54%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,25 l/ha	2 / 14 dni	42	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie pąka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Super Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Superkill 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (51,6%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	2 / 14 dni	49	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie ograniczenia występowania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Tazonit 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych do końca fazy pakowania (żółty pąk) (BBCH 50-59). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.	
		Topgun 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,12 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg przeciwko słodyszcei zwalczą również chowacza czterozębego. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Trebon 30 EC	etofenoproks – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych (żółty pąk) (BBCH 50–59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Uni Insect 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,18-0,25 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.	
		Uppercut 30 EC	etofenoproks – 287,5 g/l (10,09%)	etry arylopropylowe (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2–0,3 l/ha	1	nie dotyczy	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych (żółty pąk) (BBCH 50–59). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Vantex 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (5,92%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,06–0,08 l/ha	1	28	UWAGA: Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62). Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.	
		Vanto Duo	flupyradifuron - 75 g/l (6,48) + deltametryna - 10 g/l (0,86%)	butenolidy (4D) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa systemicznie	0,75 l/ha	1	45	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na roślinach rzepaku, od początku fazy rozwoju pąków kwiatowych do fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe na kwiatostanach bocznych (BBCH 50-57), jednakże nie mniej niż 10 dni przed początkiem kwitnienia. Środek działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur.	
FAZA ROZWOJOWA BBCH 65–78 (Pełnia kwitnienia – luszczyny rozwinięte w 80%)										
Chowacz podobnik <i>Ceutorhynchus assimilis</i> Payk. Przyszcza kapustnik <i>Dasyneura brassicae</i> Winn.	Izolacja przestrzenna od innych kapustowatych, wysiew odmian późno zakwitających.	Aceiro 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, zołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,15-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją do końca fazy pakowania (żółty pąk) do fazy, gdy 10% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.	
		Aceptir 200 SE	acetamryd – 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, włącznie i układowo	0,12-0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62–69). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.	

		Leptosar 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	1	brak	UWAGA: Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją do końca fazy pąkowania (żółty pąk) do fazy, gdy 10% luszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 59-71). Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Los Ovados 200 SE	acetamryd – 200 g/l (18,80%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,12-0,25 l/ha	1	39	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia i kiedy występują kwitnące chwasty. środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (22,06%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,2 l/ha	1	60	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (luszczyn) tj. gdy 10% do 80% luszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71–78). Zabieg przeciwko słodzikowi i zwalczą również chowacza czterozębny. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Mospilan 20 SP	acetamryd – 20%	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,12 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Mospilan Classic	acetamryd – 20%	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,12 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł – zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Mospilan Mizu	acetamryd - 120 g/l (10,91%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,35 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować od pełni kwitnienia (otwartych 50% kwiatów w kwiatostanie głównym, starsze płatki opadają) do początku dojrzewania luszczyn (BBCH 65-80). Środek wykazuje skuteczność w szerokim zakresie temperatur.
		Nepal 130 WG	acetamryd – 100g/kg (10%) + lambda-cyhalotryna – 30 g/kg (3%)	neonikotynoidy (4A) + pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,16–0,20 kg	2 (1 jesienią, 1 wiosną)	28	UWAGA: W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację. Środek działa najsukuteczniej w szerokim zakresie temperatur.
		Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (4,81%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,125–0,15 l/ha	2 / 10–14 dni	28	UWAGA: W zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55–69). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Nuyard	deltametryna – 100 g/l (10,5%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,075 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po przekroczeniu progu szkodliwości od początku fazy wydłużania lodygi do fazy, gdy prawie wszystkie luszczyny osiągnęły ostateczną wielkość (BBCH 30-79). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C
		Piorun 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,48%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,12l/ha	1	50	UWAGA: Środek zastosować w momencie nalotów szkodników na plantację, zgodnie z sygnalizacją, ow fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69). Środek jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur.
		Pilgro 100 SC	deltametryna – 100 g/l (9,53%)	pyretroidy (3A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,05 l/ha	1	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Tylko przyszczać kapustnik - środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy 10% luszczyn osiągnęło typową wielkość, do końca fazy gdy 20% luszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-72). Środek działa najsukuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Pro-Piryd SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15–0,25 kg/ha	1	28	UWAGA:Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest otwartych co najmniej 10% kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do fazy, gdy 10% luszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Prosperace 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% luszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Renoki	acetamryd - 120 g/l (10,91%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,35 l/ha	1	28	UWAGA: Stosować od pełni kwitnienia (otwartych 50% kwiatów w kwiatostanie głównym, starsze płatki opadają) do początku dojrzewania luszczyn (BBCH 65-80). Środek wykazuje skuteczność w szerokim zakresie temperatur.
		Roslix 200 SL	acetamryd - 200 g/l (17,6%)	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy, żołądkowy i gazowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,15-0,3 l/ha	2 / 7 dni	28	UWAGA: Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% luszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.
		Sapporo 20 SP	acetamryd – 20%	neonikotynoidy (4A)	Kontaktowy i żołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i układowo	0,12 kg/ha	1	14	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł –zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł. Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych. Środek działa skutecznie niezależnie od temperatury.

FAZA ROZWOJOWA BBCH 65–80 (Pełnia kwitnienia – początek dojrzałości luszczyn)									
Mszycy kapuściana <i>Brevicoryna brassicae</i> L.	Izolacja przestrzenna od innych kapustowatych, zrównoważone nawożenie, w tym niższy poziom azotu, wczesny siew nasion.	Bunduki	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,35 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek niebezpieczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (4,80%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,15 l/ha	3 (1 jesienią, 2 wiosną) / 14–21 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Delta-Glob 25 EC	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,35 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł – stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc. Zabieg w fazie wykształcenia luszczyn ogranicza występowanie szkodników luszczynowych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
		Deltagard	deltametryna – 25 g/l (2,8%)	pyreroidy (3A)	Kontaktowy i zołądkowy / Na roślinie działa powierzchniowo	0,35 l/ha	2 / 14 dni	45	UWAGA: Środek bardzo toksyczny dla pszczoł – stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc. Zabieg w fazie wykształcenia luszczyn ogranicza występowanie szkodników luszczynowych. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.