



PROGRAM OCHRONY CZEREŚNI



Opracowany w ramach zadania 2.3.
„Analiza możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin ogrodniczych dla upraw małoobszarowych”

Program Wieloletni na lata 2015-2020
finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualizacja: w ramach zadania celowego 6.2
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2026 r.

Program opracowany pod redakcją:

dr hab. Grażyna Soika prof. IO


Autorzy:

dr hab. Jerzy Lisek, prof. nadzw. IO (herbicydy)

dr Hanna Bryk, dr Agata Broniarek-Niemiec (fungicydy)

dr Michał Hołodaj, mgr inż. Barbara Sobieszek (zoocydy)

FAZY ROZWOJOWE (BBCH) (dla drzew pestkowych)



© 1994: BBA und IVA

Klucz do określania faz rozwojowych roślin sadowniczych w skali BBCH

DRZEWA OWOCOWE - PESTKOWE		
Główna faza rozwojowa	Oznaczenie fazy BBCH	Charakterystyka: czereśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, morela
Rozwój pąków 0	00	Stan spoczynku, okres bezlistny: pąki liściowe i kwiatowe zamknięte i pokryte ciemnobrązowymi łuskami
	01	Początek nabrzmiewania pąków (pąki liściowe), widoczne jasnobrązowe łuski z jasnymi brzegami
	03	Koniec nabrzmiewania pąków, łuski oddzielone, widoczne zmiany barwy na jasnozieloną
	09	Widoczne zielone końce liścia, odpadają brązowe łuski, pąki zamknięte w jasnozielonych łuskach

Rozwój liści 1	10	Pęknięcie pąków, oddzielają się pierwsze liście
	11	Rozwinięty pierwszy liść, widoczna oś rozwoju pędu
	19	Pierwsze liście całkowicie wykształcone
Rozwój pędów z pąka szczytowego 3	31	Początek wzrostu pędu, widoczne osie rozwoju pędów
	32	Pędy osiągają około 20% typowej długości
	33	Pędy osiągają około 30% typowej wielkości
	3...	Fazy trwają aż do ...
	39	Pędy osiągają około 90% typowej długości
Rozwój kwiatostanu 5	51	Pąki kwiatowe nabrzmiewają, lecz są zamknięte w jasnobrązowych łuskach
	53	Pęknięcie pąków: łuski oddzielone, widoczny jasnozielony pąk
	54	Kwiatostan zamknięty w jasnozielonych łuskach, jeżeli takie łuski zostały wytworzone (nie wszystkie uprawy)
	55	Widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (ciągle zamknięte) osadzone na krótkich szypułkach, zielone łuski lekko otwarte (faza zielonego pąka)
	56	Płatki kwiatów wydłużają się, działki kielicha zamknięte, oddzielają się pojedyncze kwiaty
	57	Działki kielicha otwarte, widoczne końce płatków, pojedyncze kwiaty z białymi lub różowymi płatkami, nadal zamknięte, początek fazy białego pąka
	59	Większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę
Kwitnienie 6	60	Pierwsze kwiaty otwarte
	61	Początek fazy kwitnienia, otwartych około 10% kwiatów
	62	Otwartych około 20% kwiatów
	63	Otwartych około 30% kwiatów
	64	Otwartych około 40% kwiatów
	65	Pełnia fazy kwitnienia: przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki
	67	Zasychanie kwiatów: większość płatków opada
	69	Koniec fazy kwitnienia: wszystkie płatki opadły
Rozwój owoców 7	71	Rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc
	72	Rozrastanie zalążni
	73	Opadania zawiązków nie zapylnych
	75	Owoc osiąga około połowę typowej wielkości
	76	Owoc osiąga około 60% typowej wielkości
	77	Owoc osiąga 70% typowej wielkości
	78	Owoc osiąga około 80% typowej wielkości
	79	Owoc osiąga około 90% typowej wielkości
Dojrzewanie owoców i nasion 8	81	Początek fazy dojrzewania, wybarwienie owoców
	85	Zaawansowane wybarwienie owoców
	87	Owoce dojrzałe do zbioru
	89	Owoce dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność
Zamieranie, początek okresu spoczynku 9	91	Zakończenie wzrostu pędów, ulistnienie ciągle żywo zielone
	92	Liście zaczynają się przebarwiać
	93	Początek opadania liści
	95	50% liści przebarwionych lub opadających
	97	Wszystkie liście opadły
	99	Zebrane owoce, okres spoczynku

Graficzne fazy rozwojowe i szczegółowy opis faz rozwojowych, podano wg: „Klucza do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH”, opracowanego przez grupę roboczą BBCH, w tłumaczeniu i adaptacji Kazimierza Adamczewskiego i Kingi Matysiak, wydanie III uzupełnione, IOR-PIB Poznań, 2011

KOMENTARZ

W ochronie czereśni, podobnie jak innych roślin uprawnych, profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin zobowiązani są do stosowania integrowanego systemu ochrony roślin. Jego podstawą jest maksymalne wykorzystanie metod niechemicznych, które powinny być uzupełniane stosowaniem pestycydów wówczas, gdy oczekiwane straty ekonomiczne spowodowane przez agrofagi będą wyższe niż koszt zabiegu. Głównym celem jest skuteczne, bezpieczne i opłacalne obniżenie populacji agrofagów do poziomu, przy którym nie wyrządzają one już szkód gospodarczych. Jest to możliwe poprzez regularne prowadzenie lustracji oraz prognozowanie pojawu agrofagów i oceny zagrożenia. W integrowanej ochronie roślin mogą być stosowane wszystkie środki aktualnie zarejestrowane dla danego gatunku roślin. Natomiast w Integrowanej Produkcji Roślin – systemie dobrowolnym i certyfikowanym – obowiązują dodatkowe ograniczenia ich użycia. Informacje na temat możliwości stosowania środków w Integrowanej Produkcji (IP) oraz produkcji ekologicznej (EKO) podano przy nazwie każdego preparatu.

Opracowany Program Ochrony Czereśni zawiera informacje dotyczące możliwości zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów występujących w sadach czereśniowych. Przedstawiono aktualnie zarejestrowane środki ochrony roślin, ich substancje aktywne, mechanizm działania oraz zalecane dawki. Podano także maksymalną liczbę zabiegów, możliwość selekcji form odpornych agrofaga na daną substancję, jej przynależność do grupy chemicznej (wg organizacji FRAC, IRAC i HRAC), częstotliwość wykonywania zabiegów oraz okres karencji. W poszczególnych fazach fenologicznych uwzględniono metody niechemiczne wspomagające ochronę, możliwe do zastosowania w tym terminie.

Podstawą powodzenia integrowanej ochrony czereśni jest zakładanie sadu z certyfikowanego materiału szkółkarskiego, co daje gwarancję jego zdrowotności od początku prowadzenia uprawy. Istotne znaczenie mają także wybór stanowiska, które powinno być wolne od patogenów i szkodników żyjących w glebie, a także uporczywych chwastów. Wskazana jest uprawa roślin fitosanitarnych (owies, żyto, gorczyca, kukurydza, gryka, rośliny bobowate), przynajmniej przez rok przed założeniem sadu. Należy dążyć do tego, aby rośliny fitosanitarne uprawiać w mieszankach, na przykład owies z seradelą czy żyto z koniczyną. Mieszanki roślin fitosanitarnych mają znacznie korzystniejsze działanie niż uprawa pojedynczego gatunku, ponieważ stymulują rozwój różnych mikroorganizmów glebowych.

Uwaga: środki, mające w etykiecie zapis „stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych” umożliwiają zwalczanie agrofagów (patogeny, szkodniki, chwasty) na roślinach sadowniczych, jednak odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność takich środków ochrony roślin ponosi wyłącznie ich użytkownik.

**Obowiązkiem każdego użytkownika środka ochrony roślin
jest zapoznanie się z treścią etykiety, zamieszczonej
na danym produkcie**

Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin, wymienionych w niniejszym programie, można znaleźć na stronie internetowej MRiRW:

<https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>

CHWASTY (stan na dzień 16.03.2026)

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna HRAC	Działanie	Dawka kg(l)/ha (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OD POCZĄTKU WEGETACJI DO CZERWCOWEGO OPADANIA ZAWIĄZKÓW (BBCH 00-73)								
Jednoroczne chwasty jedno i dwuliścienne przed wschodami	Zwalczanie mechaniczne – uprawa gleby, koszenie; zwalczanie płomieniowe (palnikiem propanowym); gorąca woda; ściółkowanie gleby; rośliny okrywowe	Stomp Aqua 455 CS Aquatoro Aquatos Symmach 455 CS Uni Aqua 455 CS Zapora Liquid 455 CS	pendimetalina 455 g <i>dinitroaniliny</i> 3, dawniej K1	Doglebowy	2,5-3,5 l/ha lub dawki dzielone 2 x 1,75 l/ha	3/14	ND	Zabieg wykonywać na glebę wolną od chwastów, od drugiego roku po posadzeniu drzew. Dawki dzielone stosować od fazy różowego pąka (BBCH 57) do czerwcowego opadu zawiązków (BBCH 73). 14-dniowy minimalny odstęp między zabiegami odnosi się do dawek dzielonych. Zastosowanie małoobszarowe. Środek nie jest dopuszczony do stosowania w IP.
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne po wschodach		Fusilade Forte 150 EC IP Balatella Forte 150 EC IP Fortune IP Foster Forte 150 EC IP Privium 125 EC IP	flauazyfop-P-butylowy 150 g <i>pochodne kwasu arylofenoksypropionowego</i> 1, dawniej A	Dolistny	0,6-1,7 l/ha	1	28	Na chwasty prosoвате w fazie 2–3 liści – krzewienie, w niższych z polecanych dawek, nieprzekraczających zwykle połowy dawek maksymalnych. Na perz w fazie 4–6 liści (ok. 15 cm wysokości). Zabieg wykonywać przy użyciu jednego ze środków, najlepiej wiosną. Zastosowanie małoobszarowe. IP - Środek stosować zgodnie z aktualną etykietą.
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne po wschodach i przed wschodami		Chikara 25 WG	flazasulfuron 250 g <i>pochodne sulfonilomocznika</i> 2, dawniej B	Doglebowy i dolistny	0,08 kg/ha	1	ND	Środek układowy pobierany przez liście i korzenie roślin. Działanie następcze (poprzez glebę) utrzymuje się do 3-4 miesięcy. Służy do selektywnego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich w sadzie starszym niż czteroletni. środek stosować od marca, w okresie intensywnego wzrostu chwastów, do fazy pełni fazy kwitnienia drzew: przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki (BBCH≤65). Zalecane jest stosowanie na chwasty o wysokości do 20 cm, wyłącznie w rzędach drzew (pod koronami), tak aby opryskiwana powierzchnia wynosiła 1/3 całkowitej powierzchni sadu. Przy aplikacji pasowej zabieg można wykonywać corocznie (maksymalnie 1 zabieg w sezonie). Przy aplikacji na całej powierzchni sadu zabieg można wykonywać nie częściej niż raz na dwa lata. Zastosowanie małoobszarowe. Środek nie jest dopuszczony do stosowania w IP.
OD POCZĄTKU DO KOŃCA WEGETACJI (BBCH 00-99)								
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwuliścienne po wschodach	Zwalczanie mechaniczne – uprawa gleby, koszenie; zwalczanie płomieniowe	Agrosar 360 SL IP³	glifosat 360 g <i>pochodne glicyny</i> 9, dawniej G	Dolistny	3-8 l/ha	1	7	Opryskiwać podczas całego okresu wegetacji chwastów, od wiosny do późnej jesieni. Przed zabiegami środkami zawierającymi glifosat, usunąć mechanicznie odrosty korzeniowe drzew. Używać opryskiwacza z osłonami.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(palnikiem propanowym); gorąca woda; ściółkowanie gleby; rośliny okrywowe							<p>W ramach Dobrej Praktyki Rolniczej oraz integrowanej produkcji roślin wykonywać nie więcej niż 2 zabiegi glifosatem w sezonie, tak aby łączna dawka substancji czynnej nie przekroczyła 3,6 kg/ha, a minimalny odstęp czasu między zabiegami wyniósł 90 dni. Zastosowanie małoobszarowe.</p> <p>IP³- Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.</p>
		Orkan 350 SL IP^{1,3}	MCPA 90 g + glifosat 260 g <i>fenoksykwasy + pochodne glicyny</i> 4 + 9, dawniej O + G	Dolistny	5-7 l/ha	1	7	<p>Zabieg wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej 10°C. Dwuliścienne chwasty trwałe opryskiwać w okresie intensywnego wzrostu, do początku ich kwitnienia lub po kwitnieniu. Mieszaniny MCPA i glifosatu zwalczają także skrzyp polny. Zastosowanie małoobszarowe.</p>
		Sprinter 350 SL IP^{1,3}	MCPA 90 g + glifosat 260 g <i>fenoksykwasy + pochodne glicyny</i> 4 + 9, dawniej O + G	Dolistny	5-7 l/ha	1	7	<p>IP¹- Środek zawierający substancję z grupy kwasów karboksylowych, określaną jako syntetyczny odpowiednik regulatora wzrostu roślin. Ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie. Zastosowanie środka w dopuszczonej dawce wyklucza użycie innego preparatu handlowego, który zawiera tę samą substancję aktywną.</p>
		Agrosar 360 SL + IP³ Chwastox Extra 300 SL IP¹	glifosat 360 g + MCPA 300 g <i>pochodne glicyny + fenoksykwasy</i> 9 + 4, dawniej G + O	Dolistny	5 + 2,5 l/ha	1	7	<p>IP³- Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.</p>
OD NABRZMIEWANIA PĄKÓW KWIATOWYCH DO POCZĄTKU WYBARWIANIA OWOCÓW (BBCH 51-81)								
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwuliścienne po wschodach	Zwalczanie mechaniczne – uprawa gleby, koszenie; zwalczanie płomiennic (palnikiem propanowym); gorąca woda; ściółkowanie gleby; rośliny okrywowe	BGT IP³ Hadican IP³ Halvetic IP³	glifosat 180 g <i>pochodne glicyny</i> 9, dawniej G	Dolistny	4-6 l/ha	1	7	<p>Opryskiwać zielone chwasty.</p> <p>W ramach Dobrej Praktyki Rolniczej oraz integrowanej produkcji roślin wykonywać nie więcej niż 2 zabiegi glifosatem w sezonie, tak aby łączna dawka substancji czynnej nie przekroczyła 3,6 kg/ha, a minimalny odstęp czasu między zabiegami wyniósł 90 dni. Zastosowanie małoobszarowe.</p> <p>IP³- Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.</p>
OD ZAKOŃCZENIA WZROSTU PĘDÓW DO OPADNIĘCIA LIŚCI (BBCH 91-97)								
Jednoroczne chwasty jedno i dwuliścienne przed wschodami	Zwalczanie mechaniczne – uprawa gleby, koszenie; zwalczanie płomiennic (palnikiem propanowym); gorąca woda; ściółkowanie gleby; rośliny okrywowe	Stomp Aqua 455 CS Aquatoro Aquatos Symmach 455 CS Uni Aqua 455 CS Zapora Liquid 455 CS	pendimetalina 455 g <i>dinitroaniliny</i> 3, dawniej K1	Doglebowy	3,5 l/ha	3	ND	<p>Zabieg wykonywać na glebę wolną od chwastów, od drugiego roku po posadzeniu drzew. Zastosowanie małoobszarowe.</p> <p>Środek nie jest dopuszczony do stosowania w IP.</p>
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwuliścienne po wschodach		Gallup 360-K IP³ Barbarian Super 360K IP³ Koyote 360 K IP³ Krypt 540 IP³	glifosat 360 g <i>pochodne glicyny</i> 9, dawniej G	Dolistny	3-4 l/ha	1	7	<p>Zabieg wykonywać po jesiennym opadnięciu liści z drzew (BBCH 97-99). Nie stosować w sadach młodszych niż dwuletnie. W ramach Dobrej Praktyki Rolniczej oraz integrowanej produkcji roślin wykonywać nie więcej niż 2 zabiegi glifosatem w sezonie, tak aby łączna dawka substancji czynnej nie przekroczyła 3,6 kg/ha, a minimalny odstęp czasu między zabiegami wyniósł 90 dni.</p>
			glifosat 540 g <i>pochodne glicyny</i> 9, dawniej G	Dolistny	2-2,7 l/ha	1	7	<p>IP³- Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.</p>

Uwaga dotycząca wszystkich herbicydów stosowanych w IP: przy tym systemie produkcji, okres karencji dla syntetycznych herbicydów nie powinien być krótszy niż 30 dni.

CHOROBY (stan na dzień 30 marca 2026 roku)

Choroba / czynnik sprawczy	Niechemiczne metody ochrony Progi ekonomicznej szkodliwości	Środek ochrony roślin i możliwość stosowania w integrowanej produkcji (IP) oraz ekologicznej produkcji (EKO)	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna / FRAC	Działanie na roślinie i w stosunku do agrofaga	Dawka kg(l)/ha (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZED ZAŁOŻENIEM SADU								
GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE NICIENIE SZKODNIKI GLEBOWE	Stosowanie biofumigacji do ograniczenia populacji patogenów w glebie. Ta metoda dezynfekcji gleby opiera się na uwalnianiu lotnych związków naturalnie występujących w roślinach, np. z rodziny kapustowatych (rzodkiew), czy oleistych (gorczyca, rzepak) uprawianych jako przedplon.	Basamid IP	dazomet 950 g <i>tiodiazyny</i>	pod wpływem wilgoci środek rozkłada się, wydzielając produkty gazowe np. izotiocyanian metylu	500 kg	1	nie dotyczy	Stosować od końca sierpnia do połowy października lub wiosną od końca marca do początku kwietnia, na mocno wilgotną glebę (około 60-70% pojemności wodnej), gdy zakres temperatur w górnej warstwie gleby wynosi 6-27°C (optymalnie 15-18°C), minimum 5 tygodni przed sadzeniem roślin. Na tym samym polu nie stosować tego ani żadnego innego produktu zawierającego dazomet częściej niż co 3 lata.
OKRES BEZLISTNY (BBCH 00-09)								
CHOROBY KORY I DREWNA LEUKOSTOMOZA <i>Leucostoma cincta</i>, <i>L. persooni</i> SREBRZYSTOŚĆ LIŚCI <i>Chondrostereum purpureum</i>	- Cięcie fitosanitarne wykonywać w suchy słoneczny dzień. - Zakładając sad unikać stanowisk nisko położonych, ograniczając w ten sposób potencjalne uszkodzenia mrozowe, które mogą być zasiedlane przez sprawców choroby.	Aktualnie brak zarejestrowanych środków do zwalczania tych chorób.						
PRZED KWITNIENIEM (BBCH 10-59)								
RAK BAKTERYJNY <i>Pseudomonas syringae</i>	- Wycinać i usuwać z sadu porażone pędy, gałęzie, a nawet całe drzewa. - Prześwietlanie drzew wykonywać po zbiorze owoców, najlepiej w suchy słoneczny dzień.	Miedzian Extra 350 SC IP/EKO Miedzian 50 WP IP/EKO	tlenochlorek miedzi 350 g tlenochlorek miedzi 500 g (50%) <i>miedziowe</i> Kontaktowe o działaniu wielostronnym	powierzchniowy działa zapobiegawczo	3,0 l (1,88 l/LWA) 3,0 kg (1,88 kg/LWA)	1 1	14 14	Stosować od fazy nabrzmiewania pąków do początku kwitnienia (BBCH 51-61).
BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH <i>Monilinia</i> spp.	- W celu ograniczenia źródła infekcji usuwać porażone pędy, owoce i mumie. - Należy unikać nadmiernego zagęszczenia koron drzew, ponieważ	Revyona IP	mefentriflukonazol 75 g/l triazole G 1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,0 l/10 000 m ² LWA	2 / 7 dni	3 dni	Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe (faza zielonego pąka), do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 55-89). Rejestracja małoobszarowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Serenva Sextans 62,5 WG Sketch 62,5 WG Society Sorvin IP						
		Revyona IP	mefentriflukonazol 75 g/l triazole G 1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,0 l/LWA	2 / 7 dni	3	Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe (faza zielonego pąka), do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 55-89). Rejestracja małoobszarowa.
		Scala IP	pirymetanił 400 g anilinopirymidyny D 1	powierzchniowy i wglębny działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,5 l (1,0 l/LWA)	2 / 7 dni	3	Stosować od fazy zielonego pąka kwiatowego, do momentu osiągnięcia dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 55-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		Sercadis Neerion IP	fluksapyroksad 300 g karboksylamidy (SDHI) C 2	układowy działa zapobiegawczo	0,2 l/LWA	2 / 7 dni	3	Stosować od początku rozwoju kwiatostanu, do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 57-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		Serenade ASO Rhapsody IP/EKO	<i>Bacillus subtilis</i> szczep QST 713 13,96 g w 1 l Mikrobiologiczne	zakłóca rozwój patogena, indukuje odporność roślin, działa powierzchniowo	8,0 l	4 / 5 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 51-85). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.
		Taegro IP/EKO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB24 – 130 g Mikrobiologiczne BM Biologiczne, o wielu sposobach działania	powierzchniowy, zakłóca rozwój patogena	0,185-0,370 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.
WZROST I ROZWÓJ OWOCÓW (BBCH 70-89)								
RAK BAKTERYJNY <i>Pseudomonas syringae</i>	- Wycinać i usuwać z sadu porażone pędy, gałęzie, a nawet całe drzewa. - Prześwietlanie drzew wykonywać po zbiorze owoców, najlepiej w suchy słoneczny dzień.	Miedzian Extra 350 SC IP/EKO	tlenochlorek miedzi 350 g	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,5 l (0,94 l/LWA)	2 / 7-10 dni	14	Stosować tuż po kwitnieniu do czasu opadania niezapylnych zawiązków (BBCH 65-73).
		Miedzian 50 WP IP/EKO	tlenochlorek miedzi 500 g (50%) miedziowe Kontaktowe o działaniu wielostronnym	1,5 kg (0,94 kg/LWA)	2 / 7-10 dni	14		
		Serenade ASO Rhapsody IP/EKO	<i>Bacillus subtilis</i> 13,96 g mikrobiologiczne	kontaktowy działa zapobiegawczo	8,0 l	4 / 5 dni	nie stosować w dniu zbioru	
BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH <i>Monilinia</i> spp.	- W celu ograniczenia źródła infekcji usuwać porażone pędy, owoce i mumie. - Należy unikać nadmiernego zagęszczenia koron drzew, ponieważ sprzyja to rozwojowi choroby, a jednocześnie uniemożliwia prawidłowe	Signum 33 WG Boskal Cobalt Eliithena Iryd Klaption 33 WG Kornet 33 WG Kosmo 33 WG Samar	piraklostrobina 6,7% + boskalid 26,7% strobiluryny+anilidy C3	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,75 kg	3 / 10-14 dni	7	Stosować na początku wybarwiania się owoców. Rejestracja małoobszarowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wykonanie zabiegów chemicznych.	Spector 33 WG Vaita IP						
		Luna Experience 400 SC IP	fluopyram 200 g +tebukonazol 200 g <i>anilidy (SDHI) + triazole</i> C2 + G1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować do fazy dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 89), tylko raz w sezonie.
		Switch 62,5 WG BAMSE Botrefin Cypro-Fludio-Life Cypros Fludiocyp Pro 62,5 WG LS Cypro-Fludio Mars 62,5 WG Puenta 62,5 WG Pleśń Stop Serenva Sextans 62,5 WG Sketch 62,5 WG Society Sorvin IP	cyprodynil 375 g + fludioksonil 250 g <i>anilinopirymidyny</i> + <i>fenylopirole</i> D1+E2	powierzchniowy i wglębny, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 – 1,0 kg	2 / 7 dni	7	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby. Rejestracja małoobszarowa.
		Revyona IP	mefentriflukonazol 75 g/l triazole G 1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,0 l/10 000 m ² LWA	2 / 7 dni	3 dni	Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe (faza zielonego pąka), do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 55-89). Rejestracja małoobszarowa.
		Kapduo ReNovo 72,5 WG Kapster ReNovo 72,5 WG Kaptan Plus ReNovo 72,5 WG Shavit Gold 72,5 WG IP	kaptan – 700 g difenokonazol – 25 g <i>ftalimidy + triazole</i> Kontaktowe o działaniu wielostronnym + G 1	powierzchniowy i układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,8-2,0 kg	3 / 5-10 dni	28	Stosować od fazy rozwoju zalaźni do fazy rozrastania zalaźni (BBCH 71-72). Rejestracja małoobszarowa.
		Scala IP	pirymetanił 400 g <i>anilinopirymidyny</i> D 1	powierzchniowy i wglębny działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,5 l (1,0 l/LWA)	2 / 7 dni	3	Stosować od fazy zielonego pąka kwiatowego, do momentu osiągnięcia dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 55-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		Sercadis Neerion IP	fluksapyroksad 300 g <i>karboksyamidy (SDHI)</i> C 2	układowy działa zapobiegawczo	0,2 l/LWA	2 / 7 dni	3	Stosować od początku rozwoju kwiatostanu, do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 57-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		Serenade ASO Rhapsody IP/EKO	<i>Bacillus subtilis</i> szczep QST 713 13,96 g w 1 l <i>mikrobiologiczne</i> BM Biologiczne, o wielu sposobach działania	zakłóca rozwój patogena, indukuje odporność roślin, działa powierzchniowo	8,0 l	4 / 5 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować zapobiegawczo do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 85). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.
		Taegro IP/EKO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB24 – 130 g <i>Mikrobiologiczne</i> BM Biologiczne, o wielu sposobach działania	powierzchniowy, zakłóca rozwój patogena	0,185-0,370 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.
		Laminone Nutivax Plantivax Vaxiplant SL IP/EKO	laminaryna – 45 g <i>polisacharydy</i> P 04	układowy, stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin	1,0 l	20 / 10 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować od fazy opadania niezapylnych zawiązków do fazy, kiedy rośliny wchodzą w okres spoczynku (BBCH 73-99) Środki ograniczają występowanie choroby Rejestracja małoobszarowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH <i>Blumeriella jaapii</i>		Efuzin 544 SC Syllit 544 SC IP	dodyna 544 g <i>po pochodne guanidyny</i> Nieznany sposób działania U12	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,25 l	2 / 7 dni	14	Stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce osiągają 90% typowej wielkości (BBCH 60-79) i/lub po zbiorach
		Dodifun SC IP	dodyna 400 g <i>po pochodne guanidyny</i> Nieznany sposób działania U12	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,7 l (1,125 l/ha LWA)	2 / 7-10 dni	14	Stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia objawów choroby, po kwitnieniu, do fazy, kiedy owoc osiąga około połowy typowej wielkości (BBCH 71-75), i/lub po zbiorach z początkiem okresu spoczynku do fazy, kiedy opadną wszystkie liście (BBCH 90-97)
		EI Cappel 80 WG Kapelan 80 WG Kaplan 80 WG Pastor 80WG Whitable IP	kaptan 800g/kg (80%) <i>ftalimidowe</i> Kontaktowe o działaniu wielostronnym	powierzchniowy, działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 7-10 dni	14	Stosować od fazy początku wzrostu owocu do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-81). Rejestracja małoobszarowa.
		Kaptan Gold 80 WG Merpan 80 WDG Mertop 80 WDG IP	kaptan 800 g <i>ftalimidy</i> Kontaktowe o działaniu wielostronnym	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 10 dni	21	Stosować od fazy rozwoju zalążni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH >71). Rejestracja małoobszarowa
		Bluna 250 EC Ferten 250 EC Hajmon 250 EC Tores 250 EC Valor 250 EC Wezen 250 EC IP	difenokonazol 250 g (23,58%) <i>triazole</i> G1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,2 l	2 / 14 dni	28	Stosować od początku fazy zasychania kwiatów do fazy, gdy owoc osiąga 80% wielkości (BBCH 71-78). Stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C Rejestracja małoobszarowa.
		Luna Experience 400 SC IP	fluopyram 200 g +tebukonazol 200 g <i>anilidy (SDHI) + triazole</i> C2 + G1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Środek stosować po kwitnieniu (BBCH > 69), tylko raz w sezonie. Rejestracja małoobszarowa.
		Luna Sensation 500 SC IP	fluopyram 250 g + trifloksystrobina 250 g <i>pirydynoetylobenzamidy (SDHI) + strobiluryny</i> C2+C3	powierzchniowy, układowy i mezostemiczny, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,3 l	2 / 7 dni	7	Stosować od fazy zasychania kwiatów, do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 67-87). Rejestracja małoobszarowa.
		Kapduo ReNovo 72,5 WG Kapster ReNovo 72,5 WG Kaptan Plus ReNovo 72,5 WG Shavit Gold 72,5 WG IP	kaptan – 700 g difenokonazol – 25 g <i>ftalimidy + triazole</i> Kontaktowe o działaniu wielostronnym + G 1	powierzchniowy i układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,8-2,0 kg	3 / 10-14 dni	28	Stosować od fazy rozwoju zalążni do fazy, gdy owoc osiąga około 60% wielkości (BBCH 71-76). Rejestracja małoobszarowa.
SZARA PLEŚŃ <i>Botrytis cinerea</i>		Luna Experience 400 SC IP	fluopyram 200 g +tebukonazol 200 g <i>anilidy (SDHI) + triazole</i> C2 + G1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować po kwitnieniu (BBCH > 69), tylko raz w sezonie. Rejestracja małoobszarowa.
		Polyversum WP IP/EKO	10 ⁶ oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> w 1 gramie środka. Mikrobiologiczne	rozłada strzępki patogena i stymuluje odporność roślin	0,15 kg	4 / 4 dni	nie dotyczy	Stosować w fazie, gdy owoce zaczynają się intensywnie przebarwiać. Stosować łącznie z adiuwantem Protector w dawce 0,3 l/ha. Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.
		Taegro IP/EKO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB24 – 130 g Mikrobiologiczne BM Biologiczne, o wielu sposobach działania	powierzchniowy, zakłóca rozwój patogena	0,185-0,370 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Serifel IP/EKO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MB1600 – 11% <i>Mikrobiologiczne</i> BM Biologiczne, o wielu sposobach działania	powierzchniowy, zakłóca kiełkowanie zarodników i rozwój patogena	0,5 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować od początku fazy rozwoju pędów, do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 31-81). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.
		Laminone Nutivax Plantivax Vaxiplant SL IP/EKO	laminaryna – 45 g <i>polisacharydy</i> P 04	układowy, stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin	1,0 l	20 / 10 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować od fazy opadania niezapylnych zawiązków do fazy, kiedy rośliny wchodzą w okres spoczynku (BBCH 73-99) Środki ograniczają występowanie choroby Rejestracja małoobszarowa
DZIURKOWATOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH <i>Clasterosporium carpophilum</i>	- Ograniczać źródła infekcji przez wycinanie i niszczenie porażonych pędów.	Luna Experience 400 SC IP	fluopyram 200 g +tebukonazol 200 g <i>anilidy (SDHI) + triazole</i> C2 + G1	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować po kwitnieniu (BBCH > 69), tylko raz w sezonie. Rejestracja małoobszarowa.
PO ZBIORZE OWOCÓW (BBCH 91)								
RAK BAKTERYJNY <i>Pseudomonas syringae</i>	- Wycinać i usuwać z sadu porażone pędy, gałęzie, a nawet całe drzewa. - Prześwietlanie drzew wykonywać po zbiorze owoców, najlepiej w suchy słoneczny dzień.	Aktualnie brak zarejestrowanych środków do stosowania w tym terminie.						
DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH <i>Blumeriella jaapii</i>	- Ograniczać źródła infekcji poprzez wygrabianie i niszczenie opadłych liści. - Unikać zagęszczenia korony poprzez prawidłowe cięcie drzew.	Efuzin 544 SC Syllit 544 SC IP	dodyna 544 g <i>pochodne guanidyny</i> Nieznany sposób działania U12	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,25 l	2 / 7 dni		Stosować po zbiorze owoców, w lata z dużą ilością opadów, gdy porażonych jest ponad 10% liści.
		Dodifun SC IP	dodyna 400 g <i>pochodne guanidyny</i> Nieznany sposób działania U12	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,7 l (1,125 l/ha LWA)	2 / 7-10 dni		Stosować po zbiorze owoców z początkiem okresu spoczynku do fazy, kiedy opadną wszystkie liście (BBCH 90-97)

SZKODNIKI (stan na dzień 20.03.2026)

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony Progi ekonomicznej szkodliwości	Środek ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna / FRAC	Działanie na roślinie i agrofaga	Dawka kg(l)/ha (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZED KWITNIENIEM faza 1 – okres bezlistny (BBCH 51) do faza 4 –biały pąk (BBCH 59)								
LICINEK TARNINACZEK <i>Argresthia ephippiella</i>	Ochrona organizmów pożytecznych. Pasożyty poczwerek oraz ptaki ograniczają tego szkodnika. Próg szkodliwości - 10 paków z gąsienicami	Mospilan 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	Opryskiwać w fazie 2-3, jeżeli w poprzednim roku obserwowano więcej niż 5% uszkodzonych kwiatów. *Stosować jeden z wymienionych środków. Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026 Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2
		Mospilan Classic* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Lanmos 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Sekil 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Geril 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Aceiro 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Mantos 200 SL* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Tazonit 20 Sl* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Leptosar 200 SL* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
MSZYCE Aphididae	Usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez mszyce pędów zmniejsza liczebność populacji tego szkodnika. Ochrona organizmów pożytecznych, które mają duży udział w ograniczaniu liczebności mszyc, m.in. biedronkowate, bzygowate, siatkoskrzydłe (złotooki), pluskwiaki, pasożytnicze błonkówki). Próg szkodliwości - 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew	Decis Mega 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	Zwalczać po stwierdzeniu szkodnika. *Stosować jeden z wymienionych środków.
		Delta 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	**Stosować jeden z wymienionych środków.
		Deka 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	***Stosować jeden z wymienionych środków.
		Desha 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Delta Forte* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026
		Poleci 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Delta Forte, Dyno 2,5 EC, Poleci 2,5 EC, Matrix 2,5 EC są zarejestrowane do zwalczania mszyc w uprawach małoobszarowych oraz są toksyczne dla pszczół, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.
		Dyno 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Leptosar 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Aceiro 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Mantos 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	Preparaty Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Geri 20 SP, Kobe 20 SP Lanmos 20 SP i Timber 20SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha.
		Tazonit 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.
		Mospilan 20 SP** IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.
		Mospilan Classic** IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	Flonikamid - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.
Timber 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	Pyretryna + oleje roślinne - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie.		
Geri 20 SP** IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sekil 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	Olej parafinowy - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie.
		Kobe 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Lanmos 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Tepeki 50 WG IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Afinto IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Hinode IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Mainman 50 WG IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Surround WP Crop Protectant IP	950 g krzemianu glinu (kaolin) UN	Działa odstrasza­jąco na roślinie powierzchniowo	30 kg/ha	8/7 dni	Nie dotyczy	
		Spruzit Koncentrat na Szkodniki ** IP/EKO	pyretryna 9,17 g <i>pyreteroidy i pyretryny</i> 3A +olej rzepakowy 82,5% <i>Oleje roślinne</i> UN	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5 l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	3	
		Fitter IP/EKO	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l UN	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10 l/ha	9/7dni	1	
		Treol 770 EC IP/EKO	olej parafinowy 770 g <i>oleje roślinne</i> UN	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	1,50%	1	Nie dotyczy	
		Neudosan IP/EKO	Sól potasowa kwasów tłuszczowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy	
		Emulpar 940 EC IP/EKO	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przędziorków/7- 10 dni	Nie dotyczy	
		K-PAK IP	Miesz­z­a­ni­na zwi­ą­z­ków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Next Pro IP	Miesz­z­a­ni­na zwi­ą­z­ków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%		Nie dotyczy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Siltac EC IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%		Nie dotyczy	
ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE Tortricidae I INNE GĄSIENICE ZJADAJĄCE LIŚCIE	Stosowanie środków pochodzenia naturalnego do zwalczania gąsienic. Próg szkodliwości - 6 gąsienic na 200 rozet	Sekil 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	W razie potrzeby, opryskiwać przed kwitnieniem, najpóźniej w fazie białego pąka. Próg zagrożenia – 3% rozet zasiedlonych przez gąsienice. *Stosować jeden z wymienionych środków Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026 Preparaty Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Geri 20 SP, Kobe 20 SP Lanmos 20 SP i Timber 20SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha. Preparat XenTari WG, BioBit, DiPel DF, Forrabac należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2). Dyspensery feromonowe należy rozwiesić przed pojawieniem się pierwszych motyli. Agree 50 WG - stosować od fazy pęknięcia pąka BBCH 53 Rak 3+4 można stosować tylko do zwalczania zwójki siatkóweczki. Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS 1857- maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 10 razy w sezonie. <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie. <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep GC-91- maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie.
		Timber 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	
		Kobe 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Geri 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Lanmos 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Mospilan 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Mospilan Classic* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Leptosar 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	2/7dni	14	
		Aceiro 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Mantos 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Tazonit 20 SI* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Isomate CLS IP/EKO	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol, dodekano-1-ol, tetradekano-1-ol, Octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu, Octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu, Octan (Z)-8-tetradeceno-1-ylu, (Z)-8-tetradecen-1-ol atranilowe diamidy 28	Nie dotyczy	500-800 dyspenserów	1	Nie dotyczy	
RAK 3+4 IP/EKO	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol, Octan Z-11-tetradecenylu, Octan n-tetradecylu atranilowe diamidy 28	Nie dotyczy	500 dyspenserów	1	Nie dotyczy			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xen Tari WG IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6dni	Nie stosować w dniu zbioru	Olej parafinowy - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie.
		Agree 50 WG IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>aizawai</i> szczep GC-91 –500 g w 1kg (preparat bakteryjny) związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	2,0 kg/ha	3/7 dni	Nie dotyczy	
		BioBit IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		DiPel DF IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		Florbac IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		BioDor Pro IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC Panonychus ulmi I INNE GATUNKI PRZĘDZIORKÓW Tetranychidae	Wprowadzać do sadu drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae w celu ograniczenia liczebności przędziorków i szpecieli. Próg szkodliwości - 3 i więcej form ruchomych na liść	NATURALIS IP/EKO	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)* * zawiera nie mniej niż 2,3 x 10 ⁷ żywochnych spor/ml UNF	Działa kontaktowo	1,0 – 2,0 l/ha	5/5 dni	Nie stosować w dniu zbioru	NATURALIS – zarejestrowany do zwalczania przędziorka chmielowca. Treol 770 EC stosować wczesną wiosną, krótko przed rozpoczęciem wylęgania się larw przędziorka owocowca z jaj zimowych. Olej parafinowy - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie. <i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 5 razy w sezonie.
		Treol 770 EC IP/EKO	olej parafinowy 770 g <i>oleje roślinne</i> UN	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	1,50%	1	Nie dotyczy	
		Fitter IP/EKO	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l UN	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10,0 l/ha	9/7dni	1	
		Siltac EC IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K-PAK IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.
		Next Pro IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Neudosan IP/EKO	Sól potasowa kwasów tłuszczowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy	
		Emulpar 940 EC IP/EKO	olej rydzowy 94% oleje roślinne UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przedziorków/7-10 dni	Nie dotyczy	

WZROST ZAWIĄZKÓW OD OPADANIA PŁATKÓW KWIATOWYCH DO ZBIORU OWOCÓW
faza 6 – opadanie płatków (BBCH 67–69), faza 7 – wzrost zawiązków owocowych DO ZBIORU (BBCH 71–87)

KWIECIAK PESTKOWIEC <i>Anthonomus (Furcipes)rectirostris</i>	Próg szkodliwości - 5 chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi.	Geri 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	W zagrożonych sadach zabieg wykonać tuż po kwitnieniu. Próg zagrożenia wynosi 5 i więcej chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi. *Stosować jeden z wymienionych środków Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026 Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.
		Sekil 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Mospilan 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Mospilan Classic* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Lanmos 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Aceiro 20 SP IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Mantos 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14		
		Tazonit 20 SI* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14		
		Leptosar 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14		
PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC <i>Tetranychus urticae</i> I INNE GATUNKI PRZĘDZIORKÓW Tetranychidae ORAZ SZPECIELE Eriophyoidae	Wprowadzać do sadu drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae w celu ograniczenia liczebności przędziorków i szpecieli. Próg szkodliwości - 3 i więcej form ruchomych na 1 liść.	Kanemite 150 SC IP	acekwincyl 164 g substancje z grupy <i>nieklasyfikowanej</i> 20 B	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	1,8 l/ha	1	21	Zabieg wykonać po kwitnieniu, po przekroczeniu progu szkodliwości (5-7 form ruchomych na 1 liść). Środek jest zarejestrowany do zwalczania przędziorków w uprawach małoobszarowych NATURALIS – zarejestrowany do zwalczania przędziorka chmielowca. Acekwincyl - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie. <i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 5 razy w sezonie. Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.	
		NATURALIS IP/EKO	Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)* * zawiera nie mniej niż 2,3 x 10 ⁷ żywych spor/ml UNF	Działa kontaktowo	1,0 – 2,0 l/ha	5/5 dni	Nie stosować w dniu zbioru		
		Fitter IP/EKO	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l UN	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10,0 l/ha	9/7dni	1		
		Next Pro IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy		
		Siltac EC IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy		
		K-PAK IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy		
		Neudosan IP/EKO	Sól potasowa kwasów tłuszczowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy		
		Emulpar 940 EC IP/EKO	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przędziorków/7- 10 dni	Nie dotyczy		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NASIONNICA TRZEŚNIÓWKA <i>Rhagoletis cerasi</i>	Pasożyty poczwarek z rodziny Ichneumonidae ograniczają tego szkodnika. Próg szkodliwości - średnio 2 muchy odłowione na 1 pułapkę lepową.	Decis Mega 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	Monitorować wylot much z wykorzystaniem żółtych pułapek lepowych, które należy zawiesić w sadzie w połowie maja. Zabieg wykonać po 5-7 dniach regularnego odłowu much na pułapki i powtórzyć po 10-14 dniach. *Stosować jeden z wymienionych środków. **Stosować jeden z wymienionych środków. ***Stosować jeden z wymienionych środków. Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026 IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Delta Forte, Dyno 2,5 EC, Poleci 2,5 EC, Matrix 2.5 EC, Spruzit koncentrat na szkodniki są toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady. Preparaty Los Ovados 200 SE, Aceptir 200 SE i Apis 200 SE są zarejestrowane do zwalczania nasionnicy w uprawach małoobszarowych. Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2. Cyjanotraniliprol - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.
		Delta 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	
		Deka 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Desha 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Delta Forte* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Dyno 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Poleci 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Lanmos 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan Classic** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14	
		Sekil 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14	
		Aceplan 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 l/ha	1	14	
		Kobe 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14	
Geri 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Aceptir 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 5 razy w sezonie.
		Apis 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Los Ovados 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Exirel 100 SE*** IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 28	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Irazu 100 SE*** IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 28	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Decis Trap Cerasi IP	deltametryna 0,015g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	100 pułapek	1	Nie dotyczy	
		Surround WP Crop Protectant IP	950 g krzemianu glinu (kaolin) UN	Działa odstraszaąco na roślinie powierzchniowo	30 kg/ha	8/7 dni	Nie dotyczy	
		NATURALIS IP/EKO	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)* * zawiera nie mniej niż 2,3 x 10 ⁷ żywotnych spor/ml UNF	Działa kontaktowo	1,0 – 2,0 l/ha	5/5 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
MSZYCE Aphididae	Usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez mszyce pędów zmniejsza liczebność populacji mszyc. Drapieżce: biedronkowate, bzygowate, siatkoskrzydłe np. złotooki, pluskwiaki różnoskrzydłe np. dziubałkowate. Parazytoidy: pasożytnicze błonkówki np. mszycarzowate.	Decis Mega 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	Zwalczać po pojawieniu się szkodnika.
		Delta 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	*Stosować jeden z wymienionych środków.
		Deka 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 /ha	1	45	**Stosować jeden z wymienionych środków.
								*** Stosować jeden z wymienionych środków

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Próg szkodliwości - 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew.	Desha 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Delta Forte, Dyno 2,5 EC, Polec 2,5 EC, Matrix 2,5 EC, Spruzit koncentrat na szkodniki są toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.
		Delta Forte* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Dyno 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Polec 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Spruzit Koncentrat na Szkodniki IP**/EKO	pyretryna 9,17 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A + olej rzepakowy 82,5% <i>Oleje roślinne</i> UN	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5 l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	3	Preparaty Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Miros 20 SP, Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Kobe 20 SP, Los Ovados 200 SE, Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Geri 20 SP, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha. Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2. Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2. Flonikamid - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2. Pyretryna + oleje roślinne - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie. Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.
		Lanmos 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan Classic** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Sekil 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Geri 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Aceptir 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Apis 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Los Ovados 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Teppeki 50 WG*** IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Afinto*** IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Hinode*** IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Mainman 50 WG*** IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Siltac EC IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		K-PAK IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Next Pro IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Emulpar 940 EC IP/EKO	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przędziorków/7-10 dni	Nie dotyczy	
		Surround WP Crop Protectant IP	950 g krzemianu glinu (kaolin) UN	Działa odstraszańco na roślinie powierzchniowo	30 kg/ha	8/7 dni	Nie dotyczy	
		Neudosan IP/EKO	Sól potasowa kwasów tłuszczowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy	
		Fitter IP/EKO	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l UN	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10,0 l/ha	9/7dni	1	
ZWÓJKOWKI LIŚCIOWE <i>Tortricidae</i>	Stosowanie środków pochodzenia naturalnego do zwalczania gąsienic.	Sekil 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	Stosować jeden z wymienionych środków

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Timber 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	<p>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</p> <p>Preparaty, Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Miros 20 SP, Sekil 20 SP, Kobe 20 SP, Geri 20 SP, Marabel 20 SP, są zarejestrowane do zwalczania zwójków liściowych oraz innych gąsienic zjadających liście w uprawach małoobszarowych i stosować je można łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha.</p> <p>Preparat XenTari WG, BioBit, DiPel DF, Frorabac należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).</p> <p>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2</p> <p>Cyjanotraniliprol - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</p> <p>Bacillus thuringiensis var. aizawai, szczep ABTS 1857- maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 10 razy w sezonie.</p> <p>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep ABTS 351 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie.</p> <p>Bacillus thuringiensis var. aizawai, szczep GC-91- maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie</p>
		Kobe 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Geri 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Lanmos 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Marabel 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Mospilan 20 SP* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Mospilan Classic* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Exirel 100 SE IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 28	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7	
		Irazu 100 SE IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 28	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7	
		Xen Tari WG IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		Agree 50 WG IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>aizawai</i> szczep GC-91 –500 g w 1kg (preparat bakteryjny) związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	2,0 kg/ha	3/7 dni	Nie dotyczy	
		BioBit IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		DiPel DF IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Florbac IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związku mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		BioDor Pro IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związku mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
SLUZOWNICA CIEMNA <i>Caliroa limacina</i>	Próg szkodliwości - 40 larw szkodnika w próbie 200 liści.	Sekil 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	Zwalczać po stwierdzeniu larw szkodnika na liściach (próg zagrożenia wynosi 40 larw szkodnika w 200 liściach). Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026 *Stosować jeden z wymienionych środków. IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparat Spruzit koncentrat na szkodniki jest toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z jego użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady. Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2. Pyretryna + oleje roślinne - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie.
		Timber 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Geril 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Lanmos 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Mospilan 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Mospilan Classic* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Spruzit Koncentrat na Szkodniki IP**/EKO	pyretryna 9,17 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A +olej rzepakowy 82,5% <i>Oleje roślinne</i> UN	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	3	
TARCZNIK NISZCZYCIEL <i>Diaspidiotus perniciosus</i> INNE CZERWCE	Exirel 100 SE* IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 2B	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7	*Stosować jeden z wymienionych środków.	
	Irazu 100 SE* IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 2B	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7		
MUSZKA PLAMOSKRZYDŁA <i>Drosophila suzuki</i>	Masowe odłowy, minimum 150-200 pułapek z substancją wabiącą na 1 ha sadu.	Decis Mega 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	Prowadzić monitoring obecności i przebiegu lotu muchówek szkodnika przy pomocy dostępnych pułapek z substancją wabiącą, np. Drosinal. Zwalczać przed zbiorem owoców (z zachowaniem karencji), po 3-4 dniach od
		Delta 50 EW* IP**	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Deka 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	<p>stwierdzenia szkodnika w pułapkach.</p> <p>*Stosować jeden z wymienionych środków.</p> <p>**Stosować jeden z wymienionych środków.</p> <p>IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Delta Force, Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Dyno 2,5 EC, Poleci 2,5 EC i Matrix 2,5 EC są toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.</p> <p>Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</p> <p>Cyjanotraniliprol - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</p>
		Delta Forte* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Desha 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Dyno 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Poleci 2,5 EC * IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Exirel 100 SE** IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 28	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Irazu 100 SE** IP	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) 28	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Decis Trap Droso IP	deltametryna 0,015g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	100 pułapek	1	Nie dotyczy	

PO ZBIORZE OWOCÓW

PRZĘDZIORKI <i>Tetranychidae</i> ORAZ SZPECIELE <i>Eriophyoidea</i>	Próg szkodliwości - 3 i więcej form ruchomych na 1 liść.	Next Pro IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy
		Siltac EC IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy
		K-PAK IP	Mieszanina związków silikonowych UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy
		Emulpar 940 EC IP/EKO	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> UN	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przędziorków/7-10 dni	Nie dotyczy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŚLUZOWNICA CIEMNA <i>Caliroa limacina</i>	Próg szkodliwości - 40 larw szkodnika w próbie 200 liści.	Spruzit Koncentrat na Szkodniki IP**/EKO	pyretryna 9,17 g <i>pyreteroidy i pyretryny</i> 3A + olej rzepakowy 82,5% <i>Oleje roślinne</i> UN	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5 l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	Nie dotyczy	IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparat Spruzit koncentrat na szkodniki jest toksyczne dla pszczół, dlatego zabiegi z jego użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.