



## PROGRAM OCHRONY WIŚNI



**Opracowany** w ramach zadania 2.3.

*„Analiza możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin ogrodniczych dla upraw małoobszarowych”*

Program Wieloletni na lata 2015-2020  
finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

**Aktualizacja:** w ramach zadania celowego 6.2

*„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”*  
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2026 r.

**Skierniewice, 2026**

**Program opracowany pod redakcją:**

dr hab. Grażyny Soiki prof. IO

**Autorzy:**


dr Agata Broniarek-Niemiec, dr Hanna Bryk, dr hab. Mirosława Cieślińska prof.

IO (fungicydy)

dr hab. Jerzy Lisek prof. IO (herbicydy)

dr Michał Hołdaj, mgr inż. Barbara Sobieszek (zoocydy)

## FAZY ROZWOJOWE (BBCH) (dla drzew pestkowych)



© 1994: BBA und IVA

### Klucz do określania faz rozwojowych roślin sadowniczych w skali BBCH

DRZEWA OWOCOWE - PESTKOWE		
Główna faza rozwojowa	Oznaczenie fazy BBCH	Charakterystyka: czereśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, morela
<b>Rozwój pąków 0</b>	00	Stan spoczynku, okres bezlistny: pąki liściowe i kwiatowe zamknięte i okryte ciemnobrązowymi łuskami
	01	Początek nabrzmiwania pąków (pąki liściowe), widoczne jasnobrązowe łuski z jasnymi brzegami
	03	Koniec nabrzmiwania pąków, łuski oddzielone, widoczne zmiany barwy na jasnozieloną
	09	Widoczne zielone końce liścia, odpadają brązowe łuski, pąki zamknięte w jasnozielonych łuskach
<b>Rozwój liści 1</b>	10	Pęknięcie pąków, oddzielają się pierwsze liście
	11	Rozwinięty pierwszy liść, widoczna oś rozwoju pędu
	19	Pierwsze liście całkowicie wykształcone
<b>Rozwój pędów</b>	31	Początek wzrostu pędu, widoczne osie rozwoju pędów

<b>z pąka szczytowego 3</b>	32	Pędy osiągają około 20% typowej długości
	33	Pędy osiągają około 30% typowej wielkości
	3...	Fazy trwają aż do ...
	39	Pędy osiągają około 90% typowej długości
<b>Rozwój kwiatostanu 5</b>	51	Pąki kwiatowe nabrzmiewają, lecz są zamknięte w jasnobrązowych łuskach
	53	Pęknięcie pąków: łuski oddzielone, widoczny jasnozielony pąk
	54	Kwiatostan zamknięty w jasnozielonych łuskach, jeżeli takie łuski zostały wytworzone (nie wszystkie uprawy)
	55	Widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (ciągle zamknięte) osadzone na krótkich szypułkach, zielone łuski lekko otwarte (faza zielonego pąka)
	56	Płatki kwiatów wydłużają się, działki kielicha zamknięte, oddzielają się pojedyncze kwiaty
	57	Działki kielicha otwarte, widoczne końce płatków, pojedyncze kwiaty z białymi lub różowymi płatkami, nadal zamknięte, początek fazy białego pąka
	59	Większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę
<b>Kwitnienie 6</b>	60	Pierwsze kwiaty otwarte
	61	Początek fazy kwitnienia, otwartych około 10% kwiatów
	62	Otwartych około 20% kwiatów
	63	Otwartych około 30% kwiatów
	64	Otwartych około 40% kwiatów
	65	Pełnia fazy kwitnienia: przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki
	67	Zasychanie kwiatów: większość płatków opada
	69	Koniec fazy kwitnienia: wszystkie płatki opadły
<b>Rozwój owoców 7</b>	71	Rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc
	72	Rozrastanie zalążni
	73	Opadania zawiązków nie zapylonych
	75	Owoc osiąga około połowę typowej wielkości
	76	Owoc osiąga około 60% typowej wielkości
	77	Owoc osiąga 70% typowej wielkości
	78	Owoc osiąga około 80% typowej wielkości
	79	Owoc osiąga około 90% typowej wielkości
<b>Dojrzewanie owoców i nasion 8</b>	81	Początek fazy dojrzewania, wybarwienie owoców
	85	Zaawansowane wybarwienie owoców
	87	Owoce dojrzałe do zbioru
	89	Owoce dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność
<b>Zamieranie, początek okresu spoczynku 9</b>	91	Zakończenie wzrostu pędów, ulistnienie ciągle żywo zielone
	92	Liście zaczynają się przebarwiać
	93	Początek opadania liści
	95	50% liści przebarwionych lub opadających
	97	Wszystkie liście opadły
	99	Zebrane owoce, okres spoczynku

Graficzne fazy rozwojowe i szczegółowy opis faz rozwojowych, podano wg: „Klucza do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH”, opracowanego przez grupę roboczą BBCH, w tłumaczeniu i adaptacji Kazimierza Adamczewskiego i Kingi Matysiak, wydanie III uzupełnione, IOR-PIB Poznań, 2011

## **KOMENTARZ**

W ochronie wiśni, podobnie jak innych roślin uprawnych, profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin zobowiązani są do stosowania integrowanego systemu ochrony roślin. Jego podstawą jest maksymalne wykorzystanie metod niechemicznych, które powinny być uzupełniane stosowaniem pestycydów wówczas, gdy oczekiwane straty ekonomiczne powodowane przez agrofagi będą wyższe niż koszt zabiegu. Głównym celem jest skuteczne, bezpieczne i opłacalne obniżenie populacji agrofagów do poziomu, przy którym nie wyrządzają one już szkód gospodarczych. Jest to możliwe poprzez regularne prowadzenie lustracji oraz prognozowanie pojawu agrofagów i oceny zagrożenia. W integrowanej ochronie roślin mogą być stosowane wszystkie środki aktualnie zarejestrowane dla danego gatunku roślin. Natomiast w Integrowanej Produkcji Roślin – systemie dobrowolnym i certyfikowanym – obowiązują dodatkowe ograniczenia ich użycia. Informacje na temat możliwości stosowania środków w Integrowanej Produkcji (IP) oraz produkcji ekologicznej (EKO) podano przy nazwie każdego preparatu.

Opracowany Program Ochrony Wiśni zawiera informacje dotyczące możliwości zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów występujących w sadach wiśniowych. Przedstawiono aktualnie zarejestrowane środki ochrony roślin, ich substancje aktywne, mechanizm działania oraz zalecane dawki. Podano także maksymalną liczbę zabiegów, możliwość selekcji form odpornych agrofaga na daną substancję, jej przynależność do grupy chemicznej (wg organizacji FRAC, IRAC i HRAC), częstotliwość wykonywania zabiegów oraz okres karencji. W poszczególnych fazach fenologicznych uwzględniono metody niechemiczne wspomagające ochronę, możliwe do zastosowania w tym terminie.

Podstawą powodzenia integrowanej ochrony wiśni jest zakładanie sadu z kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, co daje gwarancję jego zdrowotności od początku prowadzenia uprawy. Istotne znaczenie mają także wybór stanowiska, które powinno być wolne od patogenów i szkodników żyjących w glebie, a także uporczywych chwastów. Wskazana jest uprawa roślin fitosanitarnych (owies, żyto, gorczyca, kukurydza, gryka, rośliny bobowate), przynajmniej przez rok przed założeniem sadu. Należy dążyć do tego, aby rośliny fitosanitarne uprawiać w mieszankach, na przykład owies z seradelą czy żyto z koniczyną. Mieszanki roślin fitosanitarnych mają znacznie korzystniejsze działanie niż uprawa pojedynczego gatunku, ponieważ stymulują rozwój różnych mikroorganizmów glebowych.

**Uwaga:** środki, mające w etykiecie zapis „**stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych**” umożliwiają zwalczanie agrofagów (patogeny, szkodniki, chwasty) na roślinach sadowniczych, jednak odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność takich środków ochrony roślin ponosi wyłącznie ich użytkownik.

**Obowiązkiem każdego użytkownika środka ochrony roślin  
jest zapoznanie się z treścią etykiety, zamieszczonej  
na danym produkcie**

Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin, wymienionych w niniejszym programie, można znaleźć na stronie internetowej MRiRW:

<https://www.gov.pl/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>

CHWASTY (stan na 16.03.2026)								
Organizm szkodliwy (Pod nazwą organizmu szkodliwego link do "Metodyki sygnalizacji" o ile jest dostępna na Platformie)	Niechemiczne metody ochrony (Dla organizmu szkodliwego, grupy organizmów lub dla fazy rozwojowej – o ile są dostępne)	Środki ochrony roślin (W stosownych przypadkach oznaczenie EKO lub IP) + (Pod nazwą środka dlink do etykiety ze strony MRiRW)	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna HRAC	Działanie	Dawka kg(l)/ha (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach (Zgodnie z oceną eksperta o ile dotyczy: 1. Ochrona owadów zapylających; 2. Warunki pogodowe dot stosowania; 3. Terminy zabiegów; 4. Ograniczenia i zalecenia w stosowaniu w tym dot. IP; 5. Następstwo roślin; 6. Progi ekonomicznej szkodliwości; 7. Łączne stosowanie agrochemikaliów; 8. Rejestracja małoobszarowa*, itp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OD POCZĄTKU WEGETACJI DO CZERWCOWEGO OPADANIA ZAWIĄZKÓW (BBCH 00-73)</b>								
Jednoroczne chwasty jedno i dwuliścienne przed wschodami	Zwalczanie mechaniczne – uprawa gleby, koszenie; zwalczanie płomieniowe (palnikiem propanowym); gorąca woda; ściółkowanie gleby; rośliny okrywowe	<b>Stomp Aqua 455 CS</b> <b>Aquatoro</b> <b>Aquatos</b> <b>Symmach 455 CS</b> <b>Uni Aqua 455 CS</b> <b>Zapora Liquid 455 CS</b>	pendimetalina 455 g <i>dinitroaniliny</i> <b>3, dawniej K1</b>	Doglebowy	2,5-3,5 l/ha  lub dawki dzielone 2 x 1,75 l/ha	3/14	ND	Zabieg wykonywać na glebę wolną od chwastów, od drugiego roku po posadzeniu drzew. Dawki dzielone stosować od fazy różowego pąka (BBCH 57) do czerwcowego opadu zawiązków (BBCH 73). 14-dniowy minimalny odstęp między zabiegami odnosi się do dawek dzielonych. Zastosowanie małoobszarowe.  <b>Środek nie jest dopuszczony do stosowania w IP.</b>
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne po wschodach		<b>Fusilade Forte 150 EC IP</b> <b>Balatella Forte 150 EC IP</b> <b>Fortune IP</b> <b>Foster Forte 150 EC IP</b> <b>Privium 125 EC IP</b>	fluazyfop-P-butylowy 150 g <i> pochodne kwasu arylofenoksypropionowego</i> <b>1, dawniej A</b>	Dolistny	0,6-1,7 l/ha	1	28	Na chwasty prosoвате w fazie 2–3 liści – krzewienie, w niższych z polecanych dawek, nieprzekraczających zwykle połowy dawek maksymalnych. Na perz w fazie 4–6 liści (ok. 15 cm wysokości). Zabieg wykonywać przy użyciu jednego ze środków, najlepiej wiosną. Zastosowanie małoobszarowe.  <b>IP - Środek stosować zgodnie z aktualną etykietą.</b>
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne po wschodach i przed wschodami		<b>Chikara 25 WG</b>	fiazasulfuron 250 g <i> pochodne sulfonilomocznika</i> <b>2, dawniej B</b>	Doglebowy i dolistny	0,08 kg/ha	1	ND	Środek układowy pobierany przez liście i korzenie roślin. Działanie następce (poprzez glebę) utrzymuje się do 3-4 miesięcy. Służy do selektywnego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich w sadzie starszym niż czteroletni. środek stosować od marca, w okresie intensywnego wzrostu chwastów, do fazy pełni fazy kwitnienia drzew: przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki (BBCH≤65). Zalecane jest stosowanie na chwasty o wysokości do 20 cm, wyłącznie w rzędach drzew (pod koronami), tak aby opryskiwana powierzchnia wynosiła 1/3 całkowitej powierzchni sadu. Przy aplikacji pasowej zabieg można wykonywać corocznie (maksymalnie 1 zabieg w sezonie). Przy aplikacji na całej powierzchni sadu zabieg można wykonywać nie częściej niż raz na dwa lata. Zastosowanie małoobszarowe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Środek nie jest dopuszczony do stosowania w IP.
<b>OD POCZĄTKU DO KOŃCA WEGETACJI (BBCH 00-99)</b>								
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwuliścienne po wschodach	Zwalczanie mechaniczne – uprawa gleby, koszenie; zwalczanie płomieniowe (palnikiem propanowym); gorąca woda; ściółkowanie gleby; rośliny okrywowe	Agrosar 360 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	3-8 l/ha	1	7	Opryskiwać podczas całego okresu wegetacji chwastów, od wiosny do późnej jesieni. Przed zabiegiem środkami zawierającymi glifosat, usunąć mechanicznie odrosty korzeniowe drzew. Używać opryskiwacza z osłonami. Singlif stosować w sadach przynajmniej dwuletnich. W ramach Dobrej Praktyki Rolniczej oraz integrowanej produkcji roślin wykonywać <b>nie więcej niż 2 zabiegi glifosatem w sezonie</b> , tak aby łączna dawka substancji czynnej nie przekroczyła 3,6 kg/ha, a minimalny odstęp czasu między zabiegami wyniósł 90 dni. Agrosar 360 SL – zastosowanie małoobszarowe.  IP <sup>3</sup> - Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.
		Boom Efekt 360 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-5 l/ha	2/56	42	
		Dominator Clean 360 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-5 l/ha	2/56	42	
		Glejt 360 IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-6 l/ha	1	7	
		Glyphomax Clean 360 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-5 l/ha	2/56	42	
		Hopper Clean 360 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-5 l/ha	2/56	42	
		Klinik Xtreme 540 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 540 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	1,2-2 l/ha	1	7	
		Landmaster Clean 360 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-5 l/ha	2/56	42	
		Rosate Clean 360 SL IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-5 l/ha	2/56	42	
		Singlif IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g pochodne glicyny <b>9, dawniej G</b>	Dolistny	2-6 l/ha	1	7	
		Orkan 350 SL IP <sup>1, 3</sup>	MCPA 90 g + glifosat 260 g fenoksykwasy + pochodne glicyny <b>4 + 9, dawniej O + G</b>	Dolistny	5-7 l/ha	1	7	Zabieg wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej 10°C. Dwuliścienne chwasty trwale opryskiwać w okresie intensywnego wzrostu, do początku ich kwitnienia lub po kwitnieniu. Mieszaniny MCPA i glifosatu zwalczają także skrzyp polny. Zastosowanie małoobszarowe.  IP <sup>1</sup> - Środek zawierający substancję z grupy kwasów karboksylowych, określaną jako syntetyczny odpowiednik regulatora wzrostu roślin. Ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie. Zastosowanie środka w dopuszczonej dawce wyklucza użycie innego preparatu handlowego, który zawiera tę samą substancję aktywną.  IP <sup>3</sup> - Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.
		Sprinter 350 SL IP <sup>1, 3</sup>	MCPA 90 g + glifosat 260 g fenoksykwasy + pochodne glicyny <b>4 + 9, dawniej O + G</b>	Dolistny	5-7 l/ha	1	7	
		Agrosar 360 SL + IP <sup>3</sup> Chwastox Extra 300 SL IP <sup>1</sup>	glifosat 360 g + MCPA 300 g pochodne glicyny + fenoksykwasy <b>9 + 4, dawniej G + O</b>	Dolistny	5 + 2,5 l/ha	1	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OD NABRZMIEWANIA PĄKÓW KWIATOWYCH DO POCZĄTKU WYBARWIANIA OWOCÓW (BBCH 51-81)</b>								
Jednoroczne i wieloletnie chwasty jedno- i dwuliścienne po wschodach		BGT IP <sup>3</sup>  Hadican IP <sup>3</sup>  Halvetic IP <sup>3</sup>	glifosat 180 g <i> pochodne glicyny</i> 9, dawniej G	Dolistny	4-6 l/ha	1	7	Opryskiwać zielone chwasty. W ramach Dobrej Praktyki Rolniczej oraz integrowanej produkcji roślin wykonywać <b>nie więcej niż 2 zabiegi glifosatem w sezonie</b> , tak aby łączna dawka substancji czynnej nie przekroczyła 3,6 kg/ha, a minimalny odstęp czasu między zabiegami wyniósł 90 dni. Zastosowanie małoobszarowe.  IP <sup>3</sup> - Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.
<b>OD ZAKOŃCZENIA WZROSTU PĘDÓW DO OPADNIĘCIA LIŚCI (BBCH 91-97)</b>								
Jednoroczne chwasty jedno i dwuliścienne przed wschodami	Zwalczanie mechaniczne– uprawa gleby, koszenie; zwalczanie płomieniowe (palnikiem propanowym); gorąca woda; ściółkowanie gleby; rośliny okrywowe	Stomp Aqua 455 CS Aquatoro Symmach 455 CS Uni Aqua 455 CS Zapora Liquid 455 CS	pendimetalina 455 g <i> dinitroaniliny</i> 3, dawniej K1	Doglebowy	3,5 l/ha	3	ND	Zabieg wykonywać na glebę wolną od chwastów, od drugiego roku po posadzeniu drzew. Zastosowanie małoobszarowe.  <b>Środek nie jest dopuszczony do stosowania w IP.</b>
		Gallup 360-K IP <sup>3</sup>  Barbarian Super 360K IP <sup>3</sup>  Koyote 360K IP <sup>3</sup>	glifosat 360 g <i> pochodne glicyny</i> 9, dawniej G	Dolistny	3-4 l/ha	1	7	Zabieg wykonywać po jesiennym opadnięciu liści z drzew (BBCH 97-99). Nie stosować w sadach młodszych niż dwuletnie. W ramach Dobrej Praktyki Rolniczej oraz integrowanej produkcji roślin wykonywać <b>nie więcej niż 2 zabiegi glifosatem w sezonie</b> , tak aby łączna dawka substancji czynnej nie przekroczyła 3,6 kg/ha, a minimalny odstęp czasu między zabiegami wyniósł 90 dni.  IP <sup>3</sup> - Środek zawierający glifosat. Stosować zgodnie z aktualną etykietą.
		Krypt 540 IP <sup>3</sup>	glifosat 540 g <i> pochodne glicyny</i> 9, dawniej G	Dolistny	2-2,7 l/ha	1	7	

**Uwaga dotycząca wszystkich herbicydów stosowanych w IP: przy tym systemie produkcji, okres karencji dla syntetycznych herbicydów nie powinien być krótszy niż 30 dni**

## CHOROBY (stan na dzień 30 marca 2026 roku)

Choroba / czynnik sprawczy	Niechemiczne metody ochrony	Środek ochrony roślin i możliwość stosowania w integrowanej produkcji (IP) oraz ekologicznej produkcji (EKO)	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna / FRAC	Działanie na roślinie i w stosunku do agrofaga	Dawka kg(l)/ha (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka /zabiegach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PRZED ZAŁOŻENIEM SADU</b>								
<b>GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE</b> <b>NICIENIE</b> <b>SZKODNIKI GLEBOWE</b>	Uprawa, jako przedplon, roślin z rodziny kapustowatych (rzodkiew), lub oleistych (gorczyca, rzepak). Lotne związki naturalnie występujące w tych roślinach uwalniają się do gleby i ograniczają populację patogenów w glebie	<b>Basamid</b> <b>IP</b>	dazomet 950 g <i>tiodiazyny</i>	pod wpływem wilgoci środek rozkłada się, wydzielając produkty gazowe np. izotiocyanian metylu	500 kg	1	nie dotyczy	Stosować od końca sierpnia do połowy października lub wiosną od końca marca do początku kwietnia, na mocno wilgotną glebę (około 60-70% pojemności wodnej), gdy zakres temperatur w górnej warstwie gleby wynosi 6-27°C (optymalnie 15-18°C), minimum 5 tygodni przed sadzeniem roślin. Na tym samym polu nie stosować tego ani żadnego innego produktu zawierającego dazomet częściej niż co 3 lata.
<b>OKRES BEZLISTNY</b>								
<b>Okres bezlistny (BBCH 51), nabrzmiewanie pąków (BBCH 52), pęknięcie pąków (BBCH 53-55)</b>								
<b>CHOROBY KORY I DREWNA</b> <b>LEUKOSTOMOZA</b> <i>Leucostoma cincta, L. persooni</i>  <b>SREBRZYSTOŚĆ LIŚCI</b> <i>Chondrostereum purpureum</i>	Zapobieganie uszkodzeniom mrozowym. Usuwanie porażonych pędów. Karczowanie i palenie silnie porażonych drzew. Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały. Najlepszym terminem cięcia jest okres tuż po zbiorach owoców.	Aktualnie brak zarejestrowanych środków do zwalczania tych chorób.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAK BAKTERYJNY</b> <i>Pseudomonas syringae</i>	- Ograniczanie źródła infekcji poprzez wycinanie silnie porażonych drzew i konarów. - Właściwe nawożenie (zwłaszcza azotowe). - Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały. Najlepszym terminem cięcia jest okres tuż po zbiorach owoców.	<b>Miedzan Extra 350 SC IP/EKO</b>	tlenochlorek miedzi 350 g <i>miedziowe</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	3,0 l	1	14	Stosować w fazie nabrzmiewania pąków (BBCH 51).
		<b>Miedzan 50 WP IP/EKO</b>	tlenochlorek miedzi 50 % <i>miedziowe</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	3,0 kg	1	14	Stosować od fazy nabrzmiewania pąków do początku kwitnienia (BBCH 51-61).
<b>PRZED KWITNIENIEM</b> <b>Początek fazy białego pąka (BBCH 57), biały pąk, większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 59)</b>								
<b>BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH</b> <i>Monilinia</i> spp.	- Ograniczanie źródła infekcji poprzez usuwanie porażonych pędów i owoców. - Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały. Najlepszym terminem cięcia jest okres tuż po zbiorach owoców.	<b>Switch 62,5 WG</b> <b>Bamse</b> <b>Botrefin</b> <b>Cypro-Fludio-Life</b> <b>Cypros</b> <b>Fludicyp Pro 62,5 WG</b> <b>LS Cypro-Fludio</b> <b>Mars 62,5 WG</b> <b>Pleśń Stop</b> <b>Puenta 62,5 WG</b> <b>Serenva</b> <b>Sextans 62,5 WG</b> <b>Sketch 62,5 WG</b> <b>Society</b> <b>Sorvin</b> <b>IP</b>	cyprodynil 375 g <i>anilinopirymidyny</i> <b>D1</b> fludioksnil 250 g <i>fenylopirole</i> <b>E2</b>	powierzchniowy i wglębny działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6–1,0 kg	2 / 7 dni	7	Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Airone_SC</b> <b>IP</b>	tlenochlorek miedzi (II) – 10% + wodorotlenek miedzi (II) – 10%	powierzchniowy, działa zapobiegawczo	3,0 l	2 / 14 dni	nie dotyczy	Stosować od końca nabrzmiewania pąków do fazy zielonego pąka (BBCH 03–55).
		<b>Badge WG</b> <b>IP</b>	tlenochlorek miedzi (II) – 14% + wodorotlenek miedzi (II) – 14% <i>miedziowe</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>		2,85 kg	2 / 14 dni	nie dotyczy	
		<b>Luna Experience 400 SC</b> <b>IP</b>	fluopyram 200 g <i>anilidy</i> <b>C 2</b> tebukonazol 200 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	układowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 59-89). Zaleca się wykonać zabieg na początku kwitnienia lub w pełni kwitnienia. Środek wykazuje najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12°C.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Revyona IP</b>	mefentriflukonazol 75 g/l triazole <b>G 1</b>	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,0 l/10 000 m <sup>2</sup> LWA	2 / 7 dni	3	Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe (faza zielonego pąka), do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 55-89).
		<b>Kenja 400 SC Zenby Izo4Fungi 400 SC IP</b>	izofetamid 400 g <i>fenylooksyetyloamidy</i> <b>C2</b>	powierzchniowy i wgłębny działa zapobiegawczo	0,9 l (0,7 l/ha LWA)	2 / 9 dni	nie dotyczy	Stosować od momentu rozchylenia się pierwszych pąków kwiatowych do fazy końca kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 57-69).
		<b>Scala IP</b>	pirymetanił 400 g <i>anilinopirymidyny</i> <b>D 1</b>	powierzchniowy i wgłębny działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,5 l (1,0 l/LWA)	2 / 7 dni	3	Stosować od fazy zielonego pąka kwiatowego, do momentu osiągnięcia dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 55-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		<b>Sercadis Neerion IP</b>	fluksapyroksad 300 g <i>karboksyamidy (SDHI)</i> <b>C 2</b>	układowy działa zapobiegawczo	0,2 l/LWA	2 / 7 dni	3	Stosować od początku rozwoju kwiatostanu, do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 57-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		<b>Taegro IP/EKO</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB24 – 130 g <i>Mikrobiologiczne BM Biologiczne, o wielu sposobach działania</i>	powierzchniowy, zakłóca rozwój patogena	0,185-0,370 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa.
<b>KWITNIENIE (BBCH 60-67)</b>								
<b>RAK BAKTERYJNY</b> <i>Pseudomonas syringae</i>	- Ograniczanie źródła infekcji przez wycinanie silnie porażonych drzew i konarów. - Właściwe nawożenie (zwłaszcza azotowe). - Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały. Najlepszym terminem cięcia jest okres tuż po zbiorach owoców.	<b>Miedzian Extra 350 SC IP/EKO</b>	tlenochlorek miedzi 350 g	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,5 l	2 / 7-10 dni	14	Stosować na początku fazy kwitnienia (BBCH 60).
		<b>Miedzian 50 WP IP/EKO</b>	tlenochlorek miedzi 50 % <i>miedziowe Kontaktowe o działaniu wielostronnym</i>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,5 kg	2 / 7-10 dni	14	Stosować od fazy pełnia kwitnienia do początkowej fazy wzrostu owoców – opadanie niezapylnych zawiązków (BBCH 65-73).
		<b>Serenade ASO Rhapsody IP/EKO</b>	<i>Bacillus subtilis</i> 13,96 g <b>Mikrobiologiczne</b>	kontaktowy działa zapobiegawczo	8,0 l	4 / 5 dni	nie dotyczy	Stosować zapobiegawczo od początku kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH</b> <i>Monilinia</i> spp.	- Ograniczanie źródła infekcji poprzez usuwanie porażonych pędów i owoców. - Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały.	<b>Horizon 250 EW</b> <b>Capetus 250 EC</b> <b>Clayton Tebucon 250 EW</b> <b>Furtado 250 EW</b> <b>Hades 250 EW</b> <b>Helicur 250 EW</b> <b>Legend 250 EW</b> <b>Tebaro 250 EW</b> <b>Tebu</b> <b>Tebu-Pro</b> <b>Tebucur</b> <b>Tobias Pro 250 EW</b> <b>Trion 250 EW</b> <b>IP</b>	tebukonazol 250g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	układowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,75 l	1	7	Stosować jednorazowo w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia (BBCH 60-65), w temperaturze powyżej 12°C.
		<b>Score 250 EC</b> <b>Dife-Life</b> <b>Difenofin</b> <b>Ditto 250 EC</b> <b>Falanga 250 EC</b> <b>Kicker 250 EC</b> <b>LS Difeno</b> <b>Mavita 250 EC</b> <b>Zbierz 250 EC</b> <b>IP</b>	difenokonazol 250 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	systemiczny, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,2 l	2 / 10 dni	14	Stosować na początku lub w pełni kwitnienia (BBCH 60-65), w temperaturze powyżej 12°C.  W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
		<b>Luna Experience 400 SC</b> <b>IP</b>	fluopyram 200 g <i>anilidy</i> <b>C 2</b> tebukonazol 200 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	układowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 59-89). Zaleca się wykonać zabieg na początku kwitnienia lub w pełni kwitnienia. Środek wykazuje najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12°C. Stosować tylko raz w sezonie.
		<b>Kenja 400 SC</b> <b>Zenby</b> <b>Izo4Fungi 400 SC</b> <b>IP</b>	izofetamid 400 g <i>fenylooksyetyloamidy</i> <b>C2</b>	powierzchniowy i wgłębny działa zapobiegawczo	0,9 l (0,7 l/ha LWA)	2 / 9 dni	nie dotyczy	Środek stosować zapobiegawczo, od momentu rozchylenia się pierwszych pąków kwiatowych do fazy końca kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 57-69).  Środek stosować poza okresami aktywności pszczół.
		<b>Signum 33 WG</b> <b>Boskal</b> <b>Cobalt</b> <b>Elithena</b> <b>Iryd</b> <b>Klaption 33 WG</b> <b>Kornet 33 WG</b> <b>Kosmo 33 WG</b> <b>Samar</b> <b>Spector 33 WG</b> <b>Vaita</b> <b>IP</b>	piraklostrobina 67 g <i>strobiluryny</i> <b>C 3</b> boskalid 267 g <i>anilidy</i> <b>C 2</b>	systemiczny, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,75–1,0 kg	2 / 5 dni	7	Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia (w okresie rozchylania się pierwszych pąków), drugi zabieg - w fazie pełni kwitnienia.
		<b>Revyona</b> <b>IP</b>	mefentriplukonazol 75 g/l <i>triazole</i> <b>G 1</b>	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,0 l/10 000 m <sup>2</sup> LWA	2 / 7 dni	3 dni	Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe (faza zielonego pąka), do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 55-89).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Switch 62,5 WG Bamse Botrefin Cypros Cypro-Fludio-Life Fludiocyp Pro 62,5 WG LS Cypro-Fludio Mars 62,5 WG Pleśń Stop Puenta 62,5 WG Serenva Sextans 62,5 WG Sketch 62,5 WG Society Sorvin IP	cyprodynil 375 g <i>anilinopirymidyny</i> D1 fludioksonil 250 g <i>fenylopiroliny</i> E2	powierzchniowy i wglębny działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6–1,0 kg	2 / 7 dni	7	Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą. Rejestracja małoobszarowa .
		Scala IP	pirymetanił 400 g <i>anilinopirymidyny</i> D 1	powierzchniowy i wglębny działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,5 l (1,0 l/LWA)	2 / 7 dni	3	Stosować od fazy zielonego pąka kwiatowego, do momentu osiągnięcia dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 55-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		Sercadis Neerion IP	fluksapyroksad 300 g <i>karboksamid</i> (SDHI) C 2	układowy działa zapobiegawczo	0,2 l/LWA	2 / 7 dni	3	Stosować od początku rozwoju kwiatostanu, do końca fazy dojrzwania owoców (BBCH 57-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		Prolectus 50 WG IP	fenpyrazamina 500 g <i>pirazole</i> G3	powierzchniowy i wglębny działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,8 kg	3 / 7 dni	1	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).  Rejestracja małoobszarowa.
		Serenade ASO Rhapsody IP/EKO	<i>Bacillus subtilis</i> 13,96 g <b>Mikrobiologiczne</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	8,0 l	4 / 5 dni	nie dotyczy	Środek stosować zapobiegawczo od początku kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzwania owoców (BBCH 51-85). Środek ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa
		Taegro IP/EKO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB24 – 130 g <i>Mikrobiologiczne</i> <b>BM Biologiczne, o wielu sposobach działania</b>	powierzchniowy, zakłóca rozwój patogena	0,185-0,370 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WZROST ZAWIĄZKÓW OD OPADANIA PŁATKÓW KWIATOWYCH DO DOJRZEWANIA OWOCÓW (BBCH 71-87)</b>								
<b>BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH</b> <i>Monilinia</i> spp.	- Ograniczanie źródła infekcji poprzez usuwanie porażonych pędów. - Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały.	<b>Prolectus 50 WG IP</b>	fenpyrazamina 500 g <i>pirazole</i> <b>G3</b>	powierzchniowy i głęboki działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,2 kg	3 / 7 dni	1	Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy BBCH 75 do fazy BBCH 87 najpóźniej 1 dzień przed zbiorem.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Revyona IP</b>	mefentriklukonazol 75 g/l <i>triazole</i> <b>G 1</b>	układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,0 l/10 000 m <sup>2</sup> LWA	2 / 7 dni	3 dni	Stosować od fazy, gdy widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe (faza zielonego pąka), do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 55-89).
		<b>Kadi ReNovo 72,5 WG            Kapduo ReNovo 72,5 WG            Kapster ReNovo 72,5 WG            Shavit Gold 72,5 WG IP</b>	kaptan – 700 g difenokonazol – 25 g <i>ftalimidy + triazole</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym + G 1</b>	powierzchniowy i układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,8-2,0 kg	3 / 5-10 dni	28	Stosować od początku rozwoju owoców do fazy rozrastania załązni (BBCH 71-72).  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Scala IP</b>	pirymetanił 400 g <i>anilinopirymidyny</i> <b>D 1</b>	powierzchniowy i głęboki działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,5 l (1,0 l/LWA)	2 / 7 dni	3	Stosować od fazy zielonego pąka kwiatowego, do momentu osiągnięcia dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 55-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		<b>Sercadis Neerion IP</b>	fluksapyroksad 300 g <i>karboksamidy (SDHI)</i> <b>C 2</b>	układowy działa zapobiegawczo	0,2 l/LWA	2 / 7 dni	3	Stosować od początku rozwoju kwiatostanu, do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 57-89), maksymalnie 2 razy w sezonie.
		<b>Serenade ASO Rhapsody IP/EKO</b>	<i>Bacillus subtilis</i> 13,96 g <b>Mikrobiologiczne</b>	kontaktowy działa zapobiegawczo	8,0 l	4 / 5 dni	nie dotyczy	Środek stosować zapobiegawczo do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Taegro IP/EKO</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB24 – 130 g <b>Mikrobiologiczne, o wielu sposobach działania</b>	powierzchniowy, zakłóca rozwój patogena	0,185-0,370 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Laminone Nutivax Plantivax Vaxiplant SL IP/EKO</b>	laminaryna – 45 g <i>polisacharydy</i> <b>P 04</b>	układowy, stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin	1,0 l	20 / 10 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować od fazy opadania niezapylnych zawiązków do fazy, kiedy rośliny wchodzi w okres spoczynku (BBCH 73-99)  Środki ograniczają występowanie choroby  Rejestracja małoobszarowa
<b>DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH</b> <i>Blumeriella jaapii</i>		<b>Syllit 65 WP IP</b>	dodyna 650 g <i>pochodne guanidyny</i> <b>Nieznany sposób działania U12</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,2 kg	4 / 7-10 dni	14	Stosować do 2 tygodni przed zbiorem (BBCH 79) i po zbiorze.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Efuzin 544 SC</b> <b>Syllit 544 SC</b> <b>IP</b>	dodyna 544 g <i>po pochodne guanidyny</i> <b>Nieznany sposób</b> <b>działania U12</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,25 l	2 / 7 dni	14	Stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 60-79) i/lub po zbiorach
		<b>Dodifun SC</b> <b>IP</b>	dodyna 400 g <i>po pochodne guanidyny</i> <b>Nieznany sposób</b> <b>działania U12</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,7 l (1,125 l/ha LWA)	2 / 7-10 dni	14	Stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia objawów choroby, po kwitnieniu do fazy, kiedy owoc osiąga około połowy typowej wielkości (BBCH 71-75), i/lub po zbiorach z początkiem okresu spoczynku do fazy, kiedy opadną wszystkie liście (BBCH 90-97)
		<b>Luna Experience 400 SC</b> <b>IP</b>	fluopyram 200 g <i>anilidy</i> <b>C 2</b> tebukonazol 200 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	układowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować po kwitnieniu (BBCH > 69), zgodnie z sygnalizacją, tylko raz w sezonie. Środek wykazuje najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12°C.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Luna Sensation 500 SC</b> <b>IP</b>	fluopyram 250 g + trifloksystrobina 250 g <i>pirydynyloetylobenza</i> <i>midy (SDHI) +</i> <i>strobiluryny</i> <b>C2+C3</b>	powierzchniowy, układowy i mezostemiczny, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,3 l	2 / 7 dni	7	Stosować od fazy zasychania kwiatów, do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 67-87).  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Bluna 250 EC</b> <b>Ferten 250 EC</b> <b>Hajmon 250 EC</b> <b>Tores 250 EC</b> <b>Valor 250 EC</b> <b>Wezen 250 EC</b> <b>IP</b>	difenokonazol 250 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	systemiczny, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,2 l	2 / 14 dni	28	Stosować po kwitnieniu, od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy, gdy owoc osiągnie 80% typowej wielkości (BBCH 71-78).  Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		<b>Kadi ReNovo 72,5 WG</b> <b>Kapduo ReNovo 72,5 WG</b> <b>Kapster ReNovo 72,5 WG</b> <b>Shavit Gold 72,5 WG</b> <b>IP</b>	kaptan – 700 g difenokonazol – 25 g <i>ftalimidy + triazole</i> <b>Kontaktowe o</b> <b>działaniu</b> <b>wielostronnym + G</b> <b>1</b>	powierzchniowy i układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,8-2,0 kg	3 / 10-14 dni	28	Stosować od fazy rozwoju zalążni do fazy, gdy owoc osiągnie około 60% wielkości (BBCH 71-76).  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Cort 80 WDG</b> <b>Kaptan Gold 80 WG</b> <b>Merpan 80 WDG</b> <b>Multicap</b> <b>Rebaate 80 WG</b> <b>IP</b>	kaptan 800 g <i>ftalimidy</i> <b>Kontaktowe o</b> <b>działaniu</b> <b>wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 10 dni	21	Stosować od fazy rozwoju zalążni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH >71).
		<b>Ei Cappel 80 WG</b> <b>Kaplan 80 WG</b> <b>Pastor 80 WG</b> <b>Whitable</b> <b>IP</b>	kaptan 800 g <i>ftalimidy</i> <b>Kontaktowe o</b> <b>działaniu</b> <b>wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 7-10 dni	14	Stosować od fazy początku wzrostu owoców do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-81).  Rejestracja małoobszarowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAK BAKTERYJNY</b> <i>Pseudomonas syringae</i>	- Ograniczanie źródła infekcji przez wycinanie silnie porażonych drzew i konarów. - Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały.	<b>Miedzan 50 WP IP/EKO</b>	tlenochlorek miedzi 50 % <i>miedziowe</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,5 kg	2 / 7-10 dni	14	Stosować do fazy opadania niezapylnych zawiązków (BBCH 73).
		<b>Serenade ASO Rapsody IP/EKO</b>	<i>Bacillus subtilis</i> 13,96 g <i>mikrobiologiczne</i>	kontaktowy działa zapobiegawczo	8,0 l	4 / 5 dni	nie dotyczy	Stosować zapobiegawczo do końca fazy zaawansowanego dojrzwania owoców (BBCH 51-85). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby. Rejestracja małoobszarowa.
<b>DZIURKOWATOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH</b> <i>Clasterosporium carpophilum</i>		<b>Luna Experience 400 SC IP</b>	fluopyram 200 g <i>anilidy</i> <b>C 2</b> tebukonazol 200 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	układowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować po kwitnieniu (BBCH > 69), tylko raz w sezonie. Środek wykazuje najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12°C.  Rejestracja małoobszarowa.
<b>GORZKA ZGNILIZNA WIŚNI</b> <i>Glomerella cingulata</i>	- Usuwanie i niszczenie porażonych i zaschniętych owoców (mumii), które są źródłem infekcji w kolejnym sezonie. - Unikanie zagęszczenia korony poprzez prawidłowe cięcie drzew.	<b>Captan 80 WDG Malvin 80 WDG IP</b>	kaptan 800 g, <i>ftalimidy</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 7 dni	21	Stosować od fazy rozwoju załąźni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH>71).
		<b>Cort 80 WDG Kaptan Gold 80 WG Merpan 80 WDG Multicap Rebaate 80 WG IP</b>	kaptan 800 g, <i>ftalimidy</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 10 dni	21	Środek stosować od fazy rozwoju załąźni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH>71).
		<b>Ei Cappel 80 WG Kapelan 80 WG Kaplan 80 WG Pastor 80 WG Whitable IP</b>	kaptan 800 g, <i>ftalimidy</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 7-10 dni	14	Stosować od fazy początku wzrostu owoców do początku fazy dojrzwania owoców (BBCH 71-81).  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Kaptan Zawiesinowy 50 WP Winner 50 WP IP</b>	kaptan 500 g, <i>ftalimidy</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	3,0 kg	4 / 10-14 dni	14	Stosować po kwitnieniu, od fazy rozrastania załąźni do początku dojrzwania owoców (BBCH 72 - 81).  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Kadi ReNovo 72,5 WG Kapduo ReNovo 72,5 WG Kapster ReNovo 72,5 WG Shavit Gold 72,5 WG IP</b>	kaptan – 700 g difenokonazol – 25 g <i>ftalimidy + triazole</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym + G 1</b>	powierzchniowy i układowy, działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,8-2,0 kg	3 / 10-14 dni	28	Stosować od fazy rozwoju załąźni do początku fazy dojrzwania owoców (BBCH 71-81).  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Luna Experience 400 SC IP</b>	fluopyram 200 g <i>anilidy</i> <b>C 2</b> tebukonazol 200 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	układowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować co najmniej 7 dni przed zbiorem (BBCH 76 - 85), tylko raz w sezonie. Środek wykazuje najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12°C.  Rejestracja małoobszarowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Laminone</b> <b>Nutivax</b> <b>Plantivax</b> <b>Vaxiplant SL</b> <b>IP/EKO</b>	laminaryna – 45 g <i>polisacharydy</i> <b>P 04</b>	układowy, stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin	1,0 l	20 / 10 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować od fazy opadania niezapylnych zawiązków do fazy, kiedy rośliny wchodzą w okres spoczynku (BBCH 73-99)  Środki ograniczają występowanie choroby  Rejestracja małoobszarowa
<b>SZARA PLEŚŃ</b> <i>Botrytis cinerea</i>	- Unikanie zagęszczenia korony poprzez prawidłowe cięcie drzew. - Zapobieganie pękaniu owoców poprzez opryskiwanie nawozami wapniowymi.	<b>Luna Experience 400 SC</b> <b>IP</b>	fluopyram 200 g <i>anilidy</i> <b>C 2</b> tebukonazol 200 g <i>triazole (IBE)</i> <b>G 1</b>	układowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	0,6 l	1	7	Stosować po kwitnieniu (BBCH > 69), tylko raz w sezonie. Środek wykazuje najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12°C.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Taegro</b> <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB24 – 130 g <b>Mikrobiologiczne</b> <b>BM Biologiczne, o</b> <b>wielu sposobach</b> <b>działania</b>	powierzchniowy, zakłóca rozwój patogena	0,185-0,370 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Serifel</b> <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MB1600 – 11% <b>Mikrobiologiczne</b> <b>BM Biologiczne, o</b> <b>wielu sposobach</b> <b>działania</b>	powierzchniowy, zakłóca kiełkowanie zarodników i rozwój patogena	0,5 kg	10 / 7 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować od początku fazy rozwoju pędów, do początku fazy dojrzewanía owoców (BBCH 31-81). Środek mikrobiologiczny, ogranicza występowanie choroby.  Rejestracja małoobszarowa.
		<b>Laminone</b> <b>Nutivax</b> <b>Plantivax</b> <b>Vaxiplant SL</b> <b>IP/EKO</b>	laminaryna – 45 g <i>polisacharydy</i> <b>P 04</b>	układowy, stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin	1,0 l	20 / 10 dni	nie stosować w dniu zbioru	Stosować od fazy opadania niezapylnych zawiązków do fazy, kiedy rośliny wchodzą w okres spoczynku (BBCH 73-99)  Środki ograniczają występowanie choroby  Rejestracja małoobszarowa
<b>PO ZBIORZE OWOCÓW (BBCH 91-99)</b>								
<b>CHOROBY PRZECHOWALNICZE:</b>  <b>BRUNATNA ZGNILIZNA</b> <i>Monilinia</i> spp. <b>SZARA PLEŚŃ</b> <i>Botrytis cinerea</i> <b>MIEKKA ZGNILIZNA</b> <i>Rhizopus</i> sp.		<b>Scholar</b> <b>IP</b>	fludioksonil 230 g <i>fenylopirole</i> <b>E 2</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	200-300 ml/100 l wody	1	nie dotyczy	Zraszać lub zanurzać zebrane owoce w cieczy użytkowej przed ich przechowywaniem.
<b>DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI DRZEW</b> <b>PESTKOWYCH</b> <i>Blumeriella jaapii</i>	- Ograniczanie źródła infekcji poprzez wygrabianie i niszczenie opadłych liści. - Unikanie zagęszczenia korony poprzez prawidłowe cięcie drzew.	<b>Syllit 65 WP</b> <b>IP</b>	dodyna 650 g <i>pochodne guanidyny</i> <b>Nieznany sposób</b> <b>działania U12</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,2 kg	4 / 7-10 dni		Stosować po zbiorze owoców w lata z dużą ilością opadów, gdy porażonych jest ponad 10% liści.
		<b>Efuzin 544 SC</b> <b>Syllit 544 SC</b> <b>IP</b>	dodyna 544 g <i>pochodne guanidyny</i> <b>Nieznany sposób</b> <b>działania U12</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,25 l	2 / 7 dni		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Dodifun SC IP</b>	dodyna 400 g <i> pochodne guanidyny</i> <b>Nieznany sposób działania U12</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo i interwencyjnie	1,7 l (1,125 l/ha LWA)	2 / 7-10 dni		Stosować po zbiorze, z początkiem okresu spoczynku do fazy, kiedy opadną wszystkie liście (BBCH 90-97)
		<b>Kaptan Gold 80 WG Merpan 80 WDG Multicap Rebaate 80 WG IP</b>	kaptan 800 g, <i>ftalimidy</i> <b>Kontaktowe o działaniu wielostronnym</b>	powierzchniowy działa zapobiegawczo	1,9 kg	3 / 10 dni		Stosować po zbiorze owoców w lata z dużą ilością opadów, gdy porażonych jest ponad 10% liści.
<b>RAK BAKTERYJNY</b> <i>Pseudomonas syringae</i>	- Ograniczanie źródła infekcji poprzez wycinanie silnie porażonych drzew i konarów. - Cięcie drzew przeprowadzać podczas suchej i słonecznej pogody, aby powstające rany jak najszybciej wysychały. Najlepszym terminem cięcia jest okres tuż po zbiorach owoców.	Aktualnie brak zarejestrowanych środków do zwalczania choroby w tym terminie.						

### SZKODNIKI (stan na dzień 23.03.2026)

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony Progi ekonomicznej szkodliwości	Środek ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość / grupa chemiczna / FRAC	Działanie na roślinie i agrofaga	Dawka kg(l)/ha (stężenie %)	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### PRZED ZAŁOŻENIEM SADU

<b>DRUTOWCE</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Ochrona organizmów pożytecznych.</b> <b>Próg szkodliwości - brak</b>	SoilProtect 0,5 GR* <b>IP</b>	Teflutrya 5g <i>Pyretroidy</i> <b>3A</b>	Działa gazowo, kontaktowo i żołądkowo	15 kg/ha	1	Nie wymagany	Stosować w bruzdę przez sadzeniem drzew.
---	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	----------	---	--------------	--

#### PRZED KWITNIENIEM faza 1 – okres bezlistny (BBCH 51) do faza 4 –biały pąk (BBCH 59)

<b>LICINEK TARNINACZEK</b> <i>Argresthia ephippiella</i>	Ochrona organizmów pożytecznych. Pasożyty poczwarek oraz ptaki ograniczają tego szkodnika.  <b>Próg szkodliwości - 10 paków z gąsienicami</b>	Mospilan 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	Opryskiwać w fazie 2-3, jeżeli w poprzednim roku obserwowano więcej niż 5% uszkodzonych kwiatów.  *Stosować jeden z wymienionych środków.  <b>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</b>  <b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2</b>
		Mospilan Classic* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Lanmos 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Sekil 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Geri 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Aceiro 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Mantos 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tazonit 20 SI* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g neonikotynoidy <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Leptosar 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g neonikotynoidy <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
<b>MSZYCE</b> Aphididae	Usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez mszyce pędów zmniejsza liczebność populacji tego szkodnika. Ochrona organizmów pożytecznych, które mają duży udział w ograniczaniu liczebności mszyc, m.in. biedronkowate, bzygowate, siatkoskrzydłe (złotooki), pluskwiaki, pasożytnicze blonkówki).  <b>Próg szkodliwości - 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew</b>	Decis Mega 50 EW* <b>IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	Zwalczać po stwierdzeniu szkodnika.  *Stosować jeden z wymienionych środków.  **Stosować jeden z wymienionych środków.  ***Stosować jeden z wymienionych środków.
		Delta 50 EW* <b>IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	
		Deka 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Desha 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Delta Forte* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Poleci 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Dyno 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Leptosar 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g neonikotynoidy <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Aceiro 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g neonikotynoidy <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Mantos 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g neonikotynoidy <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Tazonit 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g neonikotynoidy <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
							Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026  IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Delta Forte, Dyno 2,5 EC, Poleci 2,5 EC, Matrix 2,5 EC są zarejestrowane do zwalczania mszyc w uprawach małoobszarowych oraz są toksyczne dla pszczół, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.  Preparaty Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Geri 20 SP, Kobe 20 SP Lanmos 20 SP i Timber 20SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha.  <b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mospilan 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.  Flonikamid - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.  Pyretryna + oleje roślinne - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie.  Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.  Olej parafinowy - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie.
		Mospilan Classic** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Geru 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Sekil 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Lanmos 20 SP* IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Teppeki 50 WG IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Afinto IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Hinode IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Mainman 50 WG IP	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> 1A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Surround WP Crop Protectant IP	950 g krzemianu glinu (kaolin) UN	Działa odstraszańco na roślinie powierzchniowo	30 kg/ha	8/7 dni	Nie dotyczy	
		Spruzit Koncentrat na Szkodniki ** IP/EKO	pyretryna 9,17 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A +olej rzepakowy 82,5% <i>Oleje roślinne</i> UN	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5 l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	3	
		Fitter IP/EKO	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l UN	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10 l/ha	9/7dni	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Treol 770 EC <b>IP/EKO</b>	olej parafinowy 770 g <i>oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	1,50%	1	Nie dotyczy	
		Neudosan <b>IP/EKO</b>	Sól potasowa kwasów tłuszczowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy	
		Emulpar <sup>®</sup> 940 EC <b>IP/EKO</b>	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przedziorków/7-10 dni	Nie dotyczy	
		K-PAK <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Next Pro <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Loksan EC <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Siltac EC <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
<b>ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE</b> Tortricidae <b>I INNE GAŚNIENICE ZJADAJĄCE LIŚCIE</b>	Stosowanie środków pochodzenia naturalnego do zwalczania gąsienic.  <b>Próg szkodliwości - 6 gąsienic na 200 rozet</b>	Sekil 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	W razie potrzeby, opryskiwać przed kwitnieniem, najpóźniej w fazie białego pąka. Próg zagrożenia – 3% rozet zasiedlonych przez gąsienice. *Stosować jeden z wymienionych środków
		Timber 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	<b>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</b>
		Kobe 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Gerl 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	Preparaty Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Gerl 20 SP, Kobe 20 SP Lanmos 20 SP i Timber 20SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha.
		Lanmos 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Mospilan 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	Preparat XenTari WG, BioBit, DiPel DF, Frorabac należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mospilan Classic* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).
		Leptosar 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	2/7dni	14	Dyspensery feromonowe należy rozwiesić przed pojawieniem się pierwszych motyli.
		Aceiro 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	Agree 50 WG - stosować od fazy pęknięcia pąka BBCH 53 Rak 3+4 można stosować tylko do zwalczania zwójki siatkoweczki.
		Mantos 200 SL* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	<b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2</b>
		Tazonit 20 SI* IP	acetamipryd 200 g neonikotynoidy 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS 1857- <b>maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 10 razy w sezonie.</b>
		Isomate CLS IP/EKO	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol, dodekano-1-ol, tetradekano-1-ol, Octan (Z)-11-tetradeceno-1-yłu, Octan (Z)-9-tetradeceno-1-yłu, Octan (Z)-8-tetradeceno-1-yłu, (Z)-8-tetradecen-1-ol atranilowe diamidy 28	Nie dotyczy	500-800 dyspenserów	1	Nie dotyczy	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - <b>maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie.</b>
		RAK 3+4 IP/EKO	(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol, Octan Z-11-tetradecenylu, Octan n-tetradecylu atranilowe diamidy 28	Nie dotyczy	500 dyspenserów	1	Nie dotyczy	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep GC-91- <b>maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie.</b>
		Xen Tari WG IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6dni	Nie stosować w dniu zbioru	<b>Olej parafinowy - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie.</b>
		Agree 50 WG IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>aizawai</i> szczep GC-91 –500 g w 1kg (preparat bakteryjny) związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	2,0 kg/ha	3/7 dni	Nie dotyczy	
		BioBit IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		DiPel DF IP/EKO	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związki mikrobiologiczne 11A	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Florbac <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		BioDor Pro <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
<b>PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC</b> Panonychus ulmi <b>I INNE GATUNKI PRZĘDZIORKÓW</b> Tetranychidae	Wprowadzać do sadu drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae w celu ograniczenia liczebności przędziorków i szpecieli.  <b>Próg szkodliwości - 3 i więcej form ruchomych na liść</b>	NATURALIS <b>IP/EKO</b>	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)* * zawiera nie mniej niż 2,3 x 10 <sup>7</sup> żywotnych spor/ml <b>UNF</b>	Działa kontaktowo	1,0 – 2,0 l/ha	5/5 dni	Nie stosować w dniu zbioru	NATURALIS – zarejestrowany do zwalczania przędziorka chmielowca.  Treol 770 EC stosować wczesną wiosną, krótko przed rozpoczęciem wylęgania się larw przędziorka owocowca z jaj zimowych.
		Treol 770 EC <b>IP/EKO</b>	olej parafinowy 770 g <i>oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	1,50%	1	Nie dotyczy	<b>Olej parafinowy - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie.</b>
		Fitter <b>IP/EKO</b>	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l <b>UN</b>	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10,0 l/ha	9/7dni	1	<b><i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 5 razy w sezonie.</b>
		Siltac EC <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	<b>Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.</b>
		K-PAK <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Next Pro <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Loksan EC <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Neudosan <b>IP/EKO</b>	Sól potasowa kwasów tłuszczowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy	
		Emulpar <sup>®</sup> 940 EC <b>IP/EKO</b>	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przędziorków/7-10 dni	Nie dotyczy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WZROST ZAWIĄZKÓW OD OPADANIA PŁATKÓW KWIATOWYCH DO ZBIORU OWOCÓW</b> <b>faza 6 – opadanie płatków (BBCH 67–69), faza 7 – wzrost zawiązków owocowych DO ZBIORU (BBCH 71–87)</b>								
<b>KWIECIAK</b> <b>PESTKOWIEC</b> <i>Anthonomus</i> <i>(Furcipes)rectirostris</i>	Próg szkodliwości - 5 chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi.	Geril 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	W zagrożonych sadach zabieg wykonać tuż po kwitnieniu. Próg zagrożenia wynosi 5 i więcej chrząszczy strząśniętych z 35 gałęzi. *Stosować jeden z wymienionych środków  <b>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</b>  <b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>
		Sekil 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Mospilan 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Mospilan Classic* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Lanmos 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Aceiro 20 SP <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Mantos 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Tazonit 20 SI* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Leptosar 200 SL* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
<b>PRZĘDZIOREK</b> <b>CHMIELOWIEC</b> <i>Tetranychus urticae</i>	Wprowadzać do sadu drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae w celu	Kanemite 150 SC <b>IP</b>	acekwincyl 164 g <i>substancje z grupy nieklasyfikowanej</i> <b>20 B</b>	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	1,8 l/ha	1	21	Zabieg wykonać po kwitnieniu, po przekroczeniu progu szkodliwości (5-7 form ruchomych na 1 liść).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I INNE GATUNKI PRZĘDZIORKÓW</b> Tetranychidae <b>ORAZ SZPECIELE</b> Eriophyoidae	ograniczenia liczebności przędziorków i szpecieli.  <b>Próg szkodliwości - 3 i więcej form ruchomych na 1 liść.</b>	<b>NATURALIS IP/EKO</b>	Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)* * zawiera nie mniej niż 2,3 x 10 <sup>7</sup> żywotnych spor/ml <b>UNF</b>	Działa kontaktowo	1,0 – 2,0 l/ha	5/5 dni	Nie stosować w dniu zbioru	Środek jest zarejestrowany do zwalczania przędziorków w uprawach małoobszarowych  NATURALIS – zarejestrowany do zwalczania przędziorka chmielowca.
		<b>Fitter IP/EKO</b>	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l <b>UN</b>	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10,0 l/ha	9/7dni	1	<b>Acekwinocyl - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 1 raz w sezonie.</b>
		<b>Next Pro IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	<b>Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 5 razy w sezonie.</b>
		<b>Loksan EC IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	<b>Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.</b>
		<b>Siltac EC IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		<b>K-PAK IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		<b>Neudosan IP/EKO</b>	Sól potasowa kwasów tłuszczowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy	
		<b>Emulpar 940 EC IP/EKO</b>	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przędziorków/7-10 dni	Nie dotyczy	
<b>NASIONNICA TRZEŚNIÓWKA</b> <i>Rhagoletis cerasi</i>	Pasożyty poczwerek z rodziny Ichneumonidae ograniczają tego szkodnika.  <b>Próg szkodliwości - średnio 2 muchy odłowione na 1 pułapkę lepową.</b>	<b>Decis Mega 50 EW* IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	Monitorować wylot much z wykorzystaniem żółtych pułapek lepowych, które należy zawiesić w sadzie w połowie maja.
		<b>Delta 50 EW* IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	Zabieg wykonać po 5-7 dniach regularnego odłowu much na pułapki i powtórzyć po 10-14 dniach.
		<b>Deka 2,5 EC* IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		<b>Desha 2,5 EC* IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	*Stosować jeden z wymienionych środków.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Delta Forte* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	<p>**Stosować jeden z wymienionych środków.</p> <p>***Stosować jeden z wymienionych środków.</p> <p><b>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</b></p> <p>IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Delta Forte, Dyno 2,5 EC, Poleci 2,5 EC, Matrix 2.5 EC, Spruzit koncentrat na szkodniki są toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.</p> <p>Preparaty Los Ovados 200 SE, Aceptir 200 SE i Apis 200 SE są zarejestrowane do zwalczania nasionnicy w uprawach małoobszarowych.</p> <p><b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2</b></p> <p><b>Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b></p> <p><b>Cyjanotraniliprol - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b></p> <p><b>Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 5 razy w sezonie.</b></p>
		Dyno 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Poleci 2,5 EC* IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC IP**	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> 3A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Lanmos 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan Classic** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Sekil 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Aceplan 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Kobe 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Geru 20 SP** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Aceptir 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Apis 200 SE** IP	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> 4A	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Los Ovados 200 SE** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Exirel 100 SE*** <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>2B</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Irazu 100 SE*** <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>2B</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Decis Trap Cerasi <b>IP</b>	deltametryna 0,015g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	100 pułapek	1	Nie dotyczy	
		Surround WP Crop Protectant <b>IP</b>	950 g krzemianu glinu (kaolin) <b>UN</b>	Działa odstraszająco na roślinie powierzchniowo	30 kg/ha	8/7 dni	Nie dotyczy	
		NATURALIS <b>IP/EKO</b>	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) – 0,185 g/kg (0,0185 %)* * zawiera nie mniej niż 2,3 x 10 <sup>7</sup> żywotnych spor/ml <b>UNF</b>	Działa kontaktowo	1,0 – 2,0 l/ha	5/5 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
<b>MSZYCE</b> Aphididae	Usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez mszyce pędów zmniejsza liczebność populacji mszyc. Drapieżce: biedronkowate, bzygowate, siatkoskrzydłe np. złotooki, pluskwiaki różnoskrzydłe np. dziubałkowate. Parazytoidy: pasożytnicze błonkówki np. mszycarzowate.  <b>Próg szkodliwości - 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew.</b>	Decis Mega 50 EW* <b>IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	Zwalczać po pojawieniu się szkodnika.  *Stosować jeden z wymienionych środków.  **Stosować jeden z wymienionych środków.  *** Stosować jeden z wymienionych środków
		Delta 50 EW* <b>IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,15-0,25 l/ha	2/14dni	7	
		Deka 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 /ha	1	45	
		Desha 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Delta Forte* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Deka 2,5 EC,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dyno 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	Desha 2,5 EC, Delta Forte, Dyno 2,5 EC, Poleci 2,5 EC, Matrix 2,5 EC, Spruzit koncentrat na szkodniki są toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.  <b>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</b>  Preparaty Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Miros 20 SP, Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Kobe 20 SP, Los Ovados 200 SE, Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Geri 20 SP, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,1 l/ha.  <b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>  <b>Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>  <b>Flonikamid - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>  <b>Pyretryna + oleje roślinne - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie.</b>  <b>Kwasy tłuszczowe C14 do C20 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 9.</b>
		Poleci 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Spruzit Koncentrat na Szkodniki <b>IP**/EKO</b>	pyretryna 9,17 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A +</b> olej rzepakowy 82,5% <i>Oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5 l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	3	
		Lanmos 20 SP** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan 20 SP** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Mospilan Classic** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Sekil 20 SP** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Kobe 20 SP** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Geri 20 SP** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Timber 20 SP** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 kg/ha	1	14	
		Aceptir 200 SE** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	
		Apis 200 SE** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,125 l/ha	1	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Los Ovados 200 SE** <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemicznie	0,125 l/ha	1	14	
		Tepeki 50 WG*** <b>IP</b>	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> <b>1A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Afinto*** <b>IP</b>	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> <b>1A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Hinode*** <b>IP</b>	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> <b>1A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Mainman 50 WG*** <b>IP</b>	flonikamid 500 g <i>karbaminiany</i> <b>1A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemicznie	0,14 kg/ha	2/21 dni	21	
		Siltac EC <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		K-PAK <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Next Pro <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Loksan EC <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		Emulpar 940 EC <b>IP/EKO</b>	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przedziorków/7-10 dni	Nie dotyczy	
		Surround WP Crop Protectant <b>IP</b>	950 g krzemianu glinu (kaolin) <b>UN</b>	Działa odstraszańco na roślinie powierzchniowo	30 kg/ha	8/7 dni	Nie dotyczy	
		Neudosan <b>IP/EKO</b>	Sól potasowa kwasów tłuszczowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	2,0%	5/5dni	Nie dotyczy	
		Fitter <b>IP/EKO</b>	kwasy tłuszczowe C14 do C20* - 479,8 g/l <b>UN</b>	Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo	10,0 l/ha	9/7dni	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE</b> <i>Tortricidae</i>	Stosowanie środków pochodzenia naturalnego do zwalczania gąsienic.	Sekil 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	Stosować jeden z wymienionych środków  <b>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</b>  Preparaty, Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Mospilan Classic, Miros 20 SP, Sekil 20 SP, Kobe 20 SP, Geri 20 SP, Marabel 20 SP, są zarejestrowane do zwalczania zwójek liściowych oraz innych gąsienic zjadających liście w uprawach małoobszarowych i stosować je można łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha.  Preparat XenTari WG, BioBit, DiPel DF, Frorabac należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).  <b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2</b>  <b>Cyjanotraniliprol - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>  <b><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>, szczep ABTS 1857- maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 10 razy w sezonie.</b>  <b><i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i>, szczep ABTS 351 - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie.</b>  <b><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>, szczep GC-91- maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 3 razy w sezonie</b>
		Timber 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10dni	14	
		Kobe 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Geri 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Lanmos 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemicznie	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Marabel 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Mospilan 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Mospilan Classic* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i systemiczne	0,2 kg/ha	2/7-10 dni	14	
		Exirel 100 SE <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>28</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7	
		Irazu 100 SE <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>28</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, wglębnie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7	
		Xen Tari WG <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związki mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		Agree 50 WG <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>aizawai</i> szczep GC-91 –500 g w 1kg (preparat bakteryjny) związki mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	2,0 kg/ha	3/7 dni	Nie dotyczy	
		BioBit <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związki mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DiPel DF <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , szczep ABTS 351 - 540 g związku mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,75-1,5 kg/ha	3/7 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		Florbac <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związku mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
		BioDor Pro <b>IP/EKO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> , szczep ABTS - 1857 - 540 g/kg związku mikrobiologiczne <b>11A</b>	Działa żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,5-1,5 kg/ha	10/6 dni	Nie stosować w dniu zbioru	
<b>ŚLUZOWNICA CIEMNA</b> <i>Caliroa limacina</i>	<b>Próg szkodliwości - 40 larw szkodnika w próbie 200 liści.</b>	Sekil 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	Zwalczać po stwierdzeniu larw szkodnika na liściach (próg zagrożenia wynosi 40 larw szkodnika w 200 liściach).
		Timber 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	<b>Timber 20 SP – termin stosowania upływa 20.04.2026</b>
		Kobe 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	*Stosować jeden z wymienionych środków.
		Gerl 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparat Spruzit koncentrat na szkodniki jest toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z jego użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.
		Lanmos 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	<b>Acetamipryd – maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>
		Mospilan 20 SP* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	<b>Pyretryna + oleje roślinne - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2 razy w sezonie.</b>
		Mospilan Classic* <b>IP</b>	acetamipryd 200 g <i>neonikotynoidy</i> <b>4A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i systemiczne	0,2 kg/ha	1	14	
		Spruzit Koncentrat na Szkodniki <b>IP**/EKO</b>	pyretryna 9,17 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b> +olej rzepakowy 82,5% <b>Oleje roślinne UN</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TARCZNIK NISZCZYCIEL</b> <i>Diaspidiotus perniciosus</i> <b>INNE CZERWCE</b>		Exirel 100 SE* <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>28</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7	*Stosować jeden z wymienionych środków.
		Irazu 100 SE* <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>28</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,5 l/ha	2/10 dni	7	
<b>MUSZKA</b> <b>PLAMOSKRZYDŁA</b> <i>Drosophila suzuki</i>	Masowe odłowy, minimum 150-200 pułapek z substancją wabiącą na 1 ha sadu.	Decis Mega 50 EW* <b>IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	Prowadzić monitoring obecności i przebiegu lotu muchówek szkodnika przy pomocy dostępnych pułapek z substancją wabiącą, np. Drosinal. Zwalczać przed zbiorem owoców ( z zachowaniem karencji), po 3-4 dniach od stwierdzenia szkodnika w pułapkach.  *Stosować jeden z wymienionych środków.  **Stosować jeden z wymienionych środków.  IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparaty Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Delta Force, Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Dyno 2,5 EC, Polec 2,5 EC i Matrix 2,5 EC są toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z ich użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.  <b>Deltametryna - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>  <b>Cyjanotraniliprol - maksymalna liczba zabiegów w uprawie – 2.</b>
		Delta 50 EW* <b>IP**</b>	deltametryna 50 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,25 l/ha	2/14dni	7	
		Deka 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Delta Forte* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Desha 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Dyno 2,5 EC* <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Polec 2,5 EC * <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Matrix 2,5 EC <b>IP**</b>	deltametryna 25 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	0,3 l/ha	1	45	
		Exirel 100 SE** <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>28</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Irazu 100 SE** <b>IP</b>	cyjanotraniliprol 100 g (atranilowe diamidy) <b>28</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo na roślinie powierzchniowo, włącznie i translaminarnie.	0,75 l/ha	2/10 dni	7	
		Decis Trap Droso <b>IP</b>	deltametryna 0,015g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie systemiczne	100 pułapek	1	Nie dotyczy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PO ZBIORZE OWOCÓW</b>								
<b>PRZĘDZIORKI</b> <i>Tetranychidae</i> <b>ORAZ SZPECIELE</b> <i>Eriophyoidea</i>	<b>Próg szkodliwości - 3 i więcej form ruchomych na 1 liść.</b>	<b>Next Pro</b> <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		<b>Loksan EC</b> <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,1 - 0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		<b>Siltac EC</b> <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,15%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		<b>K-PAK</b> <b>IP</b>	Mieszanina związków silikonowych <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,2%	może być stosowany wielokrotnie w danym sezonie wegetacyjnym	Nie dotyczy	
		<b>Emulpar 940 EC</b> <b>IP/EKO</b>	olej rydzowy 94% <i>oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa mechanicznie na roślinie powierzchniowo	0,9 – 1,2%	liczba zabiegów zależna od konieczności ograniczania przędziorków/7-10 dni	Nie dotyczy	
<b>ŚLUZOWNICA CIEMNA</b> <i>Caliroa limacina</i>	<b>Próg szkodliwości - 40 larw szkodnika w próbie 200 liści.</b>	Spruzit Koncentrat na Szkodniki <b>IP**/EKO</b>	pyretryna 9,17 g <i>pyretroidy i pyretryny</i> <b>3A +</b> olej rzepakowy 82,5% <i>Oleje roślinne</i> <b>UN</b>	Działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo	3,5 l/ha/m wysokości korony	2/5 dni	Nie dotyczy	IP** – środek może być stosowany w integrowanej produkcji, ale z ograniczeniami, tylko w sytuacjach koniecznych, gdy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów. Preparat Spruzit koncentrat na szkodniki jest toksyczne dla pszczoł, dlatego zabiegi z jego użyciem należy wykonać wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez te owady.