## Rdza żółta

| Fungicyd | Dawka (l lub kg) | Karencja | Zastosowanie w mieszaninie | Zalecenia stosowania | Substancje czynne | Producent | Numer zezwolenia | Data ważności | Ostateczny termin obrotu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguris 215 SC | 1 | x | | Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 30-71). | epoksykonazol 8.33% [grupa: triazole ], izopirazam 11.60% [grupa: ortofenyloamidy ] | Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. | R-5/2012 wu | 09.02.2017 | 09.08.2018 |
| Sigma 215 SC | 1 | x | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do początku dojrzałości wodnej (BBCH 30-71). | izopirazam 11.60% [grupa: ortofenyloamidy ], epoksykonazol 8.33% [grupa: triazole] | | R-74/2014 h.r. | 09.02.202016 | 09.07.2017 |
| Soligor 425 EC | 0,7-1 | 35 | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71). | protiokonazol 5.42% [grupa: triazole ], spiroksamina 22.90% [grupa: ketoaminy ], tebukonazol 15.13% [grupa: triazole ] | Bayer CropScience AG Niemcy | R-131/2014 | 01.09.2024 | 01.03.2026 |
| Bumper 250 EC | 0,5 | 35 | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). | propikonazol 25.10% [grupa: triazole ] | ADAMA Polska Sp. z o.o. | R-74/2011 | 30.12.2021 | 30.06.2023 |
| Comet 200 EC | 0,8-1,25 | 35 | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od pełni fazy krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69). | piraklostrobina 19,20% [grupa: strobiluryny ] | BASF SE Niemcy | R-155/2015 | 31.01.2018 | 31.07.2019 |
| Eminent 125 ME | 1 | x | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40-69). | tetrakonazol 11.57% [grupa: triazole ] | Isagro S.p.A. | R-43/2014 zr | 31.12.020 | 30.06.2022 |
| Eminent Star 312 SE | 1,8-2,0 | x | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 40-65). | chlorotalonil 21,22% [grupa: ftalany ], tetrakonazol 5,31% [grupa: triazole ] | Isagro S.p.A. | R-64/2014 | 31.10.2018 | 30.04.2020 |
| Fender 250 EC | 0,5 | 35 | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). | propikonazol 25.10% [grupa: triazole ] | Goldengrass Ltd Dickens Ho | R-4/2014 h.r. | 31.12.2021 | 01.07.2023 |
| Jetzone 250 EC | 0,5 | 35 | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). | propikonazol 25.10% [grupa: triazole ] | Makhteshim Chemical Works | R-86/2012 h.r. | 30.12.2021 | 30.06.2023 |
| Manitoba 425 SC | 2 | 42 | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65). | epoksykonazol 4.07% [grupa: triazole ], folpet 30.59% [grupa: ftalimidy ] | ADAMA Polska Sp. z o.o. | R-17/2014 wu | 30.09.2018 | 31.03.2020 |
| Topsin M 500 SC | 1,4 | 35 | | Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71). | tiofanat-metylowy 41.91% [grupa: benzimidazole ] | Nippon Soda Company Ltd | R-74/2012 | 17.05.2022 | 17.11.2023 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |