

Septorioza liści

Fungicyd	Dawka (l lub kg)	Karencja	Zastosowanie w mieszaninie z	Zalecenie stosowania	Substancje czynne	producent	numer zezwolenia	data waznosci	ostateczny termin obrotu
Acanto 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	pikoksystrobina ; 22.50% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont International Operations Sarl	R-56/2008	10.07.2018	10.01.2020
Acanto Prima 38 WG	1,5-2	45		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	cyprodinil ; 30.00% [grupa: anilinopirimidyny ;], pikoksystrobina ; 8.00% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-27/2011	21.03.2021	21.09.2022
Adexar Plus	2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).	epoksykonazol ; 3.98% [grupa: triazole ;], fluksapyroksad ; 3.98% [grupa: karboksamidy ;], piraklostrobina ; 6.37% [grupa: strobiluryny ;]	BASF SE Niemcy	R-19/2014	05.02.2024	05.08.2025
Agria Azoksystrobina 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.	R-11/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Agria Azoksystrobina 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.	R-11/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Agristar 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku gdy pierwsze kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).	azoksystrobina ; 22.00% [grupa: strobiluryny ;]	AGRI-GROW Sp. z o.o	R-56/2015 h.r.	2025-02-05	2026-09-05
Allegro 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	epoksykonazol ; 11.54% [grupa: triazole ;], krezoksym metylowy ; 11.54% [grupa: strobiluryny ;]	BASF SE Niemcy	R-98/2014	26.06.2024	26.12.2025
Amadeus 225 EC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	biksafen ; 7.40% [grupa: karboksamidy ;], protiokonazol ; 14.90% [grupa: triazole ;]	MADEZ FH-U	R-86/2013h.r.	16.01.2016	17.07.2017
Amistar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Limited	R-40/2011	31.12.2016	30.06.2018
Amistar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Limited	R-40/2011	31.12.2016	30.06.2018
Arastar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ARJO Sp. z o.o.	R-78/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Arastar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ARJO Sp. z o.o.	R-78/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Arbiter 520 EC	0,75-1,25	x		Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21-59).	prochloraz ; 28.53% [grupa: imidazole ;], proquinazid ; 3.57% [grupa: chinazoliny ;], tebukonazol ; 14.27% [grupa: konazoli-triazoli ;]	MADEZ FH-U	R-79/2014 h.r.	30.09.2020	30.03.2022

Ares 250 EC	0,5	35		Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia pszenicy ozimej (BBCH 39-59).	propikonazol ; 25.50% [grupa: triazole ;]	PUH CHEMIROL	R-69/2012	31.05.2015	01.12.2016
Areva 250 EC	1 x		Orius Extra 250 EW (dawka: 0,75)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	MANDEZ Firma Handlowo-Ustugowa Mariusz Rudnicki	R-20/2016 h.r.	30.04.2025	30.10.2016
Areva 250 EC	1 x		Soprano 125 SC (dawka: 0,75)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	MANDEZ Firma Handlowo-Ustugowa Mariusz Rudnicki	R-20/2016 h.r.	30.04.2025	30.10.2016
Areva 250 EC	1 x		Reveller 280 SC (dawka: 0,6)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	MANDEZ Firma Handlowo-Ustugowa Mariusz Rudnicki	R-20/2016 h.r.	30.04.2025	30.10.2016
Areva 250 EC	1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	MANDEZ Firma Handlowo-Ustugowa Mariusz Rudnicki	R-20/2016 h.r.	30.04.2025	30.10.2016
Artea 330 EC	0,4	40	Amistar 250 SC (dawka: 0,6)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).	cyprokonazol ; 7.16% [grupa: triazole ;], propikonazol ; 22.40% [grupa: triazole ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-32/2013	22.02.2023	23.08.2024
Artea 330 EC	0,4	40	Olympus 480 SC (dawka: 1,75-2)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).	cyprokonazol ; 7.16% [grupa: triazole ;], propikonazol ; 22.40% [grupa: triazole ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-32/2013	22.02.2023	23.08.2024
Artea 330 EC	0,5	40		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).	cyprokonazol ; 7.16% [grupa: triazole ;], propikonazol ; 22.40% [grupa: triazole ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-32/2013	22.02.2023	23.08.2024
Ascom 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	AGCHEM ACCESS POLAND	R-80/2013 h.r	31.07.2015	01.02.2017
Ascom 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	AGCHEM ACCESS POLAND	R-80/2013 h.r	31.07.2015	01.02.2017
Astar 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ARKOAgro	R-10/2015 h.r	31.12.2022	30.06.2024
Astar 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ARKOAgro	R-10/2015 h.r	31.12.2022	30.06.2024
Atak 450 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 43,9% [grupa: imidazole ;]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-45/2008	28.05.2018	28.11.2019

Atleta 480 SC	1,75-2	x	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6.56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32.80% [grupa: ftalany ;]	HaGe Polska Sp. z o.o.	R-72/2013 h.r.	2021-05-24	2022-11-25
Atleta 480 SC	2-2,5	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6.56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32.80% [grupa: ftalany ;]	HaGe Polska Sp. z o.o.	R-72/2013 h.r.	2021-05-24	2022-11-25
Atol 250 SC		0,6	35 Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Agro GmbH	R-16/2013 h.r.	31.07.2015	16.01.2017
Atol 250 SC		0,8-1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Agro GmbH	R-16/2013 h.r.	31.07.2015	16.01.2017
Atos 250 SC		0,6	35 Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Atos 250 SC		0,8-1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Aviator Xpro 225 EC		0,8-1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	biksafen ; 7.40% [grupa: karboksamidy ;], protiokonazol ; 14.90% [grupa: triazole ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-11/2013	16.01.2016	17.07.2017
Aylora 350 SC		2-2,5	x	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od końca krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 29-69).	chlorotalonil ; 22.30% [grupa: ftalany ;], pentiopirad ; 8.90% [grupa: karboksamidy ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-94/2013	18.06.2016	19.12.2017
Azotrobin 250 SC		0,6	35 Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Azotrobin 250 SC		0,8-1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Rudnik Sp. z o.o.	R-30/2014 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Aztek 250 SC		1	35	Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 1 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).	azoksystrobina ; 22.00% [grupa: strobiluryny ;]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-44/2015 h.r.	2025-03-05	2026-09-05
Azyl 250 SC		1	35	Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 1 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).	azoksystrobina ; 22.00% [grupa: strobiluryny ;]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-45/2015 h.r.	2025-03-05	2026-09-05
Balear 720 SC		1-1,4	35	Stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do rozpoczęcia fazy rozwoju ziarniaków (BBCH 37-70).	chlorotalonil ; 53.35% [grupa: ftalany ;]	Agriphar S.A.	R-74/2014	2024-05-14	2025-11-14

Banko 500 SC	1	60		Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (31-39)	chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.	R-76/2011	09.03.2021	09.09.2022
Banko 500 SC	1	60	Bumper 250 EC (dawka: 0,5)	Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (30-51)	chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.	R-76/2011	09.03.2021	09.09.2022
Banko 500 SC	1	60	Soprano 125 SC (dawka: 1)	Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (30-51)	chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.	R-76/2011	09.03.2021	09.09.2022
Barclay Bolt XL EC	0,5	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 25.39% [grupa: triazole ;]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-145/2012	15.11.2022	16.05.2024
Barclay Propizole EC	0,5	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 25.39% [grupa: triazole ;]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-146/2012	15.11.2022	15.05.2024
Bell 300 SC	1-1,2	35	Flexity 300 SC (dawka: 0,3)	Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).	boskalid ; 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy ;], epoksykonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-27/2012	30.01.2022	30.07.2023
Bell 300 SC	1,2-1,5	35		Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).	boskalid ; 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy ;], epoksykonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-27/2012	30.01.2022	30.07.2023
Boogie Xpro 400 EC	1,2-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	biksafen ; 5.05% [grupa: karboksamidy ;], protiokonazol ; 10.10% [grupa: triazole ;], spiroksamina ; 25.25% [grupa: ketoaminy ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-46/2014	28.03.2024	28.09.2025
Bounty 430 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH 30-61).	tebukonazol ; 39.29% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-227/2014	31.08.2020	28.02.2022
Brasifun 250 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25,05% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Sharda Polska Sp. z o.o.	R-134/2015	26.08.2025	26.02.2026
Bumper 250 EC	0,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 25.10% [grupa: triazole ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-74/2011	30.12.2021	30.06.2023
Bumper Super 490 EC	1	42		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	prochloraz ; 34,66% [grupa: imidazole ;], propikonazol ; 7,80% [grupa: triazole ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-255/2014	01.01.2025	01.07.2026
Capalo 337,5 SE	1,4-2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 6.09% [grupa: triazole ;], fenpropimorf ; 19,49% [grupa: morfoliny ;], metrafenon ; 7.31% [grupa: ketonu difenylowego ;]	BASF SE Niemcy	R-75/2014	14.05.2024	14.11.2025

Caramba 60 SL	1,2-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	metkonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;]	BASF Agro B.V. Holandia	R-45/2010	01.06.2020	01.12.2021	
Ceando 183 SC	1-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 7,68% [grupa: triazole ;], metrafenon ; 9,26% [grupa: ketonu difenylowego ;]	BASF SE Niemcy	R-170/2013	30.12.2023	01.07.2025	
Chefara 330 EC		0,5	40	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	cyprokonazol ; 7.16% [grupa: triazole ;], propikonazol ; 22.40% [grupa: triazole ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-37/2013	31.05.2016	01.12.2017	
Chefara 330 EC		0,4	40	Olympus 480 SC (dawka: 1,75-2)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	cyprokonazol ; 7.16% [grupa: triazole ;], propikonazol ; 22.40% [grupa: triazole ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-37/2013	31.05.2016	01.12.2017
Chefara 330 EC		0,4	40	Amistar 250 SC (dawka: 0,6)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	cyprokonazol ; 7.16% [grupa: triazole ;], propikonazol ; 22.40% [grupa: triazole ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-37/2013	31.05.2016	01.12.2017
Chloroflash 500 SC		2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	chlorotalonil ; 40.26% [grupa: ftalany ;]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-5/2016	2018-10-31	2020-04-30
Chron 500 SC		1	60	Bumper 250 EC (dawka: 0,5)	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).	chlorotalonil ; 40,16% [grupa: ftalany ;]	ProEuro Sp. z o.o.	R-63/2012 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Chron 500 SC		1	60		Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).	chlorotalonil ; 40,16% [grupa: ftalany ;]	ProEuro Sp. z o.o.	R-63/2012 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Chron 500 SC		1	60	Soprano 125 SC (dawka: 1)	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).	chlorotalonil ; 40,16% [grupa: ftalany ;]	ProEuro Sp. z o.o.	R-63/2012 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Clayton Tabloid EW		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39) oraz od początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol ; 25.07% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Clayton Plant Protection Ltd.	R-86/2014 h.r.	26.11.2022	26.05.2024
Comet 200 EC	0,8-1,25	35			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od pełni fazy krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).	piraklostrobina ; 19,20% [grupa: strobiluryny ;]	BASF SE Niemcy	R-155/2015	31.01.2018	31.07.2019
Conclude S.C.		1	35		Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH31-71).	azoksystrobina ; 22.9% [grupa: strobiluryny ;]	Globachem N.V.	R-118/2015	31.12.2022	30.06.2024
Corbel 750 EC		1	35		Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	fenpropimorf ; 79,87% [grupa: morfoliny ;]	BASF SE Niemcy	R-29/2014	28.02.2024	28.08.2025

Cortez 125 SC		1	28		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelenia w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.08% [grupa: triazole ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-3/2015 h.r	28.08.2024	27.02.2026
Cratos 600 SC	1,6-2,0		35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	chlorotalonil ; 50.00% [grupa: ftalany ;], pikoksystrobina ; 10.00% [grupa: strobiluryny ;]	MADEZ FH-U	R-69/2013 h.r.	2021-01-04	2022-07-05
Credo 600 SC	1,6-2		35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	chlorotalonil ; 50.00% [grupa: ftalany ;], pikoksystrobina ; 10.00% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-1/2011	04.01.2021	04.07.2022
Darcos 250 EW		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39) oraz od początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol ; 25.07% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-226/2014	31.08.2020	25.02.2022
Dedal 497 SC		0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelenia w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 15.85% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 26.27% [grupa: benzimidazole ;]	MADEZ FH-U	R-65/2014 h.r.	29.12.2023	30.06.2025
Demeter 250 SC		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).	azoksystrobina ; 22.00% [grupa: strobiluryny ;]	MADEZ FH-U	R-35/2015 h.r.	05.03.2025	05.09.2026
Diskobol 480 SC	1,75-2		0	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6.56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32.78% [grupa: ftalany ;]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-5/2012	24.05.2021	24.11.2022
Diskobol 480 SC	2-2,5		0		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6.56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32.78% [grupa: ftalany ;]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-5/2012	24.05.2021	24.11.2022
Diskobol 480 SC	1,75-2		0	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6.56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32.78% [grupa: ftalany ;]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-5/2012	24.05.2021	24.11.2022
Diskobol 480 SC	2-2,5		0		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6.56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32.78% [grupa: ftalany ;]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-5/2012	24.05.2021	24.11.2022
Dithane NeoTec 75 WG		2	0		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.	mankozeb ; 75.00% [grupa: ditiokarbaminiany ;]	Indofil Industries Limited	R-36/2012	07.02.2022	07.08.2023
Dobromir 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelenia w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22,81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Limited	R-128/2009	30.11.2019	30.05.2021
Dobromir 250 SC	0,8-1		35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelenia w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22,81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Limited	R-128/2009	30.11.2019	30.05.2021

Dobromir Super 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-59/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Super 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-59/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Top 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-46/2015	31.12.2022	30.06.2024
Dobromir Top 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-46/2015	31.12.2022	30.06.2024
Domnic 250 EW	1	28		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 24,18% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Sharda International Ltd	R-169/2015	19.10.2025	19.04.2027
Dove 500 SC	1	60	Bumper 250 EC (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).	chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl ; 50.00% [grupa: ftalany ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-33/2012 h.r.	09.03.2021	09.09.2022
Dove 500 SC	1	60	Soprano 125 SC (dawka: 1)	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).	chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl ; 50.00% [grupa: ftalany ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-33/2012 h.r.	09.03.2021	09.09.2022
Dove 500 SC	1	60		Stosować od fazy 1-go kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31- 39).	chlorotalonil tetrachloroizoftalonitryl ; 50.00% [grupa: ftalany ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-33/2012 h.r.	09.03.2021	09.09.2022
Dubler Mega 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 15.85% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 26.27% [grupa: benzimidazole ;]	Agrovena Sp. z o.o.	R-48/2015 h.r.	2023-12-29	2025-06-29
Duett Star 334 SE	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 8.25% [grupa: triazole ;], fenpropimorf ; 24,56% [grupa: morfoliny ;]	BASF SE Niemcy	R-92/2014	13.06.2024	13.12.2025
Duett Ultra 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 15,85% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ;26,27% [grupa: benzimidazole ;]	BASF SE Niemcy	R-169/2013	29.12.2023	30.06.2025
Dultreks - Pro 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 15.85% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 26.27% [grupa: benzimidazole ;]	RAAT (Robbin Aalbers Agrochemical Trading)	R-66/2014 h.r.	29.12.2023	30.06.2025
Eminent 125 ME	1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40-69).	tetrakonazol ; 11.57% [grupa: triazole ;]	Isagro S.p.A.	R-43/2014 zr	31.12.020	30.06.2022

Eminent Star 312 SE	1,8-2,0	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 40-65).	chlorotalonil ; 21,22% [grupa: ftalany ;], tetrakonazol ; 5,31% [grupa: triazole ;]	Isagro S.p.A.	R-64/2014	31.10.2018	30.04.2020	
Envoy	1,5-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).	epoksykonazol ; 6,01% [grupa: triazole ;], piraklostrobina ; 8,18% [grupa: strobiluryny ;]	BASF AG Niemcy	R-164/2014	31.01.2018	31.07.2019	
Epoksy 125 SC		0,75	35	Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12,02% [grupa: triazole ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Epoksy 125 SC		0,75	35	Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12,02% [grupa: triazole ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Epoksy 125 SC		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12,02% [grupa: triazole ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2014 h.r.	29.10.2023	30.04.2025
Erasmus 250 EW		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39) oraz od początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol ; 25,07% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-167/2012	31.08.2020	01.03.2022
Falcon 460 EC		0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy 3 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 33-69).	spiroksamina ; 25,25% [grupa: ketoaminy ;], tebukonazol ; 16,87% [grupa: konazoli-triazoli ;], triadimenol ; 4,34% [grupa: triazole ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R- 60 /2009	13.01.2025	13.07.2026
Fandango 200 EC		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	fluoksastrobina ; 10,00% [grupa: strobiluryny ;], protiokonazol ; 10,00% [grupa: triazole ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-10/2011	26.01.2021	26.01.2022
Fender 250 EC		0,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 25,10% [grupa: triazole ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-4/2014 h.r.	31.12.2021	01.07.2023
Fezan Plus 226 SC		3	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).	chlorotalonil ; 15,26% [grupa: ftalany ;], tebukonazol ; 5,51% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Oxon Italia	R-11/2014 wu	31.10.2018	30.04.2020
Furtado 250 EW		1	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25,80% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Helm Polska Sp. z o.o.	R-120/2015	31.08.2021	28.02.2022
Galileo 250 SC		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	pikoksystrobina ; 22,50% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont International Operations Sarl	R-7/2012	10.07.2018	10.01.2020
Globaztar 250 SC		1	35		Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH31-71).	azoksystrobina ; 22,9% [grupa: strobiluryny ;]	Globachem N.V.	R-6/2014	31.12.2022	30.06.2024

Golden Prochloraz 450 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 45.00% [grupa: imidazole ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-31/2014 h.r.	28.05.2018	28.11.2019
Guliver 500 SC	1	60		Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (31-39)	chlorotalonil ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	MADEZ FH-U	R-43/2013 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Guliver 500 SC	1	60	Bumper 250 EC (dawka: 0,5)	Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (30-51)	chlorotalonil ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	MADEZ FH-U	R-43/2013 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Guliver 500 SC	1	60	Soprano 125 SC (dawka: 1)	Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (30-51)	chlorotalonil ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	MADEZ FH-U	R-43/2013 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Gwarant 500 SC	1	60		Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (31-39)	chlorotalonil ; 40,16% [grupa: ftalany ;]	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.	R-26/2011	09.03.2021	09.09.2022
Gwarant 500 SC	1	60	Bumper 250 EC (dawka: 0,5)	Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (30-51)	chlorotalonil ; 40,16% [grupa: ftalany ;]	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.	R-26/2011	09.03.2021	09.09.2022
Gwarant 500 SC	1	60	Soprano 125 SC (dawka: 1)	Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (30-51)	chlorotalonil ; 40,16% [grupa: ftalany ;]	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.	R-26/2011	09.03.2021	09.09.2022
Halny 200 EC	0,15-0,25	35	Zamir 400 EW (dawka: 0,6-1)	Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 25-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazolin ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-112/2013	31.07.2021	01.02.2023
Halny 200 EC	0,15-0,25	x		Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 25-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazolin ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-112/2013	31.07.2021	01.02.2023
Helicur 250 EW	1	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.8% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Helm Polska Sp. z o.o.	R-52/2008	31.08.2020	28.02.2022
Impact 125 SC	1	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30-55).	flutriafol ;11,79% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-212/2014	31.05.2022	30.11.2023
Input 460 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	protiokonazol ; 16.00% [grupa: triazole ;], spiroksamina ; 30.00% [grupa: ketoaminy ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-61/2011	05.10.2021	05.04.2023
Intizam 497 SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 15.85% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 26.27% [grupa: benzimidazole ;]	BASF SE Niemcy	R-84/2014	31.10.2018	30.04.2020

Intizam SC	0,6	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 18.70% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 31.00% [grupa: benzimidazole ;]	BASF SE Niemcy	R-82/2010i.r.	28.02.2016	29.08.2017
Jay 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.90% [grupa: strobiluryny ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2011 h.r.	30.11.2019	30.05.2021
Jay 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.90% [grupa: strobiluryny ;]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-82/2011 h.r.	30.11.2019	30.05.2021
Jetzone 250 EC	0,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 25.10% [grupa: triazole ;]	Makhteshim Chemical Works	R-86/2012 h.r.	30.12.2021	30.06.2023
Joga 250 EC	0,5	35		Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39-59).	propikonazol ; 25.50% [grupa: triazole ;]	PUH CHEMIROL	R-12/2012	16.01.2022	16.07.2023
Juwel TT 483 SE	1,25-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 8.10% [grupa: triazole ;], fenpropimorf ; 30.80% [grupa: morfoliny ;], krezoksym metylowy ; 8.10% [grupa: strobiluryny ;]	BASF SE Niemcy	R-53/2012	13.03.2022	13.09.2023
Kask 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ProEuro Sp. z o.o.	R-27/2013 h.r.	30.11.2019	31.05.2021
Kask 250 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ProEuro Sp. z o.o.	R-27/2013 h.r.	30.11.2019	31.05.2021
Kloraz 450 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 5,32% [grupa: imidazole ;]		R-6/2018	08.10.210	08.04.2022
Korazzo 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	azoksystrobina ; 22.00% [grupa: strobiluryny ;]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-58/2015 h.r.	2025-03-05	2026-09-05
Kosa 250 EW	1	28		Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 24.18% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Sharda Polska Sp. z o.o.	R-170/2015	2025-10-19	2027-04-19
Ksykon 250 EW	1	28		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12,08% [grupa: triazole ;]	POL-CHEM Zaopatrzenie Rolnictwa	R-1/2016 h.r.	30.04.2020	31.10.2021
Leander 750 EC	0,6	42	Bumper Super 490 EC (dawka: 1)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).	fenpropidyna ; 80,04% [grupa: morfoliny ;]	Makhteshim-Agan - Industries Ltd	R-254/2014	01.01.2025	01.07.2026

Lerak 200 EC	1,5-2	x		Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39-59).	azoksystrobina ;6,76% [grupa: strobiluryny ;], tebukonazol ;11,7% [grupa: konazol-triazoli ;]	Syngenta Crop Protection AG	R-7/2013	13.01.2023	14.07.2024	
Librax	1,33-2		35	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy pełni kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69)	metkonazol; 4,4 % [grupa: triazole ;], fluksapyroksad ; 62,5% [grupa: karboksamidy ;]	BASF SE Niemcy	R-47/2016	30.04.2019	31.10.2020	
Limero		1 x		Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69). Max 2 razy w sezonie.	fenpropimorf ; 79,87% [grupa: morfoliny ;]	BASF SE Niemcy	R-161/2014	30.04.2020	30.10.2021	
Lotus Top 140 EC	2-2,5		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	fenpropidyna ; 10,21% [grupa: morfoliny ;], epoksykonazol ; 4,08% [grupa: triazole ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-162/2015	31.12.2019	30.06.2021	
Manitoba 425 SC		2	42	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).	epoksykonazol ; 4,07% [grupa: triazole ;], folpet ; 30,59% [grupa: ftalimidy ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-17/2014 wu	30.09.2018	31.03.2020	
Martens 600 SC	1,6-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	chlorotalonil ; 39,40% [grupa: ftalany ;], pikoksystrobina ; 7,90% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-45/2013 bc	31.10.2017	30.04.2019	
Matador 303 SE	1,5-1,75		42	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tetrazonazol ; 6,11% [grupa: triazole ;], tiofanat- metylowy ; 20,44% [grupa: benzimidazole ;]	SumiAgro (UK) Ltd	R-99/2008	19.12.2018	19.06.2020	
Matsuri 250 EC		0,5	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 23,58% [grupa: triazole ;]	SumiAgro (UK) Ltd	R-67/2014 zr	31.01.2018	31.07.2019	
Medallon 450 EC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 43,9% [grupa: imidazole ;]	AGRI-GROW Sp. z o.o	R-32/2015 h.r.	08.10.2018	08.03.2020	
Menara 410 EC		0,4	42	Olympus 480 SC (dawka: 1,5-1,8)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	cyprokonazol ; 14,20%, propikonazol ; 22,2% [grupa: triazole ;]	Syngenta Crop Protection AG	R-148/2012	15.11.2022	16.05.2024
Menara 410 EC		0,4	42	Amistar 250 SC (dawka: 0,6)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	cyprokonazol ; 14,20%, propikonazol ; 22,2% [grupa: triazole ;]	Syngenta Crop Protection AG	R-148/2012	15.11.2022	16.05.2024
Menara 410 EC		0,5	42		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	cyprokonazol ; 14,20%, propikonazol ; 22,2% [grupa: triazole ;]	Syngenta Crop Protection AG	R-148/2012	15.11.2022	16.05.2024
Mirador 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22,81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-28/2013	31.12.2022	01.07.2024

Mirador 250 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22,81% [grupa: strobiluryny ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-28/2013	31.12.2022	01.07.2024
Mirador Forte 160 EC		1,75	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 5,68% [grupa: strobiluryny ;], tebukonazol ; 9,47% [grupa: konazoli-triazoli ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-213/2014	31.08.2020	28.02.2022
Mirage 450 EC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37-55).	prochloraz ;39,65% [grupa: imidazole ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-4/2007	02.02.2017	02.08.2018
Moderator 303 SE	1,5-1,75		42	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tetrakonazol ; 6,11% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 20,44% [grupa: benzimidazole ;]	Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.	R-101/2008	19.12.2018	19.06.2020
Mondapropico EC		0,5	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 25,39% [grupa: triazole ;]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-143/2012	15.11.2022	16.05.2024
Mondatak 450 EC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 43,9% [grupa: imidazole ;]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-68/2008	08.10.2018	08.04.2020
Mystic 250 EC		1	30	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25,00% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-51/2015	31.01.2015	31.07.2016
Ogam		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	epoksykonazol ; 11,54% [grupa: triazole ;], krezoksym metylowy ; 11,54% [grupa: strobiluryny ;]	BASF SE Niemcy	R-160/2014	30.04.2020	30.10.2021
Olympus 480 SC	1,75-2	x		Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6,56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32,80% [grupa: ftalany ;]	Syngenta Limited	R-32/2011	24.05.2021	24.11.2022
Olympus 480 SC	2-2,5	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	azoksystrobina ; 6,56% [grupa: strobiluryny ;], chlorotalonil ; 32,80% [grupa: ftalany ;]	Syngenta Limited	R-32/2011	24.05.2021	24.11.2022
Opera Max 147,5 SE	1,5-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).	epoksykonazol ; 6,01% [grupa: triazole ;], piraklostrobina ; 8,18% [grupa: strobiluryny ;]	BASF SE Niemcy	R-33/2014	10.03.2024	10.09.2025
Opera Top	1,5-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).	epoksykonazol ; 6,01% [grupa: triazole ;], piraklostrobina ; 8,18% [grupa: strobiluryny ;]	BASF AG Niemcy	R-165/2014	31.01.2018	31.07.2019
Optan 183 SE		1,5	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ;4,73% [grupa: triazole ;], piraklostrobina ; 12,58% [grupa: strobiluryny ;]	BASF SE Niemcy	R-97/2014	26.06.2024	26.12.2025

Oranis 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	pikoksystrobina ; 22.50% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-10/2013	31.10.2017	01.05.2019
Orius Extra 250 EW	1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	tebukonazol ; 25.00% [grupa: konazoli-triazoli ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-77/2015	31.08.2020	28.02.2022
Osiris 65 EC	1,5-2,5	35		Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).	epoksykonazol ; 3.70% [grupa: triazole ;], metkonazol ; 2.70% [grupa: triazole ;]	BASF Polska Sp. z o.o.	R-87/2012	25.06.2022	25.12.2023
Palazzo	1,4-2,0	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-51).	fenpropimorf ; 19.49% [grupa: morfoliny ;], epoksykonazol ; 6.09% [grupa: triazole ;], metrafenon ; 7.31% [grupa: pochodne ketony difenylowego ;]	BASF SE	R-197/2015	30.04.2019	31.10.2020
pestycyd-nazwa	zastosowanie-dawka (l lub kg)	zastosowanie-karencja	zastosowanie-w mieszaninie	zastosowanie-uwaga zalecenie	pestycyd-skladniki	pestycyd-producent-nazwa	pestycyd-zezwolecie numer	pestycyd-zezwolecie data waznosc	pestycyd-ostateczny termin obrotu srodkiem
Phoenix 500 SC	1,5	42		Stosować zapobiegawczo, od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	folpet ; 39.60% [grupa: ftalimidy ;]	Adama Agricultural Solutions UK	R-7/2012wu	30.09.2017	30.03.2019
Pixel 250 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	pikoksystrobina ; 22.50% [grupa: strobiluryny ;]	MADEZ FH-U	R-7/2015 h.r.	10.07.2018	10.01.2020
Pixel Prima 38 WG	1,5-2	45		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	cyprodinil ; 30.00% [grupa: anilinopirimidyny ;], pikoksystrobina ; 8.00% [grupa: strobiluryny ;]	MADEZ FH-U	R-91/2014 h.r.	21.03.2021	21.09.2022
Plinker 600 SC	1,6-2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41-59).	chlorotalonil ; 39.40% [grupa: ftalany ;], pikoksystrobina ; 7.90% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-87/2013 bc	31.10.2017	30.04.2019
Priori Xtra 280 SC	0,8-1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 18.20% [grupa: strobiluryny ;], cyprokonazol ; 7.30% [grupa: triazole ;]	Syngenta Crop Protection AG	R-12/2013	20.01.2023	20.07.2024
Pro - Prochloraz 450 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37-55).	prochloraz ; 39.65% [grupa: imidazole ;]	RAAT	R-7/2012 h.r	02.02.2017	03.08.2018
Prochloraz 450 EC	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 43.9% [grupa: imidazole ;]	Crop Agro Sp. z o.o.	R-3/2016 h.r.	08.10.2018	08.04.2020
Proline Max 460 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	protiokonazol ; 16.00% [grupa: triazole ;], spiroksamina ; 30.00% [grupa: ketoaminy ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-66/2010	12.08.2020	12.02.2022

Promax 450 EC	1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31) i początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37-55).	prochloraz ; 39.65% [grupa: imidazole ;]	Adama Polska Sp. z o.o.	R-38/2011i.r.	02.02.2017	03.08.2018
Propico 250 EC	0,5	35	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia pszenicy ozimej (BBCH 39-59).	propikonazol ; 25.50% [grupa: triazole ;]	PUH CHEMIROL	R-13/2012	18.01.2022	18.07.2023
Propicoflash EC	0,5	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	propikonazol ; 25.39% [grupa: triazole ;]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-144/2012	15.11.2022	16.05.2024
Prosaro 250 EC	0,75-1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	protiokonazol ; 12.68% [grupa: triazole ;], tebukonazol ; 12.68% [grupa: triazole ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-152/2014	29.08.2024	28.02.2026
Raster 125 SC	1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC	0,75 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Raster 125 SC	0,75 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-57/2014	30.04.2020	31.10.2021
Realchemie Proquinazid 200 EC	0,15-0,25	x	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazoliny ;]	Realchemie Nederland BV	R-7/2016 h.r.	17.06.2022	17.01.2024
Realchemie Proquinazid 200 EC	0,15-0,25	x	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazoliny ;]	Realchemie Nederland BV	R-7/2016 h.r.	17.06.2022	17.01.2024
Rekord 125 SC	0,75 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC	0,75 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Rekord 125 SC	1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-56/2014	30.04.2020	31.10.2021
Respekto 125 SC	0,75 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021

Respekto 125 SC	0,75 x		Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021
Respekto 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-55/2014	30.04.2020	31.10.2021
Reveller 280 SC	0,8-1		35	Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29-59).	cyprokonazol ; 8.00% [grupa: triazole ;], pikoksystrobina ; 20.00% [grupa: strobiluryny ;]	Du Pont International Operations Sarl	R-23/2008	17.03.2018	17.09.2019
Riza 250 EW	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.00% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Cheminova A/S	R-11/2005	22.03.2015	22.09.2016
Rubric 125 SC	0,75	35	Riza 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Rubric 125 SC	0,75	35	Sparta 250 EW (dawka: 0,5)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Rubric 125 SC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.02% [grupa: triazole ;]	Cheminova A/S	R-126/2013	29.10.2023	30.04.2025
Safir 125 SC	1	35		Stosować chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.08% [grupa: triazole ;]	Adama Polska Sp. z o.o.	R-209/2014	30.04.2020	31.10.2021
Salento A 450 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni kłoszenia (BBCH 37-55).	prochloraz ; 39.65% [grupa: imidazole ;]	AGChem Acces Limited	R-36/2012h.r.	02.02.2017	03.08.2018
Sammisto 250 SC	0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4)	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	SWS Chemicals EU Sp.z o.o	R-49/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Sammisto 250 SC	0,8-1		35	Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	SWS Chemicals EU Sp.z o.o	R-49/2013 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Sancozeb 80 WP	2	42		Stosować od fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).	mankozeb ; 80.00% [grupa: ditiokarbaminiany ;]	Indofil Industries Limited	R-169/2012	31.01.2019	31.07.2020
Secardo 125 EC	1,33-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).	epoksykonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;], fluksapyroksad ; 6.00% [grupa: karboksamidy ;]	BASF SE Niemcy	R-22/2014	19.02.2024	20.08.2025

Seguris 215 SC		1 x		Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 30-71).	epoksykonazol ; 8.33% [grupa: triazole ;], izopirazam ; 11.60% [grupa: ortofenyloamidy ;]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-5/2012 wu	09.02.2017	09.08.2018
Sherlock 280 SC	0,8-1		35	Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29-59).	cyprokonazol ; 8.00% [grupa: triazole ;], pikoksystrobina ; 20.00% [grupa: strobiluryny ;]	MADEZ FH-U	R-85/2014 h.r.	17.03.2018	17.09.2019
Sigma 215 SC		1 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do początku dojrzałości wodnej (BBCH 30-71).	izopirazam ; 11.60% [grupa: ortofenyloamidy ;], epoksykonazol ; 8.33% [grupa: triazole ;]		R-74/2014 h.r.	09.02.202016	09.07.2017
Sokolov 250 EW		1	32	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia(BBCH 30-59).	tebukonazol ; 26.00% [grupa: triazole ;]	ProEuro Sp. z o.o.	R-10/2014 h.r.	07.12.2015	07.06.2017
Sokół 460 EC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy 3-go kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 33-69).	spiroksamina ; 25.25% [grupa: ketoaminy ;], tebukonazol ; 16.87% [grupa: konazoli-triazoli ;], triadimenol ; 4.34% [grupa: triazole ;]	Bayer CropScience Limited	R-9/2015	31.08.2020	28.02.2022
Soligor 425 EC	0,7-1		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 71).	protiokonazol ; 5.42% [grupa: triazole ;], spiroksamina ; 22.90% [grupa: ketoaminy ;], tebukonazol ; 15.13% [grupa: triazole ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-131/2014	01.09.2024	01.03.2026
Song 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Goldengrass Ltd.	R-24/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Song 250 SC	0,8-1		35	Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Goldengrass Ltd.	R-24/2015 h.r.	31.07.2015	31.01.2017
Soprano 125 SC		1	28	Stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 12.08% [grupa: triazole ;]		R-149/2014	27.08.2024	28.02.2026
Sparta 250 EW		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.77% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Cheminova A/S	R-65/2015	31.08.2020	28.02.2022
Spector 450 EC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37-55).	prochloraz ; 39.65% [grupa: imidazole ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-4/2012 h.r.	02.02.2017	02.08.2018
Spekfree 430 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku wzrostu źdźbła do fazy liścia flagowego (BBCH 30-39) i od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol ; 39.29% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-166/2012	31.08.2020	01.03.2022
Starami 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Rudnik Sp. z o.o.	R-64/2012 h.r.	31.07.2015	30.01.2017

Starami 250 SC	0,8-1		35	Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	Rudnik Sp. z o.o.	R-64/2012 h.r.	31.07.2015	30.01.2017
Starpro 430 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku wzrostu źdźbła do fazy liścia flagowego (BBCH 30-39) i od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).	tebukonazol ; 39.29% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-161/2012	26.11.2024	26.05.2027
Strobi 250 SC		0,6	35	Artea 330 EC (dawka: 0,4) Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ARJO Sp. z o.o.	R-77/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Strobi 250 SC	0,8-1		35	Stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	azoksystrobina ; 22.81% [grupa: strobiluryny ;]	ARJO Sp. z o.o.	R-77/2012 h.r.	31.07.2015	01.02.2017
Swing Plus	1,2-1,5		35	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39-59).	dimoksystrobina ; 12.53% [grupa: strobiluryny ;], epoksykonazol ; 4.71% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-162/2014	31.01.2019	31.07.2020
Swing Top 183 SC	1,2-1,5		35	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39-59).	dimoksystrobina ; 12.53% [grupa: strobiluryny ;], epoksykonazol ; 4.71% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-60/2014	28.04.2024	28.10.2025
Syrius 250 EW		1 x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	tebukonazol ; 26.02% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Adama Polska Sp. z o.o.	R-93/2015	31.08.2020	28.02.2022
Talius 200 EC	0,15-0,25	x		Stosować od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazoliny ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-80/2012	17.06.2022	17.12.2023
Talius 200 EC	0,15-0,25	x		Zamir 400 EW (dawka: 0,6-1) Stosować od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazoliny ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-80/2012	17.06.2022	17.12.2023
Talonil 500 SC		1	60	Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39)	chlorotalonil ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	Agri - Grwo Sp. z o.o.	R-38/2013 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Talonil 500 SC		1	60	Bumper 250 EC (dawka: 0,5) Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39)	chlorotalonil ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	Agri - Grwo Sp. z o.o.	R-38/2013 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Talonil 500 SC		1	60	Soprano 125 SC (dawka: 1) Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39)	chlorotalonil ; 40.16% [grupa: ftalany ;]	Agri - Grwo Sp. z o.o.	R-38/2013 h.r.	09.03.2021	10.09.2022
Tandem 497 SC		0,6	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 15.85% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 26.27% [grupa: benzimidazole ;]	AGRI-GROW Sp. z o.o	R-46/2015 h.r	29.12.2023	29.06.2025
Tango Star		1	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	epoksykonazol ; 8.25% [grupa: triazole ;], fenpropimorf ; 24.56% [grupa: morfoliny ;]	BASF SE Niemcy	R-225/2014	30.04.2020	30.10.2021
Tarcza Łan 250 EW	1-1,25	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.00% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Sharda International Ltd	R-20/2007	27.11.2015	27.02.2017
Tarot 200 EC	0,15-0,25		0	Zamir 400 EW (dawka: 0,6-1) Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazoliny ;]	MADEZ FH-U	R-81/2013 h.r	17.06.2022	17.12.2023
Tarot 200 EC	0,15-0,25		0	Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27-59).	proquinazid ; 20.50% [grupa: chinazoliny ;]	MADEZ FH-U	R-81/2013 h.r	17.06.2022	17.12.2023
Tazer 250 SC		1	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).	azoksystrobina ; 22.00% [grupa: strobiluryny ;]	Nufarm GmbH and Co. KG	R-48/2015	05.03.2025	05.09.2026
Tebu 250 EW		1	32	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.00% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Helm AG	R-60/2005	31.08.2020	28.02.2022
Tebusha 250 EW		1	28	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.00% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Sharda Polska Sp. z o.o.	R-16/2016	31.05.2020	28.02.2022

Tenore 400 EW		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 25.30% [grupa: imidazole ;], tebukonazol ; 12.60% [grupa: konazoli-triazoli ;]	AdAMA Polska Sp. z o.o.	R-68/2012 h.r.	31.12.2015	30.06.2017
Tern Premium 575 EC	0,8-1		42		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	fenpropidyna ; 45.90% [grupa: morfoliny ;], propikonazol ; 12.80% [grupa: triazole ;]	Syngenta Crop Protection AG	R-82/2012	31.05.2016	30.11.2017
Tiger 250 SC		1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).	azoksystrobina ; 22% [grupa: strobiluryny ;]	MADEZ Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki	R-10/2016 h.r.	05.03.2025	05.09.2026
Tilt Turbo 575 EC	0,8-1		42		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	fenpropidyna ; 45.90% [grupa: morfoliny ;], propikonazol ; 12.80% [grupa: triazole ;]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-78/2012	05.06.2022	05.12.2023
Tocata	1,4-2		35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	fenpropimorf ; 19.49% [grupa: morfoliny ;], epoksykonazol ; 6.09% [grupa: triazole ;], metrafenon ; 7.31% [grupa: pochodne ketonu difenylowego ;]	BASF SE Niemcy	R-202/2015	30.04.2019	31.10.2020
Toledo 250 EW		1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 30-39) oraz od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61)	tebukonazol ; 25.07% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Rotam Agrochemical Europe Ltd.	R-162/2012	26.11.2022	27.05.2024
Topsin M 500 SC		1,4	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzalności wodnej (BBCH 71).	tiofanat-metylowy ; 41.91% [grupa: benzimidazole ;]	Nippon Soda Company Ltd	R-74/2012	17.05.2022	17.11.2023
Track 300 SC	1-1,2		35	Flexity 300 SC (dawka: 0,3)	Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).	boskalid ; 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy ;], epoksykonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-29/2012	30.01.2022	30.07.2023
Track 300 SC	1,2-1,5		35		Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).	boskalid ; 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy ;], epoksykonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-29/2012	30.01.2022	30.07.2023
Treoris 350 SC	2-2,5	x			Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od końca fazy krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 29-69).	chlorotalonil ; 22.30% [grupa: ftalany ;], pentiopirad ; 8.90% [grupa: karboksamidy ;]	Du Pont International Operations Sarl	R-82/2013	11.06.2016	12.12.2017
Trion 250 EW		1 x			Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.8% [grupa: triazole ;]	Helm AG	R-126/2015	31.08.2020	28.02.2022
Troja 250 EW		1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tebukonazol ; 25.77% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Cheminova A/S	R-63/2015	31.08.2020	28.02.2022
Tyberius 250 EW		1 x			Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-61).	tebukonazol ; 26.02% [grupa: triazole ;]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-108/2015	31.08.2020	28.02.2022
Unix 75 WG	0,7-1		42		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).	cyprodinil ; 75.00% [grupa: anilinopirimidyny ;]	Syngenta Crop Protection AG	R-27/2013	13.02.2023	14.08.2024
Vangard 75 WG	0,7-1		42		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).	cyprodinil ; 75.00% [grupa: anilinopirimidyny ;]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-29/2013	30.04.2018	31.10.2019
Vareon 520 EC	0,75-1,25	x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21-59).	prochloraz ; 28.53% [grupa: imidazole ;], proquinazid ; 3.57% [grupa: chinazoliny ;], tebukonazol ; 14.27% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-124/2013	31.08.2020	28.02.2022
Variano Xpro 190 EC		1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).	protiokonazol;9,41% [grupa: triazole ;], fluoksastrobina;4,70% [grupa: strobiluryny ;], biksafen;3,76% [grupa: karboksamidy ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-156/2015	31.07.2019	31.01.2021
Ventur 300 SC	1-1,2		35	Flexity 300 SC (dawka: 0,3)	Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).	boskalid ; 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy ;], epoksykonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-28/2012	30.01.2022	30.07.2023
Ventur 300 SC	1,2-1,5		35		Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).	boskalid ; 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy ;], epoksykonazol ; 6.00% [grupa: triazole ;]	BASF SE Niemcy	R-28/2012	30.01.2022	30.07.2023
Vertisan 200 EC		1 x		Orius Extra 250 EW (dawka: 0,75)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentiopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-116/2014	30.04.2025	30.10.2026
Vertisan 200 EC		1 x		Soprano 125 SC (dawka: 0,75)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentiopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-116/2014	30.04.2025	30.10.2026
Vertisan 200 EC		1 x		Reveller 280 SC (dawka: 0,6)	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentiopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-116/2014	30.04.2025	30.10.2026
Vertisan 200 EC		1 x			Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).	pentiopirad ; 20.66% [grupa: karboksamidy ;]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-116/2014	30.04.2025	30.10.2026
Vista 228 SE		1,8	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	fluchinkonazol ; 5.40% [grupa: triazole ;], prochloraz ; 17.40% [grupa: imidazole ;]	BASF Agro B.V. Szwajcaria	R-3/2008	31.12.2015	01.07.2017

Weto 250 EC	0,5	35	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia pszenicy ozimej (BBCH 39-59).	propikonazol ; 25.50% [grupa: triazole ;]	INNVIKO Sp. z o.o.	R-14/2012	18.01.2022	18.07.2023
Wirtuoz 520 EC	0,75-1,25	x	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21-59).	prochloraz ; 28.53% [grupa: imidazole ;], proquinazid ; 3.57% [grupa: chinazolin ;], tebukonazol ; 14.27% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Du Pont International Operations Sarl	R-70/2012	30.09.2020	30.03.2022
Yamato 303 SE	1,5-1,75	42	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	tetrakonazol ; 6.11% [grupa: triazole ;], tiofanat-metylowy ; 20.44% [grupa: benzimidazole ;]	Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.	R-100/2008	19.12.2018	19.06.2020
Zafir 400 EW		1 35	Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 25.30% [grupa: imidazole ;], tebukonazol ; 12.60% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Adama Agricultural Solutions Ltd.	R-9/2012h.r.	31.12.2015	30.06.2017
Zaftra SC		1 35	Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1-go kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).	azoksystrobina ; 22.90% [grupa: strobiluryny ;]	Globachem N.V.	R-7/2015 wu	31.12.2022	30.06.2024
Zamir 400 EW		1 35	Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	prochloraz ; 25.30% [grupa: imidazole ;], tebukonazol ; 12.60% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Adama Agricultural Solutions Ltd.	R-18/2003	31.12.2015	30.06.2017
Zantara 216 EC	0,9-1,2	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia zbóż (BBCH 30-59). Termin stosowania można wydłużyć do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).	biksafen ; 5.10% [grupa: karboksamidy ;], tebukonazol ; 16.80% [grupa: konazoli-triazoli ;]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-54/2014	14.04.2024	15.10.2025
Zenit 575 EC	0,8-1	42	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).	fenpropidyna ; 45.90% [grupa: morfoliny ;], propikonazol ; 12.80% [grupa: triazole ;]	Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.	R-77/2012	29.05.2022	29.11.2023