

Łamliwość podstawy żdźbła

Fungicyd	Dawka (l lub kg)	Karencja	Zastosowanie w mieszaninie	Zalecenia stosowania	Substancje czynne	Producent	Numer zezwolenia	Data ważności	Ostateczny termin obrotu
Acanto 250 SC	1	35	Unix 75 WG (dawka: 0,7)	Stosować od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	pikoksystrobina 22.50% [grupa: strobiluryny]	Du Pont International Operations Sarl	R-56/2008	10.07.2018	10.01.2020
Acanto Prima 38 WG	2	45		Stosować od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	cyprodinil 30.00% [grupa: anilinopirimidyny], pikoksystrobina 8.00% [grupa: strobiluryny]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-27/2011	21.03.2021	21.09.2022
Adexar Plus	2	35		Stosować od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 3.98% [grupa: triazole], fluksapyroksad 3.98% [grupa: karboksamidy], piraklostrobina 6.37% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-19/2014	05.02.2024	05.08.2025
Allegro 250 SC	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 11.54% [grupa: triazole], krezoksym metylowy 11.54% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-98/2014	26.06.2024	26.12.2025
Amadeus 225 EC	0,8-1	35		Stosować od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	biksafen 7.40% [grupa: karboksamidy], protiokonazol 14.90% [grupa: triazole]	MADEZ FH-U	R-86/2013h.r.	16.01.2016	17.07.2017
Arbiter 520 EC	0,75-1,25	x		Stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 21-31).	prochloraz 28.53% [grupa: imidazole], proquinazid 3.57% [grupa: chinazoliny], tebukonazol 14.27% [grupa: konazoli-triazoli]	MADEZ FH-U	R-79/2014 h.r.	30.09.2020	30.03.2022
Atak 450 EC	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 43,9% [grupa: imidazole]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-45/2008	28.05.2018	28.11.2019
Aviator Xpro 225 EC	0,8-1	35		Stosować od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	biksafen 7.40% [grupa: karboksamidy], protiokonazol 14.90% [grupa: triazole]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-11/2013	16.01.2016	17.07.2017
Bell 300 SC	1-1,2	35	Flexity 300 SC (dawka: 0,3)	Stosować od końca fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 29-31).	boskalid 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy], epoksykonazol 6.00% [grupa: triazole]	BASF SE Niemcy	R-27/2012	30.01.2022	30.07.2023
Boogie Xpro 400 EC	1,2-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).	biksafen 5.05% [grupa: karboksamidy], protiokonazol 10.10% [grupa: triazole], spiroksamina 25.25% [grupa: ketoaminy]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-46/2014	28.03.2024	28.09.2025
Bumper Super 490 EC	1	42		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w żdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 34,66% [grupa: imidazole], propikonazol 7,80% [grupa: triazole]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-255/2014	01.01.2025	01.07.2026
Capalo 337,5 SE	1,4-2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 6.09% [grupa: triazole], fenpropimorf 19,49% [grupa: morfoliny], metrafenon 7.31% [grupa: ketonu difenylowego]	BASF SE Niemcy	R-75/2014	14.05.2024	14.11.2025
Ceando 183 SC	1-1,5	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w żdźbło do fazy 1 kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 7,68% [grupa: triazole], metrafenon 9,26% [grupa: ketonu difenylowego]	BASF SE Niemcy	R-170/2013	30.12.2023	01.07.2025

Envoy	1,5-2	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od momentu widocznych 5 rozkrzewień do fazy pierwszego kolanka (BBCH 25-31).	epoksykonazol 6.01% [grupa: triazole], piraklostrobina 8.18% [grupa: strobiluryny]	BASF AG Niemcy	R-164/2014	31.01.2018	31.07.2019
Galileo 250 SC	0,6-0,8	35	Unix 75 WG (dawka: 0,7)	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	pikoksystrobina 22.50% [grupa: strobiluryny]	Du Pont International Operations Sarl	R-7/2012	10.07.2018	10.01.2020
Golden Prochloraz 450 EC		35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 45.00% [grupa: imidazole]	Goldengrass Ltd Dickens Ho	R-31/2014 h.r.	28.05.2018	28.11.2019
Halny 200 EC	0,15-0,25	35	Zamir 400 EW (dawka: 0,6-1)	Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 25-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-112/2013	31.07.2021	01.02.2023
Input 460 EC	0,75	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	protiokonazol 16.00% [grupa: triazole], spiroksamina 30.00% [grupa: ketoaminy]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-61/2011	05.10.2021	05.04.2023
Intizam SC	0,6	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 18.70% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 31.00% [grupa: benzimidazole]	BASF SE Niemcy	R-82/2010i.r.	28.02.2016	29.08.2017
Kloraz 450 EC	1	35		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 5,32% [grupa: imidazole]		R-6/2017	08.10.209	08.04.2021
Matador 303 SE	1,5	42		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	tetrakonazol 6,11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20,44% [grupa: benzimidazole]	SumiAgro (UK) Ltd	R-99/2008	19.12.2018	19.06.2020
Medallon 450 EC	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 43,9% [grupa: imidazole]	AGRI-GROW Sp. z o.o	R-32/2015 h.r.	08.10.2018	08.03.2020
Mirage 450 EC	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 39,65% [grupa: imidazole]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-4/2007	02.02.2017	02.08.2018
Moderator 303 SE	1,5	42		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	tetrakonazol 6,11% [grupa: triazole], tiofanat-metylowy 20,44% [grupa: benzimidazole]	Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.	R-101/2008	19.12.2018	19.06.2020
Mondatak 450 EC	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 43,9% [grupa: imidazole]	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd	R-68/2008	08.10.2018	08.04.2020
Ogam	1	35		Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 11.54% [grupa: triazole], krezoksym metylowy 11.54% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-160/2014	30.04.2020	30.10.2021

Opera Max 147,5 SE	1,5-2		35	Stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do fazy pierwszego kolanka (BBCH 25-31).	epoksykonazol 6.01% [grupa: triazole], piraklostrobina 8.18% [grupa: strobiluryny]	BASF SE Niemcy	R-33/2014	10.03.2024	10.09.2025
Opera Top	1,5-2		35	Stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do fazy pierwszego kolanka (BBCH 25-31).	epoksykonazol 6.01% [grupa: triazole], piraklostrobina 8.18% [grupa: strobiluryny]	BASF AG Niemcy	R-165/2014	31.01.2018	31.07.2019
Oranis 250 SC	0,6-0,8		35	Unix 75 WG (dawka: 0,7) Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	pikoksystrobina 22.50% [grupa: strobiluryny]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-10/2013	31.10.2017	01.05.2019
Osiris 65 EC	1,5-2,5		35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pierwszego kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 3.70% [grupa: triazole], metkonazol 2.70% [grupa: triazole]	BASF Polska Sp. z o.o.	R-87/2012	25.06.2022	25.12.2023
Palazzo	1,4-2,0		35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	fenpropimorf 19.49% [grupa: morfoliny], epoksykonazol 6.09% [grupa: triazole], metrafenon 7.31% [grupa: pochodne ketony difenylowego]	BASF SE	R-197/2015	30.04.2019	31.10.2020
pestycyd-nazwa	zastosowanie- dawka (l lub kg)	zastosowa nie- karencja	zastosowanie-w mieszaninie	zastosowanie-uwaga zalecenie	pestycyd-skladniki	pestycyd-producent-nazwa	pestycyd-zezwole nie numer	pestycyd- zezwole nie data waznosci	pestycyd-ostateczny termin obrotu srodkiem
Pixel 250 SC	0,6-0,8			Unix 75 WG (dawka: 0,7) Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	pikoksystrobina 22.50% [grupa: strobiluryny]	MADEZ FH-U	R-7/2015 h.r.	10.07.2018	10.01.2020
Pixel Prima 38 WG		2	45	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	cyprodinil 30.00% [grupa: anilinopirimidyny], pikoksystrobina 8.00% [grupa: strobiluryny]	MADEZ FH-U	R-91/2014 h.r.	21.03.2021	21.09.2022
Pro - Prochloraz 450 EC		1	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 39.65% [grupa: imidazole]	RAAT	R-7/2012 h.r	02.02.2017	03.08.2018
Prochloraz 450 EC		1	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 43.9% [grupa: imidazole]	Crop Agro Sp. z o.o.	R-3/2016 h.r.	08.10.2018	08.04.2020
Proline Max 460 EC		0,75	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	protiokonazol 16.00% [grupa: triazole], spiroksamina 30.00% [grupa: ketoaminy]	Bayer CropScience AG Niemcy	R-66/2010	12.08.2020	12.02.2022
Promax 450 EC		1	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 39.65% [grupa: imidazole]	Adama Polska Sp. z o.o.	R-38/2011i.r.	02.02.2017	03.08.2018
Realchemie Proquinazid 200 EC	0,15-0,25	x		Zamir 400 EW (dawka 0,6-1,0) Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od pełni krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 27-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	Realchemie Nederland BV	R-7/2016 h.r.	17.06.2022	17.01.2024

Salento A 450 EC		1	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 39.65% [grupa: imidazole]	AGChem Acces Limited	R-36/2012h.r.	02.02.2017	03.08.2018
Secardo 125 EC	1,33-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	epoksykonazol 6.00% [grupa: triazole], fluksapyrosad 6.00% [grupa: karboksamidy]	BASF SE Niemcy	R-22/2014	19.02.2024	20.08.2025
Spector 450 EC		1	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	prochloraz 39.65% [grupa: imidazole]	ADAMA Polska Sp. z o.o.	R-4/2012 h.r.	02.02.2017	02.08.2018
Talius 200 EC	0,15-0,25	x		Zamir 400 EW (dawka: 0,6-1) Stosować od pełni krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 27-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-80/2012	17.06.2022	17.12.2023
Tarot 200 EC	0,15-0,25		0	Zamir 400 EW (dawka: 0,6-1) Stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od pełni krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 27-31).	proquinazid 20.50% [grupa: chinazoliny]	MADEZ FH-U	R-81/2013 h.r	17.06.2022	17.12.2023
Tocata	1,4-2		35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	fenpropimorf 19.49% [grupa: morfoliny], epoksykonazol 6.09% [grupa: triazole], metrafenon 7.31% [grupa: pochodne ketonu difenylowego]	BASF SE Niemcy	R-202/2015	30.04.2019	31.10.2020
Topsin M 500 SC		1,4	35	Stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1-go kolanka (BBCH 30-31).	tiofanat-metylowy 41.91% [grupa: benzimidazole]	Nippon Soda Company Ltd	R-74/2012	17.05.2022	17.11.2023
Track 300 SC	1-1,2		35	Flexity 300 SC (dawka: 0,3) Stosować od końca fazy krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 29-31).	boskalid 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy], epoksykonazol 6.00% [grupa: triazole]	BASF SE Niemcy	R-29/2012	30.01.2022	30.07.2023
Unix 75 WG	0,7-1		42	Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2-go kolanka (BBCH 30-32).	cyprodinil 75.00% [grupa: anilinopirimidyny]	Syngenta Crop Protection AG	R-27/2013	13.02.2023	14.08.2024
Vangard 75 WG	0,7-1		42	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2-go kolanka (BBCH 30-32).	cyprodinil 75.00% [grupa: anilinopirimidyny]	Syngenta Polska sp.z o.o.	R-29/2013	30.04.2018	31.10.2019
Vareon 520 EC	0,75-1,25	x		Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 21-31).	prochloraz 28.53% [grupa: imidazole], proquinazid 3.57% [grupa: chinazoliny], tebukonazol 14.27% [grupa: konazoli-triazoli]	Du Pont Poland Sp. z o.o.	R-124/2013	31.08.2020	28.02.2022
Ventur 300 SC	1-1,2		35	Flexity 300 SC (dawka: 0,3) Stosować od końca fazy krzewienia do fazy 1-go kolanka (BBCH 29-31).	boskalid 20.80% [grupa: fenoksynikotynoanilidy], epoksykonazol 6.00% [grupa: triazole]	BASF SE Niemcy	R-28/2012	30.01.2022	30.07.2023
Vista 228 SE		1,8	35	Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 1 kolanka (BBCH 30-31).	fluchinkonazol 5.40% [grupa: triazole], prochloraz 17.40% [grupa: imidazole]	BASF Agro B.V. Szwajcaria	R-3/2008	31.12.2015	01.07.2017

