

CHOROBY

Środki ochrony roślin należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka [kg (l)/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)									
ŁAMLIWOŚĆ ŻDŹBŁA ZBÓŻ I TRAW <i>(Oculimacula acuformis, Oculimacula yallundae)</i> Łamliwość żdźbła zbóż i traw: orientacyjny próg szkodliwości: 20–30% żdźbeł z objawami porażenia	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Acanto 250 SC + Unix 75 WG IP	pikoksystrobina (250 g/l) + cyprodynil (750 g/kg)	strobiluryny + anilinopirymidyny	układowy i węglowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6–0,8 l/ha + 0,7 kg/ha	2/14		
		Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	węglowy i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 kg/ha	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamid, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protriakonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamid	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l),	imidazole,	powierzchniowy i	0,75–1,25	2/14		

			tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	triazole, quinozoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	l/ha			
	Atak 450 EC IP		prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
	Aviator Xpro 225 EC IP		protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	
	Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP		boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
	Biromil 75 WG IP		cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
	Boogie Xpro 400 ECIP		protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksyamidy, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
	Bumper Super 490 EC IP		prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
	Capalo 337,5 SE IP		fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
	Ceando 183 SC IP		metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenyłowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	
	Ceando plus IP		fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	

					interwencyjnego				
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Galileo 250 SC + Unix 75 WG IP	pikoksystrobina (250 g/l) + cyprodynil (750 g/kg)	strobiluryny, anilinopirymidyny	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6–0,8 l/ha + 0,7 kg/ha	1		
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin, imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania	1,5 l/ha	1	42	

					zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksikonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksikonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksikonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Oranis 250 SC + Unix 75 WG IP	pikoksystrobina (250 g/l) +	strobiluryny,	układowy i wgłębny,	0,6–0,8 l/ha	1		

			cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	+ 0,7 kg/ha			
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Pixel 250 SC + Unix 75 WG IP	pikoksystrobina (250 g/l) + cyprodynil (750 g/kg)	strobiluryny, anilinopirymidyny	układowy i węglbny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6–0,8 l/ha + 0,7 kg/ha	1		
		Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	węglbny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 kg	2/21	45	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	węglbny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	węglbny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	węglbny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	węglbny, do	1,0 l/ha	1	35	

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	1	35	
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l),	morfoliny, triazole,	układowy, do stosowania	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	

			metrafenon (75 g/l)	pochodne kwasu difenylowego	zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŻDŹBŁA I KORZENI (<i>Gibberella avenacea</i> , <i>Gibberella zeae</i> , <i>Gibberella</i> sp.)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	
		Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i	0,7–1,0 kg/ha	1	42	

					interwencyjnego				
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	
		Ceando Plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	Środek przy dużym nasileniu chorób i fuzaryjnej zgorzeli podstawy żdźbła i korzeni stosować w dawce 2,0 l/ha.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	

		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5 l/ha	1	42	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksikonazol (62,5 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	1	35	
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksikonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksikonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania	0,7–1,0 kg/ha	1	42	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW <i>(Blumeria graminis)</i> RDZA BRUNATNA PSZENICY <i>(Puccinia recondita f. sp. tritici)</i> SEPTORIOZY LIŚCI <i>(Mycosphaerella graminicola,</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), ikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksikonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	2,0 l/ha	2/21	35	

<i>Phaeosphaeria nodorum</i>) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach) Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia(pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia. Rdza brunatna pszenicy: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. Septorioza paskowana liści pszenicy:orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia lub 1% liści z owocnikami; w fazie strzelania w źdźbło 10–20% źdźbeł porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami. Septorioza plew (objawy na liściach):orientacyjne					interwencyjnego				
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszaninę stosować od fazy 1.-go kolanka.
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksamidy	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	2/14		

progi szkodliwości: w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w żdźbło 20% porażonej powierzchni liścia podłagowego lub 1% liści					interwencyjnego				
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy,	0,8–1,0 l/ha	1	35	

					do stosowania głównie zapobiegawczego				
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	

		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ⁰ C.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ⁰ C.
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Boogie Xpro 400 ECIP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksamidy, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/14	35	
		Brasifun 250 EC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12 ⁰ C.
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ⁰ C.
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l),	morfoliny, triazole,	układowy, do stosowania	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	

			metrafenon (75 g/l)	pochodne kwasu difenylowego	zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Ceando 183 SCIP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Ceando Plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Chefara 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

					wyniszczającego				
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

					wyniszczającego				
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 ECIP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany, triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW	proquinazid (200 g/l) +	quinozolin +	powierzchniowy,	0,15–0,25	2/14		

		IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	l/ha + 0,6– 1,0 l/ha			
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	0,8–1,0 l/ha	1	35	

					zapobiegawczego				
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek w dawce 2,0 l/ha ogranicza występowanie łamliwości żdźbła.
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw jest skuteczny przy

									stosowaniu zapobiegawczym lub w początkowej fazie rozwoju choroby.
		Matador 303 SE	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,75 l/ha	1	35	

					interwencyjnego				
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Mongur 200 ECIP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg	2/21	45	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l),	strobiluryny,	układowy i	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie

			fluksapyroksad (75 g/l)	karboksyamidy	translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha+ 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i węglony, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i węglbny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.

		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Syrius 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować w

									temperaturze powyżej 12°C.
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

					interwencyjnego				
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.

		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew.
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej.
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14	35	
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l),	triazole, strobiluryny,	powierzchniowy i układowy, do	1,25l/ha	2/14	35	Środek w zwalczaniu

			biksafen (40 g/l)	karboksyamidy	stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				septoriozy paskowanej liści stosować w dawce 1,5 l/ha.
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew.
		Vertisan 200 EC IP	pentiopirad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopirad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopirad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentiopirad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), ciprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

					interwencyjnego				
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinoxoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI	Stosowanie kwalifikowanego	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	2/14	35	

(DTR) (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Brunatna plamistość liści: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 5% liści z pierwszymi objawami	materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).				zapobiegawczego				
		Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1	42	

		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinoxoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC IP	pentioapyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentioapyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentioapyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentioapyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	0,5 l/ha	1	40	
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	2/14-28	35	

				zapobiegawczego				
	Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
	Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
	Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
	Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
	Boogie Xpro 400 ECIP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksamidy, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
	Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
	Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
	Chefara 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) +	triazole, ftalany,	powierzchniowy i układowy; do	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		

			chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	strobiluryny	stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Ceando Plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330	azoksystrobina (250 g/l) +	strobiluryny,	wgłębny i układowy;	0,6 l/ha + 0,4	1		Stosować w

		EC	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	l/ha			temperaturze powyżej 12°C.
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erasmus 250EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany, triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego,	3,0 l/ha	2/14	35	

					interwencyjnego				
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	0,8–1,0 l/ha		35	

					zapobiegawczego				
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny, imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek w dawce 2,0 l/ha ogranicza występowanie łamliwości zdźbła.
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), Corbelidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	

					interwencyjnego				
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14- 21	42	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego,	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

					interwencyjnego i wyszczającego				
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mongur 200 ECIP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	2/14	35	

					zapobiegawczego				
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,5 l/ha	2/21	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego,	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

					interwencyjnego i wyniszczającego				
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l) , tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha+ 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	0,75 l/ha+ 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze

					zapobiegawczego i interwencyjnego				powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		

		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i węglony, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest również dozwalczania fuzariozy liści.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tarcza Łan 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,8–1,0 l/ha	1	42	

					wyniszczającego				
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, węglony i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i	2,0–2,5 l/ha	2/14		

					interwencyjnego				
		Treoris 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha			
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	1,5 l/ha	2/14	35	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania	0,75–1,25 l/ha	2/14		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
	Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.	
	Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l) epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35		
	Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21			
	Vertisan 200 EC IP	pentioapyrad (200 g/l)	karboksamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14			
	Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentioapyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14			
	Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentioapyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczający	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14			
	Vertisan 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentioapyrad (200 g/l) + pikoksytrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksamidy, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14			
	Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do	0,75–1,25	1		Stosować w	

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wglębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5 l/ha	1	42	
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksamid	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	

MACZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych. Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych. gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75/ha	2/14	42	
		Flexity 300 SC IP	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/21	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania	1,0 l/ha	1	35	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew i fuza riozy kłosów.

		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha		30	Stosować w temperaturze powyżej 12 ⁰ C.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
Priori Xtra 280 SC IP		azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35		
Profinity 180 SC IP		pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49		
Property 180 SC IP		pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49		
Promax 450 EC IP		prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
Pro-Prochloraz 450 EC IP		prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
Realchemie Proquinazid 200 EC IP		proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14			
Salento A 450 EC IP		prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	1	35		

					interwencyjnego				
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania	0,15–0,25 l/ha	2/14		

					zapobiegawczego, interwencyjnego				
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
SEPTORIOZY LIŚCI (<i>Mycosphaerella graminicola</i> , <i>Phaeosphaeria nodorum</i>) (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach)	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Abringo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Avoca 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Banko 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów	1,0 l/ha	2/15	60	

		Banko 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Banko 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bumper 250 EC + Gwarant 500 SC IP	propikonazol (250 g/l) + chlorotalonil (500 g/l)	triazole, ftalany	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 1,0 l/ha			
		Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Chron 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów	1,0 l/ha	2/15	60	
		Chron 500 SC + Bumper 250	chlorotalonil (500 g/l) +	ftalany,	powierzchniowy i	1,0 l/ha + 0,5			

		EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	l/ha			
		Chron 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Comrade IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cyproxy IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dithane NeoTec 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Dove 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	

		Dove 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/15		
		Dove 500 SC + Soprano 125 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/15		
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Gwarant 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	
		Gwarant 500 SC + Soprano 125 SCIP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Guliver 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/15	60	
		Guliver 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Guliver 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania	1,0 l/ha	1	35	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha		30	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksikonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew
		Priori Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Proceed IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

					wyniszczającego				
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Sancozeb 80 WP IP	mankozeb (800 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14	42	
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów	1,0 l/ha	2/15	60	

		Talonil 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Talonil 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do	0,6 l/ha	1	35	Stosować w

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Zoxy Plus IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
RDZA BRUNATNA (<i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>tritici</i>)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW <i>(Puccinia striiformis)</i> RDZA ŻDŹBŁOWA ZBÓŻ I TRAW <i>(Puccinia graminis)</i> Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami; w fazie strzelania w źdźbło 30% porażonej powierzchni liścia podflagowego.	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany, triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek nie posiada rejestracji

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha		35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO FAZY WIDOCZNYCH PIERWSZYCH OŚCI (BBCH 41–49)									
MACZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ	Stosowanie kwalifikowanego	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	2/14	35	

I TRAW <i>(Blumeria graminis)</i> RDZA BRUNATNA PSZENICY <i>(Puccinia recondita f. sp. tritici)</i> SEPTORIOZY LIŚCI <i>(Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum)</i> (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach)	materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).				zapobiegawczego				
		Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1-2/21	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC IP	pentipyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentipyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentipyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentipyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		

		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji

					systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				do zwalczania rdzy brunatnej.
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Balear 720 SC IP	chlorotalonil (720 g/l)	ftalany	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	1,0–1,4 l/ha	2/7	35	
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania

				difenylowego	interwencyjnego				septoriozy plew.
		Boogie Xpro 400 ECIP	protriokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksyamidy, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Brasifun 250 EC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Bukat 500 SC + Joga 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenyłowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Ceando Plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenyłowego, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	

		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Chefara 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.

		Dafne 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dafne 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dafne 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Diskobol 480 SC + Artea 330	chlorotalonil (400 g/l),	ftalany,	wgłębny i układowy,	1,75–2,0 l/ha	2/14		

		EC IP	azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	+ 0,4 l/ha			
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego,	1,0 l/ha	2/21	35	

					interwencyjnego i wyniszczającego				
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy BBCH 33.
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

					interwencyjnego				
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobilurynymorfolin y	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do

					interwencyjnego				zwalczania septoriozy plew.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw jest skuteczny przy stosowaniu zapobiegawczym lub w początkowej fazie rozwoju choroby.
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		

		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Mongur 200 ECIP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	

		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Porter 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Porter 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Porter 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Propico 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.

					interwencyjnego				
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	1,0 l/ha	2/3-4 tyg	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Salento A 450 ECIP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	

		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
		Selentra 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Selentra 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Selentra 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Selentra 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i węglbny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

					interwencyjnego				
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	0,8–1,0 l/ha	1	35	

					zapobiegawczego				
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Syrius 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha			Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Talius 200 EC + Zamir 400 EWIP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna

					wyniszczającego				(BBCH 71).
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew.
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej.
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze

					zapobiegawczego i interwencyjnego				powyżej 12°C.
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,25 l/ha	2/14	35	Środek w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści stosować w dawce 1,5 l/ha.
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew
		Venturo 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować od fazy

					zapobiegawczego i interwencyjnego				3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Venturo 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vertisan 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksamidy	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania	1,0 l/ha	2/14		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	penttiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	penttiopyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczający	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Reveller 280 SC IP	penttiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Weto 250 EC	propikonazol	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do

					zapobiegawczego				zwalczania septoriozy plew.
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) <i>(Pyrenophora tritici-repentis)</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Acanto Prima 38 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l),	triazole,	układowy i quasi-	1,0 l/ha	1	35	

			krezoksym metylu (125 g/l)	strobiluryny	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Arbiter 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		

		Areva 200 EC IP	pentipyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentipyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentipyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentipyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wglębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy,	0,8–1,0 l/ha	1	35	

					do stosowania głównie zapobiegawczego				
	Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1			
	Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
	Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35		
	Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14			
	Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35		
	Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35		
	Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1			
	Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35		
	Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35		
	Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania	1,2–1,5 l/ha	2/21	35		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Boogie Xpro 400 ECIP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksamidy, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Chefara 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoskystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l),	ftalany,	powierzchniowy i	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	

			pikoksystrobina (100 g/l)	strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha		35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Diskobol 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego,	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

				interwencyjnego i wyniszczającego				
	Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
	Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
	Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
	Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
	Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
	Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
	Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
	Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
	Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania	0,6 l/ha	1	35	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		

		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25	1		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Input 460 EC IP	protriakonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12 ^o C.
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	

		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobilurynymorfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	

		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14- 21	42	
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		

					wyniszczającego				
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Olympus 480 SCIP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		

		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksamidy	układowy i translaminarny, do stosowania	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), ciprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

					interwencyjnego				
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do	1,0 l/ha	1	32	Stosować w

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				temperaturze powyżej 12°C. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), v triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha		35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do	1,0 l/ha	1		Stosować w

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				temperaturze powyżej 12°C.
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego,	1,4 l/ha	1	35	

					interwencyjnego i wycinającego				
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Travis 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Treoris 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wglębny, do stosowania	0,7–1,0 kg/ha	1	42	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	2/14	35	
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		
		Vertisan 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczający	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		

		Vertisan 200 EC + Reveller 280 SC IP	penthiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksamidy, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	

					wyniszczającego				
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek pożniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75/ha	2/14	42	
		Flexity 300 SC IP	metrafenon (300 g/l)	pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/21	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14	35	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				powyżej 12°C.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Priori Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Property 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	
		Profinity 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wglębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 01.07.2017
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW (<i>Puccinia striiformis</i>) RDZA ŻDŹBŁOWA ZBÓŻ I TRAW (<i>Puccinia graminis</i>)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze

									powyżej 12°C.
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1 l/ha	1		Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żdźbłowej.
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l),	karboksyamidy,	układowy, do	1,0 l/ha	2/21		Środek nie ma

			epoksykonazol (90 g/l)	triazole	stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017.
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej. Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie ma rejestracji do zwalczania rdzy żółtobłowej.
RDZA BRUNATNA (<i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>tritici</i>)	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania

					interwencyjnego				, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY <i>(Mycosphaerella graminicola)</i> SEPTORIOZA PLEW PSZENICY <i>(Phaeosphaeria nodorum)</i>	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby.	Abringo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego objawów	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Avoca 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Banko 500 SC + Bumper 250 ECIP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Banko 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Bumper 250 EC + Gwarant 500 SC IP	propikonazol (250 g/l) + chlorotalonil (500 g/l)	triazole, ftalany	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha + 1,0 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51)
		Chron 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Comet 200 EC	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (150 g/l)	ftalany, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwal-

					zapobiegawczego, interwencyjnego				czania septoriozy plew.
		Chron 500 SC + Soprano 125 S.C IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C..
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Comrade IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Cyproxy IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Dithane NeoTec 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha		35	
		Dove 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania	1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/15		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Dove 500 SC + Soprano 125 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha	2/15		
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Gwarant 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51)
		Guliver 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51)
		Guliver 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			Środek stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51)
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	1	35	

					interwencyjnego				
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha		30	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksikonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew
		Priori Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew
		Proceed IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		

		Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Sancozeb 80 WP IP	mankozeb (800 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14	42	
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talonil 500 SC + Bumper 250 EC IP	chlorotalonil (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,5 l/ha			
		Talonil 500 SC + Soprano 125 SC IP	chlorotalonil (500 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 1,0 l/ha			
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do	2,0–2,5 l/ha	2/14		

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Zoxy Plus IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
FAZA BBCH 51–59 (FAZA KŁOSZENIA)									
MACZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>) RDZA BRUNATNA PSZENICY (<i>Puccinia recondita</i>)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią,	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	

f. sp. <i>tritici</i>) SEPTORIOZY LIŚCI (<i>Mycosphaerella graminicola</i>, <i>Phaeosphaeria nodorum</i>) Mączniak prawdziwy zbóż i traw: orientacyjny próg szkodliwości: pierwsze objawy porażenia na liście podflagowym, flagowym lub na kłosie. Rdza brunatna pszenicy: orientacyjny próg szkodliwości: pierwsze objawy porażenia na liście podflagowym lub flagowym. Septorioza paskowana liści pszenicy: orientacyjny próg szkodliwości: 5–10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami. Septorioza plew pszenicy (objawy na liściach): orientacyjny próg szkodliwości: w fazie początku kłoszenia – 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami, w fazie pełni kłoszenia –	właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, quasi-układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1-2/21	35	Środek można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	Triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH

1% porażonej powierzchni liścia (septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy – objawy na liściach)				wyniszczającego				55).
	Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
	Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
	Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
	Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
	Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
	Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
	Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
	Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
	Arbiter 520 EC	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy, układowy; do stosowania	0,75–1,25 l/ha	2		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Areva 200 EC IP	pentioapyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentioapyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentioapyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentioapyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfolin	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy,	0,8–1,0 l/ha	1	35	

					do stosowania głównie zapobiegawczego				
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy; do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Aviator Xpro 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2	35	
		Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azteq 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Balear 720 SC IP	chlorotalonil (720 g/l)	ftalany	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	1,0–1,4 l/ha	2/7	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksikonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszaninę nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Boogie Xpro 400 ECIP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksyamidy, ketoaminy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2	35	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Brasifun 250 EC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczeg,	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy

					interwencyjnego i wyniszczającego				kłósenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszanie stosować do połowy fazy kłósenia (BBCH 55).
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2	35	
		Ceando 183 SC IP	metrafenon (100 g/l), epoksykonazol (83 g/l)	pochodne kwasu difenylowego, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,5 l/ha	2	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Ceando Plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego, morfoliny	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) +	triazole, ftalany,	powierzchniowy i układowy, do	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy

			chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	strobiluryny	stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha		35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Dafne 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Dafne 250 EC + Propico 250	difenokonazol (250 g/l) +	triazole	układowy, do	0,3 l/ha + 0,5	2/14		Mieszaninę

		EC	propikonazol (250 g/l)		stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	l/ha			stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Dafne 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksikonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Diskobol 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy,	0,8–1,0 l/ha	1	35	

					do stosowania głównie zapobiegawczego				
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC		azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1			
Dobromir Top 250 SC IP		azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35		
Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC		azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1			
Domnic 250 EW IP		tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28		
Dubler Mega 497 SCIP		tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35		
Duett Star 334 SE IP		fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35		
Duett Ultra 497 SC IP		tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania	0,6 l/ha	1	35		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Eminent 125 ME	tetrakonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Impact 125 SC IP	flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Joga 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.

		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobilurynymorfolin y	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania

									septoriozy plew.
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfolin	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14- 21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zboż i traw jest skuteczny przy stosowaniu zapobiegawczym lub w początkowej fazie rozwoju choroby.
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,5 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) +	triazole, strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy

			azoksystrobina (250 g/l)		zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Olympus 480 SCIP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Porter 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Porter 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Porter 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33).
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.

		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksyamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej.
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Propico 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	

		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	

		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Selentra 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	
		Selentra 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		
		Selentra 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		
		Selentra 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) +	triazole	układowy, do	0,75 l/ha +	2/21	35	

			tebukonazol (250 g/l)		stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha			
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	35	
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do pełnifazy kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha		35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek zarejestrowany jest również do zwalczania fuzariozy liści.
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	

		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Syrius 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha			Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		

		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początkufazy kwitnienia (BBCH 61).
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew. Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej.
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,25 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie jest

									zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,25 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek w zwalczaniu septoriozy paskowanej liści stosować w dawce 1,5 l/ha.
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy ple Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH

									55).
		Venturo 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	
		Venturo 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Vertisan 200 EC IP	pentiopryrad (200 g/l)	karboksamidy	powierzchniowy, węglony i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentipyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentipyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentipyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksamidy, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EWIP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Weto 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania

									septoriozy plew.
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew.
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR) <i>(Pyrenophora tritici-repentis)</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy

					zapobiegawczego				kwitnienia (BBCH 69).
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Arbiter 520 EC	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l),	imidazole, triazole,	powierzchniowy, układowy; do	0,75–1,25 l/ha	2		

			proquinazid (40 g/l)	quinozoliny	stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Areva 200 EC IP	penttiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	penttiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	penttiopyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Reveller 280 SC IP	penttiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego,	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

				interwencyjnego i wyniszczającego				
	Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
	Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
	Atak 450 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
	Aylora 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
	Aviator Xpro 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2	35	
	Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
	Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
	Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
	Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Bell 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bell 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Boogie Xpro 400 ECIP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksyamidy, ketoaminy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2	35	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2	35	
		Ceando Plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego, morfoliny	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) +	triazole, ftalany,	powierzchniowy i układowy; do	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy

			chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	strobiluryny	stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy,	1,0 l/ha	2/14-	35	Środek stosować

					do stosowania głównie zapobiegawczego		28		do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Diskobol 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	

		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrakonazol (62,5 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Envoy IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha		35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		

		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		

		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	węglony i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobilurynymorfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	węglony i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l),	strobiluryny, triazole	węglony i układowy, do stosowania	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

			cyprokonazol (80 g/l)		zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	

				interwencyjnego				
	Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
	Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
	Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
	Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
	Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
	Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
	Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
	Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
	Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania	1,75 l/ha	1	35	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mongur 200 ECIP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Olympus 480 SCIP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Opera Max 147,5 SE IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Opera Top IP	piraklostrobina (85 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1,0 l/ha	2/14	35	

				zapobiegawczego				
	Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
	Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
	Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
	Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg	2/21	45	
	Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
	Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
	Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksyamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
	Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
	Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
	Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l),	triazole,	układowy, do	1,0 l/ha	1	35	

			spiroksamina (300 g/l)	ketoaminy	stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6– 1,0 l/ha	2/14		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i węglony, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l),	ketoaminy,	układowy, do	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować

			tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	triazole	stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				kwitnienia (BBCH 69).
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Track 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Track 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha	2/21		Mieszaninę można stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Travis 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Treoris 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		

		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Ventur 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l)	aniliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ventur 300 SC + Flexity 300 SC IP	boskalid (233 g/l), epoksykonazol (67 g/l) + metrafenon (300 g/l)	aniliny, triazole + pochodne ketonu difenyłowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,2 l/ha + 0,3 l/ha			Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Vertisan 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksamidy	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	penttiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	penttiopyrad (200 g/l) + epoksykonazol (125 g/l)	karboksyamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczający	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Reveller 280 SC IP	penttiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wglębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania	1,5–1,75 l/ha	1	42	

					zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
MACZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają kleistoteczja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75/ha	2/14	42	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Kendo 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza również występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew i fuzariozy kłosów.
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Merces 50 EW IP	cyflufenamid (50 g/l)	fenyloacetamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,2–0,3 l/ha	2/28	48	Środek ogranicza występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy

									plew i fuzariozy kłosów.
	Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).	
	Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha		30	Środek ogranicza występowanie fuzariozy kłosów.	
	Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).	
	Priori Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35		
	Profinity 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	Środek stosować do pełnifazy kwitnienia (BBCH 65).	
	Property 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).	
	Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14			
	Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).	
	Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14			

		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
RDZA ŻÓŁTA ZBÓŻ I TRAW <i>(Puccinia striiformis)</i> RDZA ŻDŹBŁOWA ZBÓŻ I TRAW <i>(Puccinia graminis)</i> Rdza żółta zbóż i traw: orientacyjny prógškod-	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy żółtej. Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji

liwość: pierwsze objawy porażenia na liściu pod- flagowym lub flagowym				zapobiegawczego i interwencyjnego				do zwalczania rdzyż dźbłowej.
	Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzyż dźbłowej.
	Eminent 125 ME	tetrazonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy dźbłowej.
	Eminent Star 312 SE	chlorotalonil (250 g/l), tetrazonazol (62,5 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzyż dźbłowej.
	Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzyż dźbłowej.
	Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzyż dźbłowej.
	Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14- 21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzyż dźbłowej.

		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzyż dźbłowej.
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy dźbłowej. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzyż dźbłowej
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie

									posiada rejestrację do zwalczania rdzy żółtej.
RDZA BRUNATNA <i>(Puccinia recondita f. sp. tritici)</i>	Niszczenie samosiewów pszenicy i pszenżyta, uprawa odmian o podwyższonej odporności.	Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Hajduk 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Tarcza Łan Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
		Victosar 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	1		
SEPTORIOZA PASKOWANA LIŚCI PSZENICY <i>(Mycosphaerella graminicola)</i> SEPTORIOZA PLEW PSZENICY <i>(Phaeosphaeria nodorum)</i>	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródeł infekcji, niszczenie samosiewów, odpowiednie nawożenie, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez	Abringo 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Avoca 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	

	sprawcę choroby.	Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy, translaminarny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,8–1,25	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Comrade IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Corbel 750 EC IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Cyproxy IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Dithane NeoTec 75 WG IP	mankozeb (750 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14		
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do	1,0 l/ha	1	35	

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Halny 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Limero IP	fenpropimorf (750 g/l)	morfoliny	układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Mystic 250 EC	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha		30	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew. Środek ogranicza występowanie fuzariozy kłosów.
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania	1,5 l/ha	2/14	42	Środek nie posiada rejestracji

					zapobiegawczego				do zwalczania septoriozy plew.
		Priori Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Proceed IP	chlorotalonil (375 g/l), cyprokonazol (40 g/l)	ftalany, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	2,0 l/ha	2/21	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania septoriozy plew.
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Sancozeb 80 WP IP	mankozeb (800 g/kg)	ditiokarbaminiany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 kg/ha	3/14	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania

									09.07.2017
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wglębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Zoxy Plus IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania

									septoriozy plew.
SEPTORIOZA PLEW PSZENICY <i>(Phaeosphaeria nodorum)</i>	Głęboka orka przedzimowa mająca na celu zniszczenie źródła infekcji, uprawa odmian mniej podatnych na porażenie przez sprawcę choroby, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego.	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Acanto Prima 38 WG IP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfolina + imidazole + triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Ambrossio 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1-2/21	35	
		Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	Triazole	układowy, do stosowania	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszanie stosować do

					zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ambrossio 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	1-2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l),	morfoliny + imidazole,	układowy, do stosowania	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		

			propikonazol (90 g/l)	triazole	zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Arbiter 520 EC	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozoliny	powierzchniowy, układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
		Areva 200 EC IP	pentiopyrad (200 g/l)	karboksyamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Areva 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentiopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksyamidy + triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		
		Areva 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentiopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksyamidy + strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Artea 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l),	imidazole, triazole,	układowy, do stosowania	2,0 l/ha	2/14	42	Środek stosować do początku fazy

			fenpropidyna (150 g/l)	morfoliny	zapobiegawczego, interwencyjnego				kwitnienia (BBCH 61).
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Aviator Xpro 225 EC	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	Układowy, do stosowania	0,8–1,0 l/ha	2	35	

					zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Aylora 350 SC IP	pentopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksyamidy, ftalany	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie systemiczny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Balear 720 SC IP	chlorotalonil (720 g/l)	ftalany	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	1,0–1,4 l/ha	2/7	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Boogie Xpro 400 ECIP	protiokonazol (100 g/l), biksafen (50 g/l), spiroksamina (250 g/l)	triazole, karboksamidy, ketoaminy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2	35	
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Bukat 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Joga 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH

					wyniszczającego				55).
		Bukat 500 SC + Propico 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bukat 500 SC + Weto 250 EC IP	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Bumper 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Capalo 337,5 SE IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2	35	
		Ceando Plus IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	triazole, pochodne kwasu difenylowego, morfoliny	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4-2,0 l/ha	2	35	
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Cortez 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Cratos 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	

					interwencyjnego				
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chefara 330 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,75–2,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Chloroflash 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Credo 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Dafne 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Dafne 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Dafne 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Dafne 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha		35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Diskobol 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna

									(BBCH 75).
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości mleczonej ziarna (BBCH 75).
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mleczonej ziarna (BBCH 75).
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości mleczonej ziarna (BBCH 75).
		Doolin 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Domnic 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0–1,25 l/ha	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania	0,6 l/ha	1	35	

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mleczonej ziarna (BBCH 75).
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fender 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do	0,5 l/ha	1	35	

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
Galileo 250 SC IP		pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35		
Golden Prochloraz 450 EC IP		prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
Halny 200 EC IP		proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14			
Halny 200 EC + Zamir 400 EW IP		proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	
Helicur 250 EW IP		tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).	
Impact 125 SC IP		flutriafol (125 g/l)	triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).	
Input 460 EC IP		protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego,	1,0 l/ha	1	35		

					interwencyjnego				
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Jetzone 250 EC IP	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do	1,0 l/ha	1	35	

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Kosa 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Ksykon 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14- 21	42	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Martens 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	

		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole, strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole, ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Mirador Forte 160 EC IP	azoksystrobina (60 g/l), tebukonazol (100 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,75 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania	1,5–1,75 l/ha	1	42	

					zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mongur 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Mongur 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Optan 183 SE IP	piraklostrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 l/ha	1	35	
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).

					wyniszczającego				
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Palazzo IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Pixel Prima 328 WGIP	cyprodynil (30%), pikoksystrobina (8%)	anilinopirymidyny, strobiluryny	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 kg/ha	2/21	45	
		Plinker 600 SC IP	chlorotalonil (500 g/l), pikoksystrobina (100 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,6–2,0 l/ha	2/14	35	
		Porter 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	Środek stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Porter 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Porter 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Porter 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	1	35	

					interwencyjnego				
		Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Priori Xtra 280 SC IP	azoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	2/28	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Realchemie Proquinazid 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Realchemie Proquinazid 200 EC + Zamir 400 EW	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie	1.0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do fazy

					zapobiegawczego				dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Rialto 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	1	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Safir 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości

					interwencyjnego				wodnej ziarna (BBCH 71).
		Selentra 250 EC	difenokonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	2/14	61	
		Selentra 250 EC + Joga 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		
		Selentra 250 EC + Propico 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		
		Selentra 250 EC + Weto 250 EC	difenokonazol (250 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,3 l/ha + 0,5 l/ha	2/14		
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) +	triazole	układowy, do	0,75 l/ha +	2/21		

			tebukonazol (250 g/l)		stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha			
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Środek zarejestrowany jest do zwalczania fuzariozy liści.
		Soprano 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/14	28	
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy,	0,8–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować

					do stosowania głównie zapobiegawczego				do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszaninę stosować do fazy dojrzałości młecznej ziarna (BBCH 75).
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Talius 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Talius 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tarcza Łan 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tarot 200 EC IP	proquinazid (200 g/l)	quinozoliny	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Tarot 200 EC + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozoliny + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75).
		Tebkin 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tebusha 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	28	
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata IP	fenpropimorf (200 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l), metrafenon (75 g/l)	morfoliny, triazole, pochodne kwasu difenylowego	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,4–2,0 l/ha	2/21	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początkufazy kwitnienia (BBCH 61).
		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna

					wyniszczającego				(BBCH 71).
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Travis 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Treoris 350 SC IP	pentiopirad (100 g/l), chlorotalonil (250 g/l)	karboksamidy, ftalany	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Unicorn + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Unicorn IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vareon 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluksastrobina (50 g/l),	triazole, strobiluryny,	powierzchniowy i układowy, do	1,25 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy

			biksafen (40 g/l)	karboksyamidy	stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				kwitnienia (BBCH 69).
		Venturo 500 SC IP	tebukonazol (500 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	2/21	35	
		Venturo 500 SC + Dafne 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha		67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Joga 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha		67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Porter 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha		67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Propico 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha		67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Selentra 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + difekonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,3 l/ha		67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Venturo 500 SC + Weto 250 EC	tebukonazol (500 g/l) + propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,25 l/ha + 0,5 l/ha		67	Mieszaninę stosować do połowy fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości

					interwencyjnego				wodnej ziarna (BBCH 71).
		Vertisan 200 EC IP	pentopyrad (200 g/l)	karboksamidy	powierzchniowy, wglębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Orius Extra 250 EW IP	pentopyrad (200 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	karboksamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Soprano 125 SC IP	pentopyrad (200 g/l) + epoksikonazol (125 g/l)	karboksamidy, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczający	1,0 l/ha + 0,75 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vertisan 200 EC + Reveller 280 SC IP	pentopyrad (200 g/l) + pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	karboksamidy, strobiluryny, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha + 0,6 l/ha	2/14		Mieszaninę stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Vima-Proquinazid IP	proquinazid (200 g/l)	quinozolin	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha	2/14		
		Vima-Proquinazid + Zamir 400 EW IP	proquinazid (200 g/l) + prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	quinozolin + imidazole, triazole	powierzchniowy, wglębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,15–0,25 l/ha + 0,6–1,0 l/ha	2/14		
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wglębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Wirtuoz 520 EC IP	prochloraz (320 g/l), tebukonazol (160 g/l), proquinazid (40 g/l)	imidazole, triazole, quinozolin	powierzchniowy i układowy, do stosowania	0,75–1,25 l/ha	2/14		Środek ogranicza występowanie czerni zbóż.

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzłości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzłości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ (<i>Gibberella avenacea</i> , <i>Gibberella zeae</i> , <i>Gibberella</i> sp., <i>Monographella nivalis</i>)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksikonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksamidy, triazole, strobiluryny	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l),	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

			cyprokonazol (80 g/l)		zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy,	1,0 l/ha	2/14-	35	Środek stosować

					do stosowania głównie zapobiegawczego		28		do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Bounty 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Caramba 60 SL	metkonazol (60 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,2–1,5 l/ha	2/21	35	
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Clayton Tabloid EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Darcos 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego,	1,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

					interwencyjnego i wyniszczającego				
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Erasmus 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14- 28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Falcon 460 EC	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Fandango 200 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (100 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany, triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować od końca fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 59-69).
		Furtado 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Helicur 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfolin y	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	17	35	
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	

		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Lerak 200 EC IP	azoksystrobina (75 g/l), tebukonazol (125 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,5–2,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Matsuri 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0–2,5 l/ha	2/14		
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy

					zapobiegawczego i interwencyjnego				kwitnienia (BBCH 69).
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha			Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Polygreen Fungicide WPIP	oospory <i>Pythium oligandrum</i>	metoda biologiczna	zapobiegawcze, powoduje rozkład strzępek patogenicznych organizmów.	0,1 kg/ha			Środek stosować w następujących terminach: - pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3–5 liści (BBCH 13–15), - drugi zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25–37), - trzeci zabieg wykonać od fazy kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55–65).
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21	2/21	
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) +	triazole	układowy, do	0,75 l/ha +	2/21	2/21	

			tebukonazol (250 g/l)		stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha			
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

					zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Secardo XE 125 EC + Corbel 750 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	karboksyamidy, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,5 + 0,5 l/ha	1		Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Sokolov 250 EW	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	32	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 07.06.2017
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/16	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do pełni fazy kwitnienia (BBCH 65).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Spekfree 430 SC IP	tebukonazol (430 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Starpro 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).

		Syrius 250 EWIP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha			Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tebu 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14-28	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Toledo 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do początkufazy kwitnienia (BBCH 61).

		Toledo Extra 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Trion 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	±		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksyamidy	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,25 l/ha	2/14	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Ventoux 430 SC IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania	1,5–1,75 l/ha	1	42	

					zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Zamir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Zantara 216 EC IP	tebukonazol (166 g/l), biksafen (50 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,9–1,2 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
CZERŃ ZBÓŻ (Alternaria spp., Cladosporium spp.)	Zapobieganie rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).	Amistar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny +triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascom 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azotrobin 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy,	0,8–1,0 l/ha	1	35	

					do stosowania głównie zapobiegawczego				
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dedal 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dubler Mega 497 SCIP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,6 l/ha	1	35	

					interwencyjnego				
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Duett Ultra 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Dultreks-Pro 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Epoksy 125 SC IP	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2	35	
		Epoksy 125 SC + Riza 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Epoksy 125 SC + Sparta 250 EW IP	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2		
		Fezan Plus 226 SC IP	chlorotalonil (166 g/l), tebukonazol (60 g/l)	ftalany, triazole	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	3,0 l/ha	2/14	35	Środek stosować od końca fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 59-69).
		Intizam 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l), epoksykonazol (187 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	

		Jay 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Kask 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mirador 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Środek stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Raster 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Raster 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

					interwencyjnego				
		Raster 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rekord 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rekord 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rekord 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Respekto 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Respekto 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rubric 125 SC	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Rubric 125 SC + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Rubric 125 SC + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		

		Slapper	epoksykonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Slapper + Sparta 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Slapper + Riza 250 EW	epoksykonazol (125 g/l) + tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		
		Soleil 274 EC	bromukonazol (167 g/l), tebukonazol (107 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2 l/ha	1	42	Środek stosować do pełnifazy kwitnienia (BBCH 65).
		Starami 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Swing Plus IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Swing Top 183 SC IP	dimoksystrobina (133 g/l), epoksykonazol (50 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Tandem 497 SC IP	tiofanat metylowy (310 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha	1	35	
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	1,0 l/ha	2/21	35	

					wyniszczającego				
		Tenore 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania , przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Zafir 400 EW IP	prochloraz (267 g/l), tebukonazol (133 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	