

CHOROBY

Środki ochrony roślin należy używać zgodnie z etykietą stosowania środka ochrony roślin.

Organizm szkodliwy	Niechemiczne metody ochrony	Środki ochrony roślin	Substancja czynna / zawartość	Grupa chemiczna	Działanie	Dawka [kg]/ha]	Maksymalna liczba zabiegów / minimalny odstęp między zabiegami (dni)	Karencja (dni)	Dodatkowe informacje o stosowaniu środka / zabiegach
KONIEC FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 1. KOLANKA, A NIEKIEDY NAWET 2. (BBCH 29–32)									
ŁAMLIWOŚĆ ŻDŹBŁA ZBÓŻ I TRAW (<i>Oculimacula acuformis</i> , <i>Oculimacula yallundae</i>) Łamliwość żdźbła zbóż i traw: orientacyjny próg szkodliwości: 20–30% żdźbeł z objawami porażenia	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	
		Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	

		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	

		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego,	1,4 l/ha	1	35	

					interwencyjnego i wyniszczającego				
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
FUZARYJNA ZGORZEL PODSTAWY ŻDŹBŁAI KORZENI (<i>Gibberella avenacea</i> , <i>Gibberella zeae</i> , <i>Gibberella</i> sp.)	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.

		Aviator Xpro 225 EC IP	protriokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	
		Input 460 EC IP	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Proline Max 460 EC	protriokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata Duo	epoksykonazol (125 g/l),	triazole,	układowy i quasi- układowy, do	1,0 l/ha	1	35	

		IP	krezoksym metylu (125 g/l)	strobiluryny	stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>) PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA (<i>Pyrenophora Teres</i>) RDZA JĘCZMIENIA (<i>Puccinia hordei</i>) RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Mączniak prawdziwy zbóż i traw – orientacyjne progi szkodliwości:	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Amadeus 225 EC	protiokonazol (150 g/l),	triazole,	układowy, do stosowania	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	Okres na zużycie dla

w fazie krzewienia – 25–35% roślin z pierwszymi objawami porażenia (pojedyncze, białe skupiska struktur grzyba); w fazie strzelania w źdźbło – 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. Plamistość siatkowa jęczmienia – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w źdźbło 15–20% liści z objawami choroby. Rdza jęczmienia – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia; w fazie strzelania w źdźbło 10% powierzchni liści z pierwszymi objawami porażenia.		IP	biksafen (75 g/l)	karboksyamidy	zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha			
		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny + triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego,	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

Rynchosporioza zbóż – orientacyjne progi szkodliwości: w fazie krzewienia – 15–20% powierzchni liści z objawami choroby; w fazie strzelania w żdźbło 15–20% powierzchni liści z objawami choroby.			(80 g/l)		interwencyjnego i wyniszczającego				
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamid	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2/14	35	
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania	1,0 l/ha	2/12-21	35	

					głównie zapobiegawczego				
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole + strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy i translamarny, do	0,8-1,25 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji

					stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego				do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/14		
		Diskobol 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny + triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol	strobiluryny +	wgłębny i układowy, do stosowania	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

			(250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Frelizon 240 SC IP	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g/l)	karboksamidy, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Galileo 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l),	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego,	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			

			ciprokonazol (80 g/l)		interwencyjnego i wyniszczającego				
		Juwel TT 483 SE IP	epoksikonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1		
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), ciprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		

		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek ogranicza występowanie ramularii.
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole + strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

			(80 g/l)		wyniszczającego				
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha	1	42	
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/14		
		Olympus 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny + triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75-2,0 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	
		Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania

									rynchosporiozy zbóż.
	Osiris 65 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–2,5 l/ha	2/21	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.	
	Osiris 65 EC + Corbel 750 EC IP	epoksykonazol (37,5 g/l), metkonazol (27,5 g/l) + fenpropimorf (750 g/l)	triazole + morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5 l/ha + 0,5 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.	
	Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35		
	Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
	Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.	
	Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksyamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35		
	Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
	Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35		
	Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l),	triazole,	układowy, do stosowania	1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze	

			spiroksamina (300 g/l)	ketoaminy	zapobiegawczego i interwencyjnego				powyżej 12°C.
		Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Prosaro 250 EC IP	protriakonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wglębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33–2,0 l/ha	2/21	35	
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	

		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017.
		Soligor 425 EC IP	protriokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	1	35	
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	

		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Stosować w temperaturze powyżej 12°C.

					i interwencyjnego				
		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Stosować w temperaturze powyżej 12°C. Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksamidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,0-1,25 l/ha	2/14	35	Środek w zwalczaniu plamistości siatkowej, mączniaka prawdziwego stosować w dawce 1,25 l/ha.
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,5 l/ha	1	42	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego	0,75 l/ha	2/14	42	

	kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych. Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.				i interwencyjnego				
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75/ha	2/14	42	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Leander 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Profinity 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	
		Property 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	

					i interwencyjnego				
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	
		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
RDZA JĘCZMIENIA (<i>Puccinia hordei</i>)		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	
		Zaftra SC	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do	1,0 l/ha	1	35	

		IP			stosowania głównie zapobiegawczego				
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		Abringo 500 SC	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		
RAMULARIOZA JĘCZMIENIA (<i>Ramularia collo- cygni</i>)		Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017.
POCZĄTEK GRUBIENIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO DO POCZĄTKU FAZY KŁOSZENIA, A NIEKIEDY DO KOŃCA									

FAZY KŁOSZENIA (BBCH 41–59)

MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW <i>(Blumeria graminis)</i> PLAMISTOŚĆ SIATKOWA JĘCZMIENIA <i>(Pyrenophora teres)</i> RDZA JĘCZMIENIA <i>(Puccinia hordei)</i> RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ <i>(Rhynchosporium secalis)</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Acanto 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Adexar Plus IP	fluksapyroksad (41,6 g/l), epoksykonazol (41,6 g/l), piraklostrobina (66,6 g/l)	karboksyamidy, triazole, strobiluryny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Allegro 250 SC IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, quasi-układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Amadeus 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksyamidy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6–0,8 l/ha	2	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51). Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 17.07.2017.
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		

		Andros 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Atleta 480 SC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/14		Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Atleta 480 SC + Artea 330 EC	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny + triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75–2,0 l/ha + 0,4 l/ha			Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Artea 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Atak 450 EC	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny; do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH

					interwencyjnego				51).
		Altan 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Artemis 450 EC IP	prochloraz (200 g/l), tebukonazol (100 g/l), fenpropidyna (150 g/l)	imidazole, triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Aviator Xpro 225 EC IP	protiokonazol (150 g/l), biksafen (75 g/l)	triazole, karboksamidy	układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	2	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Barclay Bolt XL EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy

				interwencyjnego				kłoszenia (BBCH 51).
	Barclay Propizole EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Biromil 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
	Buffer 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
	Bumper Super 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy; do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
	Chefara 330 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	40	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Chefara 330 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole + strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).

		Comet 200 EC	piraklostrobina (200 g/l)	strobiluryny	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8- 1,25 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw.
		Delaro 325 SC IP	protiokonazol (175 g/l), trifloksystrobina (150 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy, translaminarny i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Diskobol 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l))	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/14		Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Diskobol 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny + triazole	powierzchniowy, wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,75– 2,0 l/ha + 0,4 l/ha	2/14		Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol	strobiluryny +	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego,	0,6 l/ha + 0,4	1		

			(250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	triazole	interwencyjnego i wyniszczającego	l/ha			
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksikonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Falcon 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/14	35	Środek można stosować od fazy BBCH 33. Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Fentop 750 EC + Bumper Super 490 EC IP	fenpropidyna (750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	morfoliny + imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,6 l/ha + 1,0 l/ha	1		Mieszanina nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Frelizon 240 SC IP	pentiopyrad (160 g/l), pikoksystrobina (80 g.l)	karboksyamidy, strobiluryny	powierzchniowy, wgłębny i lokalnie układowy, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego	1,25 l/ha	2/14		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
		Galileo 250 SC	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do

		IP			zapobiegawczego				początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Golden Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Input 460 EC IP	protiokonazol (160 g/l), spirosamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębnny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Juwel TT 483 SE IP	epoksykonazol (83 g/l), krezoksym metylowy (83 g/l), fenpropimorf (317 g/l)	triazole, strobiluryny, morfoliny	układowy i quasi-układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,2–1,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębnny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Kloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębnny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębnny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Leander 750 EC + Bumper Super 490 EC	fenpropidyna	morfoliny +	układowy, do	0,6 l/ha	1		Mieszanina nie

		IP	(750 g/l) + prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	+ 1,0 l/ha			posiada rejestrację do zwalczania rynychosporiozy zbóż. Mieszaninę można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Librax IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), metkonazol (45 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,33– 2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Lotus Top 140 EC IP	epoksykonazol (40 g/l), fenpropidyna (100 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0–2,5 l/ha	2/14	35	
		Manitoba 425 SC	epoksykonazol (50 g/l), folpet (375 g/l)	triazole, ftalimidy	układowy i powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14-21	42	Środek można stosować do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65). Środek ogranicza występowanie ramularii.
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5– 1,75 l/ha	1	42	

		Medallon 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Menara 410 EC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,5 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Menara 410 EC + Amistar 250 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + azoksystrobina (250 g/l)	triazole + strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 0,6 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Menara 410 EC + Olympus 480 SC IP	propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (160 g/l) + chlorotalonil 400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	triazole + ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,4 l/ha + 1,5–1,8 l/ha	1		Mieszaninę można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Mondapropico EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Mondatak 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	1	35	

				interwencyjnego				
	Ogam IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Olympus 480 SC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l)	ftalany, strobiluryny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/14		Środek można stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49).
	Olympus 480 SC + Artea 330 EC IP	chlorotalonil (400 g/l), azoksystrobina (80 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	ftalany, strobiluryny + triazole	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyszczupiającego	1,75- 2,0 l/ha + 0,4 l/ha	1		Mieszanie można stosować do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49).
	Oranis 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Orius Extra 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
	Pixel 250 SC IP	pikoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Posse 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy

				interwencyjnego				kłoszenia (BBCH 51).
	Posse Plus 490 EC IP	prochloraz (400 g/l), propikonazol (90 g/l)	imidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,0 l/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia.
	Priaxor IP	piraklostrobina (150 g/l), fluksapyroksad (75 g/l)	strobiluryny, karboksyamidy	układowy i translaminarny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75-1,5 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
	Prima 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Proline Max 460 EC	protiokonazol (160 g/l), spiroksamina (300 g/l)	triazole, ketoaminy	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Propicoflash EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
	Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
	Reveller 280 SC IP	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i	0,8–1,0 l/ha	1	35	

			(80 g/l)		interwencyjnego				
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Riza 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Secardo XE 125 EC IP	fluksapyroksad (62,5 g/l), epoksykonazol (62,5 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego	1,33– 2,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw. Środek można stosować od początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Sherlock 280 SC	pikoksystrobina (200 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny, triazole	układowy i wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,8–1,0 l/ha		35	
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania mączniaka prawdziwego zboż i traw. Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017.

									Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Sokół 460 EC IP	spiroksamina (250 g/l), tebukonazol (167 g/l), triadimenol (43 g/l)	ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha	2/14	35	Środek można stosować od fazy 3. kolanka (BBCH 33). Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protriakonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Sparta 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Syrius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1		Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynchosporiozy zbóż.
		Tango Star IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksykonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).

		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tocata Duo IP	epoksykonazol (125 g/l), krezoksym metylu (125 g/l)	triazole, strobiluryny	układowy i quasi- układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Trapinazol 250 EC	propikonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Troja 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/14	35	

		Tyberius 250 EW IP	tebukonazol (250 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0– 1,25 l/ha	1		Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rynychosporiozy zbóż.
		Unix 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Vangard 75 WG IP	cyprodynil (750 g/kg)	anilinopirymidyny	wgłębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,7–1,0 kg/ha	1	42	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Variano Xpro 190 EC IP	protiokonazol (100 g/l), fluoksastrobina (50 g/l), biksafen (40 g/l)	triazole, strobiluryny, karboksamid	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0- 1,25 l/ha	2/14	35	Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61). Środek w zwalczaniu plamistości siatkowej jęczmienia, mączniaka prawdziwego zbóż i traw stosować w dawce 1,25 l/ha.
		Yamato 303 SE	tiofanat metylowy	benzimidazole,	układowy, do stosowania	1,5– 1,75	1	42	

		IP	(233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	triazole	zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	l/ha			
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
MĄCZNIAK PRAWDZIWY ZBÓŻ I TRAW (<i>Blumeria graminis</i>)	Zaleca się wykonanie podorywki i starannej orki w celu zniszczenia resztek poźniwnych, na których dojrzewają kleistotecja (owocniki) sprawcy choroby. Unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem, unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samyh gatunków zbóż, uprawa odmian odpornych.	Altan 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Andros 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	imidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Atlas 500 SC IP	chinoksyfen (500 g/l)	fenoksychiniony	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	0,2–0,3 l/ha	2/10	49	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Fentop 750 EC IP	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,75/ha	2/14	42	Środek można stosować do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Leander 750 EC	fenpropidyna (750 g/l)	morfoliny	układowy, do stosowania	0,75 l/ha	2/14	42	Środek można stosować do

		IP			zapobiegawczego i interwencyjnego				widocznych pierwszych ości (BBCH 49).
		Mirage 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Promax 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Profinity 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Property 180 SC IP	pyriofenon (180 g/l)	pochodne arylofenylo ketonu	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	0,5 l/ha	2/14	49	Środek nie posiada rejestracji do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Pro-Prochloraz 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Salento A 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
		Spector 450 EC IP	prochloraz (450 g/l)	imidazole	wglębny, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

		Vista 228 SE	prochloraz (174 g/l), fluchinkonazol (54 g/l)	imidazole, triazole	wgłębny i układowy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,8 l/ha		35	Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 01.07.2017 Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
RDZA JĘCZMIENIA (Puccinia hordei)		Conclude SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Globaztar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Yo-Yo IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
		Zaftra SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71).
RYNCHOSPORIOZA ZBÓŻ		Abringo 500 SC	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania	2,0 l/ha	2/15		Środek można stosować do

(Rhynchosporium secalis)					zapobiegawczego				początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Phoenix 500 SC IP	folpet (500 g/l)	ftalimidy	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	1,5 l/ha	2/14	42	
		Polonil 500 SC IP	chlorotalonil (500 g/l)	ftalany	powierzchniowy, do stosowania zapobiegawczego	2,0 l/ha	2/15		Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
RAMULARIOZA JĘCZMIENIA (Ramularia collo-cygni)		Bontima 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		
		Limba 250 EC	izopirazam (62,5 g/l), cyprodynil (187,5)	karboksyamidy, anilinopirymidyny	powierzchniowy i układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	2,0 l/ha	2/14		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Seguris 215 SC IP	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
		Sigma 215 SC	izopirazam (125 g/l), epoksykonazol (90 g/l)	karboksyamidy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego	1,0 l/ha	2/21		Okres na zużycie dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania 09.07.2017. Środek można stosować do początku fazy kwitnienia (BBCH

									61).
FUZARIOZA KŁOSÓW ZBÓŻ <i>(Gibberella avenacea, Gibberella zeae, Gibberella sp., Monographella nivalis)</i>	Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, niszczenie źródeł infekcji pierwotnych, podorywka i głęboka orka jesienią, właściwe nawożenie (z zachowaniem odpowiedniego stosunku NPK).	Agristar 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Amistar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Ascom 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Astar 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Azotrobin 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	

		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Dobromir 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Super 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Dobromir Top 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Duett Star 334 SE IP	fenpropimorf (250 g/l), epoksikonazol (84 g/l)	morfoliny, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Jay 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Kask 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Korazzo 250 SC	azoksystrobina	strobiluryny	wgłębny i układowy,	1,0 l/ha	2/12-21	35	

		IP	(250 g/l)		do stosowania głównie zapobiegawczego				
		Matador 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Mirador 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy; do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha			
		Moderator 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5–1,75 l/ha	1	42	
		Prosaro 250 EC IP	protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l)	triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,75–1,0 l/ha	1	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	Środek można stosować do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
		Soligor 425 EC IP	protiokonazol (53 g/l), spiroksamina (224 g/l), tebukonazol (148 g/l)	triazole, ketoaminy, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,7–1,0 l/ha	1	35	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Starami 250 SC + Artea 330 EC IP	azoksystrobina (250 g/l) + propikonazol (250 g/l), cyprokonazol (80 g/l)	strobiluryny + triazole	wgłębny i układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,6 l/ha + 0,4 l/ha	1		
		Tango Star	fenpropimorf (250 g/l),	morfoliny,	układowy, do stosowania	1,0 l/ha	2/21	35	Środek można stosować do

		IP	epoksykonazol (84 g/l)	triazole	zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego				początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tern Premium 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tiofanat Metylowy 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Tilt Turbo 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
		Topsin M 500 SC IP	tiofanat metylowy (500 g/l)	benzimidazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,4 l/ha	1	35	
		Yamato 303 SE IP	tiofanat metylowy (233 g/l), tetrakonazol (70 g/l)	benzimidazole, triazole	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	1,5– 1,75 l/ha	1	42	
		Zenit 575 EC IP	propikonazol (125 g/l), fenpropidyna (450 g/l)	triazole, morfoliny	układowy, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego	0,8–1,0 l/ha	1	42	Środek można stosować do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
CZERŃ ZBÓŻ	Zapobieganie	AgriStar 250 SC	azoksystrobina	strobiluryny	wgłębny i układowy,	1,0	2/12-21	35	

(Davidiella sp., Lewia spp.)	rozwojowi i działaniu czynników powodujących przedwczesne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to warunki pogodowe).	IP	(250 g/l)		do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha			
		Azoksystrobi 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12	35	
		Aztek 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Azyl 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Demeter 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Erazer IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Korazzo 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Rezat 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tazer 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	
		Tiger 250 SC IP	azoksystrobina (250 g/l)	strobiluryny	wgłębny i układowy, do stosowania głównie zapobiegawczego	1,0 l/ha	2/12-21	35	